



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.


À propos du service Google Recherche de Livres


En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>




3 3433 06272628 0











170

COURS
DE
MATHÉMATIQUES.

A L'USAGE
DES GARDES DU PAVILLON
ET DE LA MARINE.

*Par M. BÉZOUT, de l'Académie Royale
des Sciences, & de celle de la Marine, Exa-
minateur des Gardes du Pavillon & de la
Marine, des Éleves & Aspirans au Corps
Royal de l'Artillerie, & Censeur Royal.*

PREMIERE PARTIE.

ÉLÉMENTS D'ARITHMÉTIQUE.



A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE PH.-D. PIERRES.
Imprimeur ordinaire du Roi, rue S.-Jacques.

M. DCC. LXXXI.

Avec Approbation, & Privilège du Roi.

1781

NOV 11 1964
CLUB
VIA 500

A MONSIEUR
LE DUC
DE CHOISEUL,

**PAIR DE FRANCE, CHEVALIER
DES ORDRES DU ROI ET DE CELUI DE LA
TOISON D'OR, COLONEL GÉNÉRAL DES
SUISSES ET GRISONS, LIEUTENANT GÉNÉRAL
DES ARMÉES DU ROI, GOUVERNEUR DE
TOURAINÉ, GRAND BAILLI D'HAGUENAU,
MINISTRE ET SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA
GUERRE ET DE LA MARINE, CHARGÉ DE LA
CORRESPONDANCE DES COURS D'ESPAGNE
ET DE PORTUGAL, GRAND MAÎTRE ET
SURINTENDANT GÉNÉRAL DES POSTES ET
RELAIS DE FRANCE, &c. &c. &c.**

MONSIEUR,

*En agréant que Votre Nom paroisse
à la tête de cet Ouvrage, Vous com-
blez un desir que plus d'un motif a dû
faire naître en moi. Mais rien ne me*

rend cette faveur plus précieuse, que la liberté qu'elle me donne de rendre publics mon respect & ma reconnaissance pour Vous.

En m'admettant à partager avec les Gens de Lettres l'accueil que Vous faites aux Sciences & aux Arts, Vous daignez encore diriger mes travaux vers un objet utile. Puisse cet Ouvrage, MONSEIGNEUR, répondre à des vues si sages & si éclairées ! Elles président à toutes les parties de Votre administration, & Vous assurent une gloire dont Vous êtes plus jaloux que de l'éclat des dignités & de la naissance.

Je suis avec un profond respect,

MONSEIGNEUR,

Votre très-humble & très-
obéissant Serviteur,
BÉZOUT



PRÉFACE.

LE Cours de Mathématiques dont nous donnons aujourd'hui la première Partie, doit rassembler les connoissances élémentaires que M. le Duc de Choiseul a jugé nécessaire d'exiger des Gardes du Pavillon & de la Marine, avant de les admettre au rang d'Officiers de Vaisseaux.

Quelque utile qu'il soit d'instruire de bonne heure ces jeunes Gentilshommes, dans la pratique d'un art aussi étendu que celui de la Navigation, on ne peut douter que la connoissance préliminaire des principes sur lesquels portent les règles de l'art, ne doivent contribuer beaucoup à faire fructifier les leçons qu'ils recevront ensuite de l'expérience, ne les dispose à y être plus attentifs, & par conséquent n'accélère beaucoup leurs progrès.

D'ailleurs, il est si rare qu'un esprit accoutumé à obéir servilement aux seules règles de la pratique, se replie ensuite assez sur lui-même, pour revenir avec succès à l'étude de la théorie, qu'on ne peut trop tôt les disposer à profiter des avantages qu'ils peuvent retirer de celle-ci.

Presque toutes les méthodes de la Naviga-

tion pratique sont fondées sur des connoissances mathématiques : comment pourroit-on différer d'instruire des principes de ces sciences , ceux qui sont destinés à en diriger un jour l'application.

Pour me conformer , autant qu'il est en moi , aux vues du Ministre qui a bien voulu me confier l'examen des études des Gardes du Pavillon & de la Marine , ainsi que la composition d'un Cours de Mathématiques à leur usage , j'ai cru devoir m'attacher à concilier ces deux points , la nécessité d'instruire ces Eleves sur les connoissances mathématiques relatives à leur objet , & celle de les en instruire dans un intervalle de tems qui ne leur fit rien perdre de l'avantage qu'il doit y avoir à aller de bonne heure à la Mer.

Pour satisfaire à ces deux objets , je me suis proposé 1°. de borner le Cours d'Etudes d'obligation , aux propositions directement utiles à la Navigation , & à celles qui seroient indispensables pour l'intelligence de celles-là. 2°. De faciliter cette étude , en la rendant plus intéressante par de fréquentes applications à la pratique , prises principalement dans la Marine ; ce qui réunit encore l'avantage de disposer l'esprit des Commencans à saisir de bonne heure le lien qui unit la théorie à la pratique.

Mais dans la vue de concourir , autant qu'il m'est possible , au progrès d'un art aussi important , j'ai cru devoir ne pas perdre de vue ceux

de ces jeunes Gentilshommes qui joignant à une noble émulation , des dispositions plus marquées que les autres , auroient le desir de s'instruire plus parfaitement. C'est dans cette vue que j'aurai soin de répandre dans ce Cours des connoissances plus étendues , & spécialement celles qui peuvent faciliter l'intelligence des ouvrages de feu M. Bouguer , & de quelques autres ouvrages non moins utiles à la Marine , dont on n'a pas encore retiré, à beaucoup près , tout le fruit qu'on peut en espérer , parce que les études des Gardes n'y étoient pas dirigées aussi pleinement qu'on se propose de le faire.

Ces connoissances qu'il est louable d'acquérir , & auxquelles on ne peut trop inviter les Gardes du Pavillon & de la Marine de s'appliquer ; ces connoissances , dis-je , ne seront point d'obligation , & nous aurons soin de les distinguer de celles-ci , par un caractère dont nous avertirons.

Le Cours de Mathématiques dont il s'agit ici , sera divisé en quatre Parties.

La premiere traite de l'Arithmétique.

La seconde traitera de la Géométrie , dans laquelle on comprendra la Trigonométrie rectiligne & la Trigonométrie sphérique.

La troisieme aura pour objet , l'Algebre & l'application de l'Algebre à la Géométrie.

La quatrieme comprendra la Statique & le Mouvement , avec quelques propositions d'Hydrostatique & d'Hydraulique.

Nous avons préféré de faire succéder l'Algebre à la Géométrie plutôt qu'à l'Arithmétique ; parce qu'outre que l'Algebre nous eût été d'une utilité très-médiocre dans la Géométrie élémentaire , les Commençans ne sont d'ailleurs pas encore assez exercés dans les raisonnemens mathématiques , pour sentir la force des démonstrations algébriques , quoique celles-ci soient souvent plus simples , que les démonstrations synthétiques ; au lieu que dans la disposition que nous avons choisie , on a lieu de croire que les Commençans déjà fortifiés par l'étude des deux premières Parties , en auront d'autant plus de facilité à généraliser leurs idées , & saisiront mieux les usages nombreux qu'on peut faire de cette science ; d'ailleurs ayant déjà plus de connoissances acquises , ils seront plus à portée de se familiariser avec cette science , par un plus grand nombre d'objets auxquels ils pourront l'appliquer.

Nous n'entrerons ici dans aucun détail sur l'exécution des trois dernières parties du Cours ; nous nous bornerons à rendre compte de celle-ci. Elle renferme sous un volume assez peu considérable , ce qu'il est nécessaire de savoir , non-seulement pour appliquer les connoissances mathématiques que nous enseignerons par la suite ; mais encore pour satisfaire à divers autres usages. En exposant les méthodes , nous avons évité de les multiplier pour un même objet , parce qu'on ne peut veiller trop soi-

gneusement à ne pas partager l'attention dans les commencemens ; c'est un abus que de dire , en faveur de l'opinion contraire , qu'il est utile d'envisager un objet sous différens aspects : cela n'est vrai que lorsqu'on a acquis un certain nombre de connoissances. C'est par ce même principe , que nous avons cru devoir resserrer les raisonnemens & les discours , dans beaucoup d'endroits : les Commencans , peu ou point du tout faits à raisonner méthodiquement , perdent , en parcourant un long échafaudage de Logique , la force de tête qui leur est nécessaire pour saisir l'esprit d'une démonstration.

On a donc fait en sorte de ne donner aux raisonnemens , que l'étendue nécessaire pour être bien entendus , & d'en élaguer ces attentions scrupuleuses qui vont jusqu'à démontrer des axiomes , & qui à force de supposer le Lecteur inepte , conduisent enfin à le rendre tel.

J'ai tâché d'applanir la route , soit en simplifiant des raisonnemens déjà employés , soit en leur en substituant de nouveaux qui m'ont paru plus clairs , soit enfin en employant un langage familier & simple. C'est au Public à juger si j'ai réussi ; mais on ne doit pas s'attendre que le Lecteur soit dispensé d'un certain degré d'attention : on ne fera jamais un livre de Mathématiques qui puisse être lu comme on lit un livre d'Histoire.

Je ne suppose d'autre connoissance à mon

Lecteur, que celle des noms des nombres & quelques autres idées aussi familières sur lesquelles j'établis les principes de la numération, tant des nombres entiers que des décimales. Je passe de-là aux quatre opérations fondamentales, dont je donne le procédé, & dont j'explique la nature & les principes de manière à en faciliter l'application aux opérations plus composées qui en dépendent. A la suite de ces opérations, j'en indique quelques usages. Les fractions sont traitées à peu-près de la même manière.

Les nombres complexes dont le calcul suppose, à la rigueur, la connoissance des fractions, succèdent à celles-ci. Quoique je n'aie pas parlé du Toisé, les règles que j'ai établies, ne le renferment pas moins; mais la connoissance de la nature des unités des facteurs & du produit, appartenant à la Géométrie, j'ai différé, pour cette raison, d'en parler, jusqu'à ce tems.

Quoique je ne désapprouve pas qu'on emprunte d'une science, les notions qui peuvent faciliter celle que l'on traite (quelque subordination qu'on ait d'ailleurs coutume de mettre entre ces deux sciences), néanmoins je pense qu'on ne doit prendre ce parti, que lorsqu'il ne s'en offre pas de plus simples. Comme l'Arithmétique m'a paru fournir des ressources suffisantes pour l'explication des opérations de la racine quarrée & de la racine cubique, je n'ai pas été puiser ailleurs que dans les principes mêmes de cette science.

Ce que j'expose des Rapports, Proportions & Progressions, quoique court, me paroît renfermer ce qui nous sera nécessaire pour les trois Parties qui doivent suivre. Cependant, comme nous pouvons, sans nous écarter de la loi que nous nous sommes imposée, revenir sur quelques propriétés des progressions, que quelques Lecteurs pourroient désirer, nous avertissons que nous les avons réservées pour application de l'Algebre.

Les logarithmes sont d'un trop grand usage dans la pratique de la Navigation, pour que nous n'ayons pas dû nous en occuper spécialement. Aussi après avoir exposé la nature, la formation & ceux des usages de ces nombres, que nous pouvions exposer sans anticiper sur aucune autre science, nous avons donné les moyens d'étendre, dans le besoin, les secours qu'on peut tirer des tables ordinaires.

Quoiqu'on puisse faire un grand nombre d'applications de l'Arithmétique à la Navigation, ce n'est cependant pas dans l'Arithmétique même qu'elles peuvent trouver leur place, parce qu'elles supposent presque toutes, au moins la Géométrie. Néanmoins dans le nombre des applications que nous avons données, nous avons pris quelques exemples dans le métier même. A mesure que nous avancerons, elles deviendront & plus nombreuses & plus importantes : on en trouvera d'ailleurs un très-grand nombre dans le *Traité de Navigation* qui forme la suite de ce Cours.

AVERTISSEMENT.

LES nombres que l'on trouve entre deux parenthèses , dans plusieurs endroits de ce Livre , sont destinés à indiquer à quel numéro on doit aller chercher la démonstration de la proposition sur laquelle on s'appuie dans ces endroits. A l'égard des numéros , ils sont au commencement des à lineâ.

Ce que l'on trouvera en petit caractères ; renferme les objets qui ne sont pas d'obligation dans le Cours d'Études des Gardes du Pavillon & de la Marine.



T A B L E

D E S M A T I E R E S.

<i>N</i> OTIONS préliminaires sur la nature & les différentes especes de Nombres. Pag. 1	
De la Numération & des Décimales.	3
Des Opérations de l'Arithmétique.	15
De l'Addition des Nombres entiers & des parties décimales.	16
De la Soustraction des Nombres entiers & des parties décimales.	20
De la Preuve de l'Addition & de la Souf- traction.	26
De la Multiplication.	28
De la Multiplication par un nombre d'un seul chiffre.	33
De la Multiplication par un nombre de plusieurs chiffres.	36
De la Multiplication des parties décimales.	40
Quelques usages de la Multiplication.	45
De la Division des Nombres entiers & des parties Décimales.	47

<i>De la Division d'un nombre composé de plusieurs chiffres, par un nombre qui n'en a qu'un.</i>	49
<i>De la Division par un nombre de plusieurs chiffres.</i>	55
<i>Moyen d'abrèger la Méthode précédente.</i>	62
<i>De la Division des Parties décimales.</i>	65
<i>Preuve de la Multiplication & de la Division.</i>	73
<i>Preuve par 9.</i>	75
<i>Quelques usages de la Regle précédente.</i>	78
<i>Des Fractions.</i>	80
<i>Des Entiers considérés sous la forme de Fraction.</i>	83
<i>Des changemens qu'on peut faire subir aux Fractions, sans en changer la valeur.</i>	85
<i>Réduction des Fractions à un même dénominateur.</i>	86
<i>Réduction des Fractions à leur plus simple expression.</i>	89
<i>Différentes manieres dont on peut envisager une Fraction, & conséquences qu'on peut en tirer.</i>	93
<i>Des Opérations de l'Arithmétique sur les Fractions.</i>	95
<i>De l'Addition des Fractions.</i>	ibid.
<i>De la Soustraction des Fractions.</i>	96
<i>De la Multiplication des Fractions.</i>	97

DES MATIERES. xv

<i>De la Division des Fractions.</i>	99
<i>Quelques applications des Regles précédentes.</i>	101
<i>Des Nombres complexes.</i>	105
<i>Table des Unités de quelques especes , & caractères par lesquels on représente ces différentes unités.</i>	106
<i>Additions des Nombres complexes.</i>	107
<i>Soustraction des Nombres complexes.</i>	109
<i>Multipliation des Nombres complexes.</i>	110
<i>Division d'un nombre complexe par un nombre incomplex.</i>	120
<i>Division d'un Nombre complexe par un Nombre complexe.</i>	124
<i>De la formation des Nombres quarrés & de l'extraction de leur racine.</i>	127
<i>De la formation des Nombres cubes & de l'extraction de leur racine.</i>	147
<i>Des Raisons , Proportions & Progressions , & de quelques Regles qui en dépendent.</i>	163
<i>Propriétés des Proportions Arithmét.</i>	169
<i>Propriétés des Proportions Géométriques.</i>	171
<i>Usages des Propositions précédentes.</i>	182
<i>De la Regle de Trois directe & simple.</i>	183
<i>De la Regle de Trois inverse & simple.</i>	187
<i>De la Regle de Trois composée.</i>	190
<i>De la Regle de Société.</i>	193
<i>Remarque au sujet de la Regle précédente.</i>	197

xxvj TABLE DES MATIERES.

<i>De quelques autres Regles dépendantes des Proportions.</i>	199
<i>De la Regle d'Alliage.</i>	202
<i>Des Progressions Arithmétiques.</i>	204
<i>Des Progressions Géométriques.</i>	209
<i>Des Logarithmes.</i>	216
<i>Table des Logarithmes des Nombres naturels depuis 1 jusqu'à 200.</i>	221
<i>Propriétés des Logarithmes.</i>	225
<i>Usages des Logarithmes.</i>	226
<i>Des Nombres dont les Logarithmes ne se trouvent point dans les Tables.</i>	230
<i>Des Logarithmes dont les Nombres ne se trouvent point dans les Tables.</i>	236
<i>REMARQUE.</i>	246



ELEMENS



ÉLÉMENTS D'ARITHMÉTIQUE.

*Notions préliminaires sur la nature &
les différentes especes de Nombres.*

1. **O**N appelle, en général, *quantité*, tout ce qui est susceptible d'augmentation ou de diminution. L'étendue, la durée, le poids, &c. sont des quantités. Tout ce qui est quantité est de l'objet des Mathématiques ; mais l'Arithmétique qui fait partie de ces Sciences, ne considère les quantités, qu'en tant qu'elles sont exprimées en nombres.

2. L'Arithmétique est donc la science des nombres : elle en considère la nature & les propriétés ; & son but est de donner
Arithmétique.

A

C O U R S

des moyens faciles , tant pour représenter les nombres , que pour les composer & décomposer , ce qu'on appelle *calculer*.

3. Pour se former une idée exacte des nombres , il faut d'abord savoir ce que l'on entend par *unité*.

4. L'unité est une quantité que l'on prend (le plus souvent arbitrairement) pour servir de terme de comparaison à toutes les quantités d'une même espèce : ainsi , lorsqu'on dit un tel corps pèse *cinq livres* , la livre est l'unité ; c'est la quantité à laquelle on compare le poids de ce corps ; on auroit pu également prendre l'once pour unité , & alors le poids de ce corps eût été marqué par quatre-vingt.

5. Le nombre exprime de combien d'unités , ou de parties d'unité , une quantité est composée.

Si la quantité est composée d'unités entières , le nombre qui l'exprime s'appelle *nombre entier* : & si elle est composée d'unités entières , & de parties de l'unité , ou simplement de parties de l'unité , alors le nombre est dit *fractionnaire* ou *fraction* ; *trois & demi* font un nombre fractionnaire : *trois quarts* font une fraction.

6. Un nombre qu'on énonce sans dé-

Pour exprimer tous les autres nombres avec ces caractères, on est convenu que de dix unités on en feroit une seule, à laquelle on donneroit le nom de *dixaine*, & que l'on compteroit par dixaines, comme on compte par unités, c'est-à-dire, que l'on compteroit deux dixaines, trois dixaines, &c. jusqu'à neuf : que pour représenter ces nouvelles unités, on emploieroit les mêmes chiffres que pour les unités simples, mais qu'on les en distingueroit par la place qu'on leur feroit occuper, en les mettant à la gauche des unités simples.

Ainsi, pour représenter *cinquante-quatre*, qui renferment cinq dixaines & quatre unités, on est convenu d'écrire 54. Pour représenter *soixante*, qui contiennent un nombre exact de dixaines & point d'unités, on écrit 60, en mettant un zéro, qui marque qu'il n'y a point d'unités simples, & détermine le chiffre 6, à marquer un nombre de dixaines. On peut, par ce moyen, compter jusqu'à *quatre-vingt-dix-neuf* inclusivement.

9. Remarquons, en passant, cette propriété de la numération actuelle ; savoir, qu'un chiffre placé à la gauche d'un autre, ou suivi d'un zéro, représente un nombre

Dix fois plus grand que s'il étoit seul.

10. Depuis 99, on peut compter jusqu'à *neuf cens quatre-vingt-dix-neuf*, par une convention semblable. De dix dixaines, on composera une seule unité qu'on nommera *centaine*, parce que dix fois dix font cent; on comptera ces centaines depuis un jusqu'à neuf, & on les représentera par les mêmes chiffres, mais en plaçant ces chiffres à la gauche des dixaines.

Ainsi pour marquer *huit cens cinquante-neuf* qui contiennent huit centaines, cinq dixaines, & neuf unités, on écrira 859. Si l'on avoit *huit cens neuf* qui contiennent huit centaines, point de dixaines, & neuf unités, on écriroit 809; c'est-à-dire, que l'on mettroit un zéro pour tenir la place des dixaines qui manquent. Si les unités manquoient aussi, on mettroit deux zéros; ainsi pour marquer *huit cens*, on écriroit 800.

11. Remarquons encore, qu'en vertu de cette convention, un chiffre suivi de deux autres ou de deux zéros, marque un nombre cent fois plus grand que s'il étoit seul.

12. Depuis *neuf cens quatre-vingt-dix-neuf*, on peut compter par le même artifice, jusqu'à *neuf mille neuf cens quatre-*

vingt-dix-neuf, en formant de dix centaines, une unité qu'on appelle *mille*, parce que dix fois cent font mille, comptant ces unités comme ci-devant, & les représentant par les mêmes chiffres placés à la gauche des centaines.

Ainsi, pour marquer *sept mille huit cens cinquante-neuf*, on écrira 7859; pour marquer *sept mille neuf*, on écrira 7009; & pour *sept mille*, on écrira 7000; où l'on voit qu'un chiffre suivi de trois autres, ou de trois zéros, marque un nombre mille fois plus grand que s'il étoit seul.

I 3. En continuant ainsi de renfermer dix unités d'un certain ordre, dans une seule unité, & de placer ces nouvelles unités dans des rangs de plus en plus avancés vers la gauche, on parvient à exprimer d'une manière uniforme & avec dix caracteres seulement, tous les nombres entiers imaginables.

I 4. Pour énoncer facilement un nombre exprimé par tant de chiffres qu'on voudra, on le partagera, par la pensée, en tranches de trois chiffres chacune, en allant de droite à gauche : on donnera à chaque tranche les noms suivans, en partant de la droite, *unités*, *mille*, *millions*,

billions, trillions, quatrillions, quintillions, sextillions, &c. Le premier chiffre de chaque tranche, (en partant toujours de la droite) aura le nom de la tranche ; le second celui de dizaines, & le troisième celui de centaines.

Ainsi, en partant de la gauche ; on énoncera chaque tranche, comme si elle étoit seule, & l'on prononcera à la fin de chacune le nom de cette même tranche : par exemple, pour énoncer le nombre suivant :

quatrillions, trillions, billions, millions, mille, unités

23, 456, 789, 234, 565, 456.

On dira vingt-trois *quatrillions*, quatre cens cinquante-six *trillions*, sept cens quatre-vingt-neuf *billions*, deux cens trente-quatre *millions*, cinq cens soixante & cinq *mille*, quatre cens cinquante-six *unités*.

§. De la numération que nous venons d'exposer, & qui est purement de convention, il résulte qu'à mesure qu'on avance de droite à gauche, les unités dont chaque nombre est composé, sont de dix en dix fois plus grandes, & que par conséquent pour rendre un nombre, dix fois, cent fois, mille fois plus grand, il suffit de mettre à la suite du chiffre de ses unités, un, deux,

trois, &c. zéros : au contraire, à mesure qu'on rétrograde de gauche à droite, les unités sont de dix en dix fois plus petites.

16. Telle est la numération actuelle : elle est la base de toutes les autres manières de compter, quoique dans plusieurs arts on ne s'affujettisse pas toujours à compter uniquement par dizaines, par dizaines de dizaines, &c.

17. Pour évaluer les quantités plus petites que l'unité qu'on a choisie, on partage celle-ci en d'autres unités plus petites. Le nombre en est indifférent en lui-même, pourvu qu'on puisse mesurer les quantités qu'on a dessein de mesurer ; mais ce qu'on doit avoir principalement en vue dans ces sortes de divisions, c'est de rendre les calculs le plus commodes qu'il sera possible ; c'est pour cette raison, qu'au lieu de partager d'abord l'unité en un grand nombre de parties, afin de pouvoir évaluer les plus petites, on ne la partage d'abord qu'en un certain nombre de parties, & qu'on subdivise celles-ci en d'autres, & ces nouvelles, encore en d'autres plus petites. C'est ainsi que dans les monnoies on partage la livre en 20 parties qu'on appelle *sols*, le sol en 12

parties qu'on appelle *deniers*. De même dans les mesures de poids, on partage la livre en 2 *marcs*, le marc en 8 *onces*, l'once en 8 *gros*, &c. en sorte que dans le premier cas on compte par vingtaines & par douzaines, dans le second, par deuxaines & par huitaines, &c.

18. Un nombre qui est composé de parties rapportées, ainsi, à différentes unités, est ce qu'on appelle un nombre *complexe*, & par opposition, celui qui ne renferme qu'une seule espèce d'unités, s'appelle *nombre incomplexe*. 3^e ou 3 livres font un nombre incomplexe. 3^e 17^s 8^d ou 3 livres 17 sols 8 deniers, font un nombre complexe.

19. Chaque art subdivise à sa manière l'unité principale qu'il s'est choisie. Les subdivisions de la toise sont différentes de celles de la livre; celles de la livre, différentes de celles du jour, de l'heure; celles-ci différentes de celles du marc, & ainsi de suite: nous les ferons connaître, lorsque nous traiterons des nombres complexes.

20. Mais de toutes les divisions & subdivisions qu'on peut faire de l'unité, celle qui se fait par décimales, c'est-à-dire, en

partageant l'unité en parties de dix en dix fois plus petites , est incontestablement la plus commode dans les calculs. Elle est fort en usage dans la pratique des Mathématiques ; la formation & le calcul des décimales sont absolument les mêmes que pour les nombres ordinaires où entiers : nous allons les faire connoître.

21. Pour évaluer en décimales les parties plus petites que l'unité , on conçoit que cette unité , telle qu'elle soit , livres , toises , &c. est composée de 10 parties , comme on imagine la dizaine composée de dix unités simples , où comme on imagine la livre composée de 20 sols. Ces nouvelles unités , par opposition aux dizaines , sont nommées *dixiemes* ; on les représente par les mêmes chiffres que les unités simples ; & comme elles sont dix fois plus petites que celles-ci , on les place à la droite du chiffre qui représente les unités simples.

Mais pour prévenir l'équivoque , & ne point donner lieu de prendre ces dixiemes pour des unités simples , on est convenu en même tems de fixer , une fois pour toutes , la place des unités , par une marque particuliere ; celle qui est le plus en usage ,

est une virgule que l'on met à la droite du chiffre qui représente les unités, ou, ce qui est la même chose, entre les unités & les *dixiemes*; ainsi pour marquer *vingt-quatre unités & trois dixiemes*, on écrira 24, 3.

2 2. On peut, de même, regarder actuellement les *dixiemes*, comme des unités qui ont été formées de dix autres, chacune dix fois plus petite que les *dixiemes*, & par la même raison d'analogie, les placer à la droite des *dixiemes*. Ces nouvelles unités dix fois plus petites que les *dixiemes*, seront cent fois plus petites que les unités principales, & pour cette raison seront nommées *centiemes*. Ainsi pour marquer *vingt-quatre unités, trois dixiemes & cinq centiemes*, on écrira 24, 35.

2 3. Concevons pareillement les *centiemes*, comme formés de dix parties; ces parties seront mille fois plus petites que l'unité principale, & pour cette raison seront nommées *milliemes*; & comme dix fois plus petites que les *centiemes*, on les placera à la droite de celles-ci.

En continuant de subdiviser ainsi de dix en dix, on formera de nouvelles unités qu'on nommera successivement des *dix-milliemes*, *cent-milliemes*, *millioniemes*, *dix-*

millioniemes, cent-millioniemes, billioniemes,
&c. & qu'on placera dans des rangs de plus
en plus reculés sur la droite de la virgule.

24. Les parties de l'unité, que nous
venons de décrire, sont ce que l'on appelle
les *décimales*.

25. Quant à la maniere de les énoncer,
elle est la même que pour les autres
nombres. Après avoir énoncé les chiffres
qui sont à la gauche de la virgule, on
énonce les *décimales* de la même maniere;
mais on ajoute, à la fin, le nom des unités
décimales de la dernière espece; ainsi pour
énoncer ce nombre 34,572, on diroit
trente-quatre unités & cinq cens soixante
& douze *milliemes*; si c'étoient des toises,
par exemple, on diroit trente-quatre toises
& cinq cens soixante & douze *milliemes*
de toise.

La raison en est facile à appercevoir,
si l'on fait attention que dans le nombre
34,572 le chiffre 5 peut indifféremment
être rendu ou par cinq *dixiemes*, ou par
cinq cens *milliemes*, puisque le *dixieme*
(22) valant 10 *centiemes*, & le *centieme*
(23) valant 10 *milliemes*, le *dixieme* con-
tiendra dix fois dix *milliemes*, ou 100 *mil-
liemes*; ainsi, les cinq *dixiemes* valent

157⁰⁰
100

300 *milliemes*. Par une raison semblable, le chiffre 7 pourra s'énoncer en disant soixante & dix *milliemes*, puisque (23) chaque *centieme* vaut 10 *milliemes*.

26. A l'égard de l'espece des unités du dernier chiffre, on la trouvera toujours facilement en comptant successivement de gauche à droite sur chaque chiffre depuis la virgule, le noms suivans
dixiemes, *centiemes*, *milliemes*, *dix-milliemes*, &c.

27. Si l'on n'avoit point d'unités entieres, mais seulement des parties de l'unité, on mettroit un zéro pour tenir la place des unités; ainsi pour marquer 125 *milliemes*, on écriroit 0,125. Si l'on vouloit marquer 25 *milliemes*, on écriroit 0,025 en mettant un zéro entre la virgule & les autres chiffres, tant pour marquer qu'il n'y a point de *dixiemes*, que pour donner aux parties suivantes leur véritable valeur. Par la même raison, pour marquer 6 *dix-milliemes*, on écriroit 0,0006.

28. Examinons, maintenant, les changemens qu'on peut faire naître dans un nombre, par le déplacement de la virgule.

Puisque la virgule détermine la place des unités, & que tous les autres chiffres

ont des valeurs dépendantes de leurs distances à cette même virgule; si l'on avance la virgule d'une, deux, trois, &c. places sur la gauche, on rend le nombre, 10, 100, 1000, &c. fois plus petit; & au contraire on le rend 10, 100, 1000, &c. fois plus grand, si l'on recule la virgule d'une, deux, trois, &c. places sur la droite.

En effet, si l'on a 4327,5264; & qu'en avançant la virgule d'une place sur la gauche, on écrive 432,75264, il est visible que les mille du premier nombre font des centaines dans le nouveau; les centaines, font des dizaines; les dizaines, des unités; les unités, des dixièmes; les dixièmes, des centièmes, & ainsi de suite. Donc chaque partie du premier nombre est devenue dix fois plus petite par ce déplacement. Si au contraire, en reculant la virgule d'une place sur la droite, on eût écrit 43275,264, les mille du premier nombre se trouveroient changés en dizaines de mille, les centaines en mille, les dizaines en centaines, les unités en dizaines, les dixièmes en unités, & ainsi de suite. Donc le nouveau nombre est 10 fois plus grand que le premier.

29. Un raisonnement semblable fait voir qu'en avançant la virgule sur la gauche, de deux ou de trois places on rendroit le nombre, 100 ou 1000 fois plus petit, & au contraire, 100 ou 1000 fois plus grand, en reculant la virgule de deux ou de trois places sur la droite.

30. La dernière observation que nous ferons sur les décimales, est qu'on n'en change point la valeur en mettant à la suite du dernier chiffre décimal, tel nombre de zéros qu'on voudra. Ainsi 43,25 est la même chose que 43,250, ou que 43,2500 ou que 43,25000, &c.

Car chaque *centieme* valant 10 *milliemes* ou 100 *dix-milliemes*, &c. les 25 *centiemes* vaudroient 250 *milliemes* ou 2500 *dix-milliemes*, &c. en un mot, c'est la même chose que lorsqu'au lieu de dire 25 pistoles, on dit 250 livres, ou que lorsqu'au lieu de dire 25 quintaux, on dit 2500 livres.

Des opérations de l'Arithmétique.

31. Ajouter, soustraire, multiplier, & diviser, sont les quatre opérations fondamentales de l'Arithmétique. Toutes les questions qu'on peut proposer sur les

nombres se réduisent à pratiquer quelques-unes de ces opérations, ou toutes ces opérations. Il est donc important de se les rendre familières, & d'en bien saisir l'esprit.

32. Le but de l'Arithmétique est ; comme nous l'avons déjà dit, de donner des moyens de calculer facilement les nombres. Ces moyens consistent à réduire le calcul des nombres les plus composés, à celui de nombres plus simples, ou exprimés par le plus petit nombre de chiffres possible. C'est ce qu'il s'agit d'exposer actuellement.

*De l'Addition des Nombres entiers
& des Parties décimales.*

33. Exprimer la valeur totale de plusieurs nombres, par un seul, est ce qu'on appelle *faire une addition*.

Quand les nombres qu'on se propose d'ajouter n'ont qu'un seul chiffre, on n'a pas besoin de règle ; mais lorsqu'ils ont plusieurs chiffres, on trouve leur valeur totale qu'on appelle *somme*, en observant la règle suivante.

Ecrivez les uns sous les autres, tous
les

les nombres proposés ; de manière que les chiffres des unités de chacun , soient dans une même colonne verticale ; qu'il en soit de même des dizaines , de même des centaines , &c , soulignez le tout.

Ajoutez d'abord tous les nombres qui sont dans la colonne des unités ; si la somme ne passe pas 9 , écrivez-la au-dessous ; si elle surpasse neuf , elle renfermera des dizaines ; n'écrivez au-dessous , que l'excédent du nombre des dizaines : comptez ces dizaines pour autant d'unités , & ajoutez - les avec les nombres de la colonne suivante ; observez à l'égard de la somme des nombres de cette seconde colonne , la même règle qu'à l'égard de la première , & continuez ainsi de colonne en colonne , jusqu'à la dernière , au-dessous de laquelle vous écrirez la somme telle que vous la trouverez. Eclaircissions cette règle par des exemples.

E X E M P L E I.

Qu'il soit question d'ajouter 54925 avec 2023 : j'écris ces deux nombres comme on le voit ici.

$$\begin{array}{r}
 54925 \\
 2023 \\
 \hline
 56948 \text{ somme;} \\
 B -
 \end{array}$$

Arithmétique;

Et après avoir souligné le tout , je commence par les unités , en disant 5 & 3 font 8 que j'écris sous cette même colonne.

Je passe à celle des dizaines , dans laquelle je dis 2 & 2 font 4 , que j'écris au-dessous.

A la colonne des centaines , je dis 9 & 0 font 9 , que j'écris sous cette même colonne.

Dans la colonne des mille , je dis 4 & 2 font 6 , que j'écris sous cette colonne.

Enfin dans la colonne des dizaines de mille , je dis 5 & rien font 5 , que j'écris de même au-dessous.

Le nombre 56948 , trouvé par cette opération , est la somme des deux nombres proposés , puisqu'il en renferme les unités , les dizaines , les centaines , les mille , & les dizaines de mille , que nous avons rassemblées successivement.

E X E M P L E I I.

On demande la somme des quatre nombres suivans. . . 6903 , 7854 , 953 , 7327 : je les écris comme on les voit ici.

$$\begin{array}{r}
 6903 \\
 7854 \\
 953 \\
 7327 \\
 \hline
 23037 \text{ somme.}
 \end{array}$$

Et en commençant, comme ci-dessus, par la droite, je dis 3 & 4 font 7, & 3 font 10, & 7 font 17; j'écris les 7 unités sous la première colonne, & je retiens la dixaine pour la joindre, comme unité, aux nombres de la colonne suivante, qui sont aussi des dixaines.

Passant à cette seconde colonne, je dis; 1 que je retiens & 0 font 1, & 5 font 6, & 5 font 11, & 2 font 13; j'écris 3 sous la colonne actuelle, & je retiens, pour la dixaine, une unité que j'ajoute à la colonne suivante, en disant une & 9 font 10, & 8 font 18, & 9 font 27, & 3 font 30. je pose 0 sous cette colonne, & je retiens, pour les trois dixaines, trois unités que j'ajoute à la colonne suivante, en disant pareillement, 3 & 6 font 9, & 7 valent 16, & 7 font 23; j'écris 3 sous cette colonne. & comme il n'y a plus d'autre colonne, j'avance, d'une place, les deux dixaines qui appartiendroient à la colonne suivante, s'il y en avoit une. Le nombre 23037 est la somme des quatre nombres proposés.

34. S'il y a des parties décimales; comme elles se comptent, ainsi que les autres nombres, par dixaines, à mesure

qu'on avance de droite à gauche ; la règle pour les ajouter est absolument la même , en observant de mettre toujours les unités de même ordre dans une même colonne.

Ainsi , si on propose d'ajouter les trois nombres 72 , 957 . . 12 , 8 . . . 124 , 03 , j'écrirai

$$\begin{array}{r} 72, 957 \\ 12, 8 \\ 124, 03 \\ \hline 209, 787 \text{ somme.} \end{array}$$

En suivant la règle ci - dessus , j'aurai 209 , 787 pour la somme.

De la Soustraction des Nombres entiers & des Parties décimales.

35. La soustraction est l'opération par laquelle on retranche un nombre , d'un autre nombre. Le résultat de cette opération s'appelle *reste* ou *excès* ou *différence*.

Pour faire cette opération , on écrira le nombre qu'on veut retrancher , au-dessous de l'autre , de la même manière que dans l'addition ; & ayant souligné le tout , on retranchera , en allant de droite à gauche , chaque nombre inférieur , de son correspondant supérieur ; c'est - à - dire ,

DE MATHÉMATIQUES: 21

les unités des unités , les dixaines des dixaines, &c. on écrira chaque reste, au-dessous , dans le même ordre , & zéro lorsqu'il ne restera rien.

Lorsque le chiffre inférieur se trouvera plus grand que le chiffre supérieur correspondant , on ajoutera à celui-ci dix unités qu'on aura en empruntant , par la pensée , une unité sur son voisin à gauche , lequel doit , par cette raison , être regardé comme moindre d'une unité , dans l'opération suivante.

E X E M P L E I.

On propose de retrancher 5432 de 8954. J'écris ces deux nombres comme il suit.

$$\begin{array}{r} 8954 \\ 5432 \\ \hline 3522 \text{ reste.} \end{array}$$

Et en commençant par le chiffre des unités , je dis 2 ôté de 4 , il reste 2 que j'écris au - dessous : puis , passant aux dixaines , je dis 3 ôté de 5 , il reste 2 que j'écris sous les dixaines. A la troisième colonne , je dis 4 ôté de 9 , il reste 5 que j'écris sous cette colonne. Enfin à la

B 3

quatrième, je dis 5 ôté de 8, il reste 3 que j'écris sous 5, & j'ai 3522 pour le reste de 5432 retranché de 8954.

E X E M P L E I I.

On veut ôter 7987 de 27646.

On écrira. 27646

7987

19659 reste.

Comme on ne peut ôter 7 de 6, on ajoutera à 6, dix unités qu'on empruntera en prenant une unité sur son voisin 4, & on dira 7 ôté de 16, il reste 9 qu'on écrira sous 7.

Passant aux dizaines, on ne dira plus 8 ôté de 4, mais 8 ôté de 3 seulement, parce que l'emprunt qu'on a fait, a diminué 4 d'une unité : comme on ne peut ôter 8 de 3, on ajoutera de même à 3, dix unités qu'on empruntera, en prenant une unité sur le chiffre 6 de la gauche ; & on dira 8 ôté de 13, il reste 5 qu'on écrira sous 8. Passant à la troisième colonne, on dira de même, 9 ôté de 5, ou plutôt 9 ôté de 15, (en empruntant comme ci-dessus) ; il reste 6 qu'on écrira sous 9.

A la quatrième colonne, on dira, par

la même raison, 7 ôté de 6, ou plutôt de 16, il reste 9 qu'on écrira sous 7; & comme il n'y a rien à retrancher dans la cinquième colonne, on écrira sous cette colonne, non pas 2, parce qu'on vient d'emprunter une unité sur ce 2, mais seulement 1, & on aura 19659 pour le reste.

36. Si le chiffre sur lequel on doit faire l'emprunt, étoit un zéro, l'emprunt se feroit, non pas sur ce zéro, mais sur le premier chiffre significatif qui viendrait après; or quoique ce soit, alors, emprunter 100 ou 1000 ou 10000, selon qu'il y a un, deux ou trois zéros consécutifs, on n'en opérera pas moins comme ci-dessus; c'est-à-dire, qu'on ajoutera seulement 10 au chiffre pour lequel on emprunte, & comme ces dix sont censés pris sur les 100 ou 1000, &c. qu'on a empruntés, pour employer les 90 ou les 990, &c. qui restent, on comptera les zéros suivans pour autant de neuf; c'est ce que l'exemple ci-après va éclaircir.

On suivra absolument la même règle ; mais pour éviter tout embarras dans l'application de cette règle , il n'y aura qu'à rendre le nombre des chiffres décimaux le même dans chacun des deux nombres proposés , en mettant un nombre suffisant de zéros à la suite de celui qui a le moins de décimales ; cette préparation ne change rien à la valeur de ce nombre (30).

E X E M P L E I V.

De . . . : . . . 5403, 25
on veut ôter . . . 385, 6532

Je mets deux zéros à la suite des décimales du nombre supérieur ; après quoi , j'opere sur les deux nombres ainsi préparés , précisément selon l'énoncé de la règle donnée pour les nombres entiers ,

$$\begin{array}{r} 5403, 2500 \\ 385, 6532 \\ \hline \end{array}$$

5017, 5968 reste.

& je trouve pour reste . . . 5017, 5968.



De la preuve de l'Addition & de la Soustraction.

38. Ce qu'on appelle preuve d'une opération arithmétique, est une autre opération que l'on fait pour s'assurer de l'exactitude du résultat de la première.

La preuve de l'addition se fait en ajoutant de nouveau, par parties, mais en commençant par la gauche, les sommes qu'on a déjà ajoutées. On retranche la totalité de la première colonne, de la partie qui lui répond dans la somme inférieure : on écrit au-dessous, le reste, qu'on réduit par la pensée en dizaines, pour le joindre au chiffre suivant de cette même somme, & du total on retranche encore la totalité de la colonne supérieure ; on continue ainsi, jusqu'à la dernière colonne, dont la totalité étant retranchée, ne doit laisser aucun reste.

Ainsi, ayant trouvé ci-dessus que les quatre nombres

$$\begin{array}{r}
 6903 \\
 7854 \\
 953 \\
 7327 \\
 \hline
 \text{ont pour somme} \dots\dots\dots 23037 \\
 \text{\textit{3110}}
 \end{array}$$

Pour vérifier ce résultat, j'ajoute les mêmes nombres, en commençant par la gauche ; & je dis 6 & 7 font 13, & 7 font 20, lesquels ôtés de 23, il reste 3 ou 3 dizaines, qui, avec le chiffre suivant zéro, font 30. Je passe à la seconde colonne, & je dis 9 & 8 font 17, & 9 font 26, & 3 font 29 que j'ôte de 30 ; il reste 1 ou une dizaine, qui, jointe au chiffre suivant 3, fait 13. J'ajoute tous les nombres de la troisième colonne, en disant 5 & 5 font 10, & 2 font 12, qui ôtés de 13, il reste 1 ou une dizaine, laquelle, jointe au chiffre suivant 7, fait 17 ; j'ajoute pareillement tous les nombres de la dernière colonne, en disant 3 & 4 font 7, & 3 font 10, & 7 font 17, qui ôtés de 17, il ne reste rien : d'où je conclus que la première opération est exacte.

On est fondé à conclure, que la première opération a été bien faite, lorsqu'après cette preuve il ne reste rien, parce qu'ayant ôté successivement tous les mille, toutes les centaines, toutes les dizaines & toutes les unités dont on avoit composé la somme, il faut qu'à la fin il ne reste rien.

39. La preuve de la soustraction se fait en ajoutant le reste trouvé par l'opération, avec le nombre retranché ; si la première opération a été bien faite, on doit reproduire le nombre dont on a retranché : ainsi je vois que dans le troisième exemple que nous avons donné ci-dessus, l'opération a été bien faite, parce qu'en ajoutant 17489 (nombre retranché), avec le reste 2565, je reproduis 20054, nombre dont on a retranché.

$$20054$$

$$17489$$

$$2565$$

$$20054$$

De la Multiplication.

40. Multiplier un nombre par un autre, c'est prendre le premier de ces deux nombres, autant de fois qu'il y a d'unités dans l'autre. Multiplier 4 par 3, c'est prendre trois fois le nombre 4.

41. Le nombre qu'on doit multiplier, s'appelle le *multiplicande* ; celui par lequel on doit multiplier, s'appelle le *multiplicateur* ; & le résultat de l'opération s'appelle *produit*.

42. Le mot *produit* a communément une acception beaucoup plus étendue ; mais nous avertissons expressément que nous ne l'emploierons que pour désigner le résultat de la multiplication.

Le multiplicande & le multiplicateur se nomment aussi les *facteurs* du produit , ainsi 3 & 4 sont les facteurs de 12 , parce que 3 fois 4 font 12.

43. Suivant l'idée que nous venons de donner de la multiplication , on voit qu'on pourroit faire cette opération en écrivant le multiplicande autant fois qu'il y a d'unités dans le multiplicateur , & faisant ensuite l'addition ; par exemple , pour multiplier 7 par 3 , on pourroit écrire.

$$\begin{array}{r} 7 \\ 7 \\ 7 \\ \hline 21 \end{array}$$

Et la somme 21 résultante de cette addition seroit le produit.

Mais lorsque le multiplicateur est tant soit peu considérable , l'opération devient fort longue : ce que nous appelons proprement multiplication , est la méthode de parvenir à ce même résultat , par une voie plus courte.

44. Tant qu'on ne considère les nombres que d'une manière abstraite, c'est-à-dire, sans faire attention à la nature de leurs unités, il importe peu, lequel des deux nombres proposés pour la multiplication, on prenne pour multiplicande ou pour multiplicateur; par exemple, si on a 4 à multiplier par 3, il est indifférent de multiplier 4 par 3, ou 3 par 4, le produit sera toujours 12 : en effet 3 fois 4 ne sont autre chose que le triple de 1 fois 4, & 4 fois 3 sont le triple de 4 fois 1; or il est évident que 1 fois 4 & 4 fois 1 sont la même chose; & on peut appliquer le même raisonnement à tout autre nombre.

45. Mais lorsque par l'énoncé de la question, le multiplicateur & le multiplicande sont des nombres concrets, il importe de distinguer le multiplicande du multiplicateur : cette attention est principalement nécessaire dans la multiplication des nombres complexes, dont nous parlerons par la suite.

Au reste, cela est toujours aisé à distinguer : la question qui conduit à la multiplication dont il s'agit, fait toujours connoître quelle est la quantité qu'il s'agit

de répéter plusieurs fois, c'est-à-dire, le multiplicande ; & quelle est celle qui marque combien de fois on doit répéter le multiplicande , c'est-à-dire , quel est le multiplicateur.

46. Comme le multiplicateur est destiné à marquer combien de fois on doit prendre le multiplicande , il est toujours un nombre abstrait : ainsi , quand on demande ce que doivent coûter 52 toises de bois , à raison de 36 livres la toise ; on voit que le multiplicande est 36 livres , qu'il s'agit de répéter 52 fois ; soit que ce 52 marque des toises , ou toute autre chose.

47. Le produit qui est formé de l'addition répétée du multiplicande , aura donc des unités de même nature que le multiplicande *.

Après cette petite digression sur la nature des unités du produit & de ses facteurs , revenons à la méthode pour trouver ce produit.

* Nous n'en exceptons pas même la multiplication géométrique , dont nous ne parlons qu'en Géométrie , comme cela nous paroît assez naturel. Les unités du multiplicateur n'y sont jamais que des unités abstraites , comme dans toute autre multiplication.

48. Les regles de la multiplication des nombres les plus composés , se réduisent à multiplier un nombre d'un seul chiffre , par un nombre d'un seul chiffre. Il faut donc s'exercer à trouver soi-même le produit des nombres exprimés par un seul chiffre , en ajoutant successivement un même nombre à lui-même. On peut aussi , si on le veut , faire usage de la Table suivante , qu'on attribue à Pythagore.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

La premiere bande de cette table se forme en ajoutant 1 à lui-même successivement.

La seconde , en ajoutant 2 de même.

La troisieme , en ajoutant 3 , & ainsi de suite.

49. Pour trouver par le moyen de cette table , le produit de deux nombres exprimés par un seul chiffre chacun , on cherchera l'un de ces deux nombres , le multiplicande , par exemple , dans la bande supérieure ; & en partant de ce nombre , on descendra verticalement jusqu'à ce qu'on soit vis-à-vis du multiplicateur qu'on trouvera dans la première colonne. Le nombre sur lequel on se sera arrêté , sera le produit ; ainsi , pour trouver , par exemple , le produit de 9 par 6 , ou combien font 6 fois 9 , je descends depuis 9 , pris dans la première bande , jusqu'à vis-à-vis de 6 pris dans la première colonne ; le nombre sur lequel je m'arrête , est 54 ; par conséquent 6 fois 9 font 54.

En voilà autant qu'il en faut pour passer à la multiplication des nombres exprimés par plusieurs chiffres.

De la Multiplication par un nombre d'un seul chiffre.

50. Ecrivez le multiplicateur , qu'on suppose ici d'un seul chiffre , sous le multiplicande ; peu importe sous quel chiffre ,

Arithmétique.

mais pour fixer les idées, supposons que ce soit sous le chiffre des unités.

Multipliez d'abord le nombre des unités par votre multiplicateur ; & si le produit ne contient que des unités , écrivez ce produit au-dessous ; s'il contient des unités & des dixaines , écrivez seulement les unités , & comptant les dixaines pour autant d'unités , retenez celles-ci.

Multipliez , de même , le nombre des dixaines du multiplicande ; & au produit ajoutez les unités que vous avez retenues ; écrivez le tout au - dessous , s'il peut être marqué par un seul chiffre , sinon n'écrivez que les unités de ce produit ; & retenez-en les dixaines , qui sont des centaines , pour les ajouter au produit suivant qui sera pareillement des centaines.

Continuez de multiplier successivement , suivant la même règle , tous les chiffres du multiplicande ; la suite des chiffres que vous aurez écrits , marquera le produit.

E X E M P L E .

On demande combien 2864 toises valent de pieds. La toise est de 6 pieds.

La question se réduit à prendre six pieds 2864 fois, ou ce qui revient au même (44) à prendre 2864 pieds, 6 fois.

J'écris donc 2864 multiplicande.
6 multiplicateur.

17184 . . produit.

Et je dis, en commençant par les unités; 6 fois 4 font 24; j'écris 4, & je retiens 2 unités pour les deux dixaines.

2°. 6 fois 6 font 36, & deux que j'ai retenues font 38; je pose 8 & je retiens 3.

3°. 6 fois 8 font 48, & 3 que j'ai retenues font 51; je pose 1 & je retiens 5.

4°. 6 fois 2 font 12, & 5 que j'ai retenues font 17 que j'écris en entier, parce qu'il n'y a plus rien à multiplier. Le nombre 17184 est le produit demandé, ou le nombre de pieds que valent les 2864 toises, puisqu'il renferme 6 fois les 4 unités; 6 fois les 6 dixaines; 6 fois les 8 centaines, & 6 fois les 2 mille; & par conséquent 6 fois le nombre 2864.



*De la Multiplication par un nombre
de plusieurs chiffres.*

§ I. Lorsque le multiplicateur a plusieurs chiffres, il faut faire successivement, avec chacun de ces chiffres, ce que l'on vient de prescrire lorsqu'il n'y en a qu'un, mais en commençant toujours par la droite ; ainsi on multipliera d'abord tous les chiffres du multiplicande, par le chiffre des unités du multiplicateur ; puis par celui des dizaines ; & l'on écrira ce second produit sous le premier ; mais comme il doit être un nombre de dizaines, puisque c'est par des dizaines qu'on multiplie, on portera le premier chiffre de ce produit, sous les dizaines, & les autres chiffres, toujours en avançant sur la gauche.

Le troisieme produit, qui se fera en multipliant par les centaines, se placera de même sous le second, mais en avançant encore d'une place : on suivra la même loi pour les autres.

Toutes ces multiplications étant faites, on ajoutera les produits particuliers qu'elles ont donnés, & la somme sera le produit total.

E X E M P L E.

On propose de multiplier 65487
par 6958

$$\begin{array}{r}
 523896 \\
 327435 \\
 589383 \\
 392922 \\
 \hline
 455658546 \text{ prod.}
 \end{array}$$

Je multiplie d'abord 65487, par le nombre 8 des unités du multiplicateur, & j'écris successivement sous la barre, les chiffres du produit 523896 que je trouve en suivant la regle donnée pour le premier cas (50).

Je multiplie de même le nombre 65487, par le second chiffre 5 du multiplicateur, & j'écris le produit 327435, sous le premier produit, mais en plaçant le premier chiffre 5 sous les dizaines de ce premier produit.

Multipliant pareillement 65487 par le troisieme chiffre 9, j'écris le produit 589383, sous le précédent, mais en plaçant le premier chiffre 3, au rang des centaines, parce que le nombre par lequel je multiplie est un nombre de centaines.

Enfin je multiplie 65487, par le dernier chiffre 6 du multiplicateur, & j'écris le produit 392922, sous le précédent, en avançant encore d'une place, afin que son premier chiffre occupe la place des mille, parce que le chiffre par lequel on multiplie marque des mille : enfin j'ajoute tous ces produits, & j'ai 455658546 pour le produit de 65487 multiplié par 6958, c'est-à-dire, pour la valeur de 65487 pris 6958 fois. En effet, on a pris 65487, 8 fois par la premiere opération, 50 fois par la seconde, 900 fois par la troisieme, & 6000 fois par la quatrieme.

§ 2. Si le multiplicande ou le multiplicateur, ou tous les deux étoient terminés par des zéros, on abrégeroit l'opération, en multipliant comme si ces zéros n'y étoient point ; mais on les mettroit ensuite tous à la suite du produit.

E X E M P L E.

On propose de multiplier 6500

par 350

$$\begin{array}{r}
 325 \\
 195 \\
 \hline
 2275000
 \end{array}$$

Je multiplie seulement 65 par 35, & je trouve 2275, à côté duquel j'écris les trois zéros qui se trouvent, en tout, à la suite du multiplicande & du multiplicateur.

En effet, le multiplicande 6500 représente 65 centaines; ainsi quand on multiplie 65, on doit sous-entendre que le produit est des centaines. Pareillement, le multiplicateur 350, marque 35 dizaines; ainsi quand on multiplie par 35, on doit sous-entendre que le produit sera des dizaines; il fera donc des dizaines de centaines, c'est-à-dire des mille; il doit donc avoir 3 zéros: on appliquera un raisonnement semblable à tous les autres cas.

§ 3. Lorsqu'il se trouve des zéros entre les chiffres du multiplicateur, comme la multiplication par ces zéros ne donneroit que des zéros, on se dispensera d'écrire ceux-ci dans le produit; & passant tout de suite à la multiplication par le premier chiffre significatif qui vient après ces zéros, on en avancera le produit sur la gauche d'autant de place plus une, qu'il y a de zéros qui se suivent dans le multiplicateur, c'est-à-dire, de deux places s'il y a un zéro, de trois s'il y en a deux.

E X E M P L E.

Si l'on a	42052
à multiplier par . . .	3006
	<hr/>
	252312
	126156
	<hr/>
	126408312

Après avoir multiplié par 6, & écrit le produit 252312, on multipliera tout de suite par trois; mais on écrira le produit 126156, de manière qu'il marque des mille, il faudra donc le reculer de trois places, c'est-à-dire, d'une place de plus qu'il n'y a de zéros interposés aux chiffres du multiplicateur.

*De la Multiplication des Parties
Décimales.*

§ 4. Pour multiplier les parties décimales, on observera la même règle que pour les nombres entiers, sans faire aucune attention à la virgule; mais après avoir trouvé le produit, on en séparera sur la droite par une virgule, autant de chiffres qu'il y a de décimales tant dans le multiplicande que dans le multiplicateur.

E X E M P L E I.

On propose de multiplier 54,23
par.

$$\begin{array}{r} 8,3 \\ \hline 16269 \\ 43384 \\ \hline \end{array}$$

450,109

Je multiplierai 5423 par 83 , le produit sera 450,109 ; & comme il y a deux décimales dans le multiplicande , & une dans le multiplicateur , je séparerai trois chiffres sur la droite de ce produit , qui par - là deviendra 450,109 , tel qu'il doit être.

La raison de cette règle est facile à saisir , en observant que si le multiplicateur étoit 83 , le produit n'auroit en décimales que des *centiemes* , puisqu'on auroit répété 83 fois le multiplicande 54,23 dont les décimales sont des centiemes ; mais comme le multiplicateur est 8,3 , c'est-à-dire , (21) dix fois plus petit que 83 , le produit doit donc avoir des unités dix fois plus petites que les centiemes ; le dernier chiffre de ses décimales doit donc (23) être des *milliemes* , il doit donc y avoir trois chiffres décimaux dans ce produit , c'est-à-dire , autant qu'il y en a , tant dans

le multiplicande que dans le multiplicateur.

On peut appliquer un raisonnement semblable à tout autre cas.

E X E M P L E I I.

$$\begin{array}{r} \text{Si on avoit } 0,12 \\ \text{à multiplier par . . . } 0,3 \\ \hline 0,036 \end{array}$$

On multiplieroit 12 par 3, ce qui donneroit 36 ; comme la règle prescrit de séparer ici trois chiffres, on pourroit être embarrassé à y satisfaire, puisque ce produit 36 n'en a que deux ; mais si on reprend le raisonnement que nous avons appliqué à l'exemple précédent, on verra facilement qu'il faut, comme on le voit ici, interposer un zéro entre 36 & la virgule. En effet, si l'on avoit 0,12 à multiplier par 3, il est évident qu'on auroit 0,36 ; mais comme on n'a à multiplier que par 0,3, c'est-à-dire, par un nombre dix fois plus petit que 3, on doit avoir un produit dix fois plus petit que 0,36, c'est-à-dire, des millièmes, & c'est ce qui a lieu (28) lorsqu'on écrit 0,036.

55. Comme on n'emploie ordinairement les décimales que dans la vue de faciliter les calculs, en substituant à un

DE MATHÉMATIQUES. 43

calcul rigoureux, une approximation suffisante, mais prompte; il n'est pas inutile d'exposer ici un moyen d'abrégier l'opération lorsqu'on n'a besoin d'avoir le produit que jusqu'à un degré d'exactitude proposé.

Supposons, par exemple, qu'ayant à multiplier. . . . 45,625957 par 28,635, je n'aie besoin d'avoir le produit qu'à moins d'un millième près. J'écris ces deux nombres comme on le voit ci-dessous, c'est-à-dire, qu'après avoir renversé l'ordre des chiffres de l'un des deux, je l'écris sous l'autre, en faisant répondre le chiffre de ses unités sous la décimale immédiatement inférieure de deux degrés à celui auquel je veux borner mon produit. Je fais ensuite la multiplication, en négligeant, dans le multiplicande, tous les chiffres qui se trouvent à la droite de celui par lequel je multiplie; & à mesure que je change de chiffre dans le multiplicateur, je porte toujours le premier chiffre du nouveau produit, sous le premier chiffre du premier. L'addition de tous ces produits étant faite, je supprime les deux derniers chiffres, en observant cependant d'augmenter le dernier de ceux qui restent, d'une unité, si les deux que je supprime passent 50; après quoi je place la virgule au rang fixé par l'espèce de décimales que je me proposois d'avoir.

E X E M P L E.

Je veux multiplier . . 45,625957
par 28,635
mais je n'ai besoin d'avoir le produit qu'à un millième d'unité près.

J'écris ainsi ces deux nombres..... 45,625957

	53682
	<hr/>
	91251914
	36500760
	2737554
	136875
	22810
	<hr/>
	130649913
. produit.....	1306,429

Et si l'on avoit fait la multiplication à l'ordinaire, on auroit eu 1306,499278695 qui s'accorde avec le précédent jusqu'à la troisième décimale, ainsi qu'on le demande.

S'il n'y avoit pas assez de chiffres décimaux dans le multiplicande, pour faire correspondre le chiffre des unités du multiplicateur, au chiffre auquel la règle prescrit de le faire correspondre, on y suppléeroit en mettant des zéros.

E X E M P L E.

On doit multiplier 54,236
par..... 532,27
& l'on veut avoir le produit à un centième d'unités près;
j'écris 54,236000

$$\begin{array}{r}
 72235 \\
 \hline
 27118000 \\
 16270800 \\
 1084720 \\
 108472 \\
 37961 \\
 \hline
 \end{array}$$

288681983

produit 28868,20, en ajoutant une unité au dernier chiffre, parce que les deux que l'on supprime, passent 50.

Pour troisième exemple, supposons qu'on ait à

multiplier 0,227538917

par 0,5664178

& l'on ne veut avoir que 7 décimales au produit ; on

écrira ... 0,227538917

87146650

$$\begin{array}{r}
 \\
 113769455 \\
 13652334 \\
 1365228 \\
 91012 \\
 2275 \\
 1599 \\
 176 \\
 \hline
 \end{array}$$

128882069

produit..... 0,1288821

Sur quelques usages de la Multiplication.

56. Nous ne nous proposons pas de faire connoître tous les usages qu'on peut faire de la multiplication. Nous en indiquerons seulement quelques-uns qui mettront sur la voie pour les autres.

La multiplication sert à trouver, en général, la valeur totale de plusieurs unités, lorsqu'on connoît la valeur de chacune. Par exemple, 1°. combien doivent coûter 5842 toises, à raison de 54th la toise ? Il faut multiplier 54th par 5842, ou (44) 5842th par 54, on aura 315468th pour le Prix total demandé. 2°. Combien 5954 pieds-cubes * d'eau pèsent-ils, en supposant que le pied-cube pèse 72 liv. ? il faut multiplier 72^{lb} par 5954, ou 5954^{lb} par 72 ; on aura 428688^{lb} pour le poids des 5954 pieds-cubes.

57. On emploie la multiplication pour convertir des unités d'une certaine espece, en unités d'une espece plus petite. Par exemple, pour réduire les livres en sols,

* Le pied - cube est une mesure d'un pied de long sur un pied de large, & sur un pied de haut, avec laquelle on évalue la capacité des corps, ainsi qu'on le verra en Géométrie.

& ceux-ci en deniers ; les toises en pieds ; ceux-ci en pouces , ces derniers en lignes ; les jours en heures , celles-ci en minutes , ces dernières en secondes ; on a souvent besoin de ces sortes de conversions. Nous en donnerons quelques exemples.

Si on demande de convertir 8^u 17^f 7^d en deniers , comme la livre vaut 20^f , on multipliera les 8^u par 20 (52) , ce qui donnera 160^f auxquels joignant les 17^f , on aura 177^f , qu'on multipliera par 12 , parce que chaque sol vaut 12 deniers , & on aura 2124 deniers , lesquels , joints aux 7 deniers , donnent 2131 deniers pour la valeur de 8^u 17^f 7^d , convertis en deniers.

Si l'on demande combien une année commune, ou 365 jours , 5 heures , 48 minutes , ou 365^j 5^h 48^m valent de minutes ; comme le jour est de 24 heures , on multipliera 24^h par 365 , & au produit 8760^h on ajoutera 5^h , on multipliera le total 8765 par 60 (52) parce que l'heure contient 60 minutes , & on aura 525900 minutes , auxquelles ajoutant 48 minutes , on aura 525948 pour le nombre de minutes contenues dans une année commune.

Cette conversion des parties du tems est utile dans quelques opérations du *Pilotage*.

§ 8. L'abréviation dont nous avons parlé (§ 2), peut être employée pour réduire promptement en livres un certain nombre de *tonneaux* ; comme le tonneau de poids pèse 2000 livres, si l'on a, par exemple, 854 tonneaux, il n'y a qu'à doubler 854, & mettre les trois zéros à la suite du produit, on aura 1708000 pour le nombre de livres que pèsent 854 tonneaux.

Avant de terminer ce qui regarde la multiplication, faisons observer aux commençans, que ces expressions *doubler*, *tripler*, *quadrupler*, &c. signifient la même chose que multiplier par 2, par 3, par 4, &c.

De la Division des Nombres entiers, & des Parties Décimales.

§ 9. Diviser un nombre par un autre ; c'est, en général, chercher combien de fois le premier de ces deux nombres contient le second.

Le nombre qu'on doit diviser, s'appelle

Dividende ; celui par lequel on doit divi-
fer , *Diviseur* ; & celui qui marque com-
bien de fois le dividende contient le divi-
seur , s'appelle le *Quotient*.

On n'a pas toujours pour but dans la
division , de savoir combien de fois un
nombre en contient un autre ; mais on fait
l'opération dans tous les cas , comme si elle
tendoit à ce but , c'est pourquoi on peut ,
dans tous les cas , la considérer comme
l'opération par laquelle on trouve combien
de fois le dividende contient le diviseur.

Il suit delà , que si on multiplie le di-
viseur par le quotient , on doit reproduire
le dividende , puisque c'est prendre ce di-
viseur autant de fois qu'il est dans le divi-
dende : cela est général , soit que le quo-
tient soit un nombre entier , soit qu'il soit
un nombre fractionnaire.

Quant à l'espece des unités du quotient ;
ce n'est ni par l'espece de celles du dividen-
de , ni par l'espece de celles du diviseur ,
ni par l'une & l'autre qu'il faut en juger ;
car le dividende & le diviseur restant les
mêmes , le quotient qui sera aussi toujours
le même numériquement , peut être fort
différent pour la nature de ses unités , selon
la question qui donne lieu à cette division.

Par

Par exemple, s'il est question de savoir combien 8^{e} contiennent 4^{e} , le quotient sera un nombre abstrait qui marquera 2 fois. Mais s'il est question de savoir combien pour 8^{e} on fera faire d'ouvrage à raison de 4^{e} la toise, le quotient sera 2 toises, qui est un nombre concret, & dont l'espece n'a aucun rapport avec le dividende ni avec le diviseur.

Mais on voit, en même-temps, que la question seule qui conduit à faire la division dont il s'agit, décide la nature des unités du quotient.

De la division d'un nombre composé de plusieurs chiffres, par un nombre qui n'en a qu'un.

60. L'opération que nous allons décrire suppose qu'on sache trouver combien de fois un nombre de un ou deux chiffres contient un nombre d'un seul chiffre. C'est une connoissance déjà acquise, quand on fait de mémoire les produits des nombres qui n'ont qu'un chiffre. On peut aussi, pour y parvenir, faire usage de la table que nous avons donnée ci-dessus (48). Par exemple si je veux savoir

Arithmétique. D

combien de fois 74 contient 9, je cherche le diviseur 9 dans la bande supérieure, & je descends verticalement jusqu'à ce que je rencontre le nombre le plus approchant de 74, c'est ici 72; alors le nombre 8 qui se trouve vis-à-vis 72, dans la première colonne, est le nombre de fois, ou le quotient que je cherche.

Cela supposé, voici comment se fait la division d'un nombre qui a plusieurs chiffres, par un nombre qui n'en a qu'un.

Ecrivez le diviseur à côté du dividende; séparez l'un de l'autre par un trait, & soulignez le diviseur sous lequel vous écrirez les chiffres du quotient, à mesure que vous les trouverez.

Prenez le premier chiffre sur la gauche du dividende, ou les deux premiers chiffres, si le premier ne contient pas le diviseur.

Cherchez combien ce premier ou ces deux premiers chiffres contiennent le diviseur; écrivez ce nombre de fois sous le diviseur.

Multipliez le diviseur par le quotient que vous venez d'écrire, & portez le produit sous la partie du dividende que vous venez d'employer.

Enfin retranchez le produit, de la partie supérieure du dividende à laquelle il répond, & vous aurez un reste.

A côté de ce reste, abaissez le chiffre suivant du dividende principal, & vous aurez un second dividende partiel, sur lequel vous opérerez comme sur le premier, plaçant le quotient à droite de celui qu'on a déjà trouvé, multipliant de même le diviseur par ce quotient, écrivant & retranchant le produit comme ci-devant.

Vous abaisserez, de même, à côté du reste de cette division, le chiffre du dividende, qui suit celui que vous avez abaissé, & vous continuerez toujours de la même manière jusqu'au dernier inclusivement.

Cette règle va être éclaircie par l'exemple suivant.

EXEMPLE.

On propose de diviser 8769 par 7.

J'écris ces deux nombres comme on les voit ci après,

$$\begin{array}{r|l}
 \text{dividende} & 7 \text{ diviseur} \\
 8769 & \hline
 7 & 1252 \frac{1}{7} \text{ quotient} \\
 \hline
 17 & \\
 14 & \\
 \hline
 36 & \\
 35 & \\
 \hline
 19 & \\
 14 & \\
 \hline
 5 &
 \end{array}$$

Et commençant par la gauche du dividende, je devrois dire en 8 mille, combien de fois 7 : mais je dis simplement en 8 combien de fois 7 ? Il y est une fois. Cet 1 est naturellement mille, mais les chiffres qui viendront après lui donneront sa véritable valeur ; c'est pourquoi j'écris simplement 1 sous le diviseur.

Je multiplie le diviseur 7 par le quotient 1, & je porte le produit 7 sous la partie 8 que je viens de diviser ; faisant la soustraction, j'ai pour reste 1.

Ce reste 1 est la partie de 8 qui n'a pas été divisée, & est une dizaine à l'égard du chiffre suivant 7 ; c'est pourquoi j'abaisse ce même chiffre 7, à côté, & je continue

l'opération, en disant en 17, combien de fois 7 ? 2 fois. J'écris ce 2 à la droite du premier quotient 1 qu'a donné la première opération.

Je multiplie, comme dans la première opération, le diviseur 7 par le quotient 2 que je viens de trouver ; je porte le produit 14 sous mon dividende partiel 17, & faisant la soustraction, il me reste 3 pour la partie qui n'a pu être divisée.

A côté de ce reste 3 j'abaisse 6, troisième chiffre du dividende, & je dis en 36 combien de fois 7 ? 5 fois : j'écris 5 au quotient.

Je multiplie le diviseur 7 par 5 ; & ayant écrit ce produit 35 sous mon nouveau dividende partiel, je l'en retranche ; & il me reste 1.

Enfin à côté de ce reste 1, j'abaisse le chiffre 9 du dividende, & je dis en 19 combien de fois 7 ? 2 fois ; j'écris 2 au quotient.

Je multiplie le diviseur 7, par ce nouveau quotient 2, & ayant écrit le produit 14 sous mon dernier dividende partiel 19, j'ai pour reste 5.

Je trouve donc que 8769 contiennent 7, autant de fois que le marque le quotient que nous avons écrit ; c'est-à-dire, 1252 fois, & qu'il reste 5.

A l'égard de ce reste, nous nous contenterons pour le présent de dire qu'on l'écrit à côté du quotient, comme on le voit dans cet exemple, c'est-à-dire, en écrivant le diviseur au dessous de ce reste, & séparant l'un de l'autre par un trait; & alors on prononce *cinq septiemes*. Nous expliquerons par la suite la nature de ces sortes de nombres.

61. Si dans la suite de l'opération, quelqu'un des dividendes partiels se trouvoit ne pas contenir le diviseur, on écrirait zéro au quotient, & omettant la multiplication, on abaisseroit tout de suite un autre chiffre à côté de ce dividende partiel, & on continueroit la division.

E X E M P L E.

Il s'agit de diviser 14464 par 8

$$\begin{array}{r}
 14464 \quad | \quad 8 \\
 \underline{8} \\
 64 \\
 \underline{64} \\
 064 \\
 \underline{64} \\
 0
 \end{array}$$

Je prends ici les deux premiers chiffres

du dividende , parce que le premier ne contient pas le diviseur.

Je trouve que 14 contient 8 , 1 fois , j'écris 1 au quotient ; je multiplie 8 par 1 , & je retranche le produit 8 de 14 , ce qui me donne pour reste 6 , à côté duquel j'abaisse le troisième chiffre 4 du dividende.

Je continue en disant , en 64 combien de fois 8 ? huit fois ; j'écris 8 au quotient , & faisant la multiplication , j'ai pour produit 64 que je retranche du dividende partiel 64 , il me reste 0 à côté duquel j'abaisse 6 , quatrième chiffre du dividende ; & comme 6 ne contient pas 8 , j'écris 0 au quotient , & j'abaisse tout de suite à côté de 6 le dernier chiffre du dividende qui est ici 4 , pour dire en 64 combien de fois 8 ? il y est 8 fois : après avoir écrit 8 au quotient , je fais la multiplication ; & je retranche le produit 64 : & comme il ne reste rien , j'en conclus que 14464 contiennent , 8 , 1808 fois.

*De la division par un nombre
de plusieurs chiffres.*

62. Lorsque le diviseur aura plusieurs chiffres , on se conduira de la manière suivante.

D 4

Prenez sur la gauche du dividende autant de chiffres qu'il est nécessaire pour contenir le diviseur.

Cela posé, au lieu de chercher comme ci-devant, combien la partie du dividende que vous avez prise, contient votre diviseur entier, cherchez seulement combien de fois le premier chiffre de votre diviseur est compris dans le premier chiffre de votre dividende, ou dans les deux premiers si le premier ne suffit pas; marquez ce quotient sous le diviseur comme ci-devant.

Multipliez successivement, selon la règle donnée (50), tous les chiffres de votre diviseur, par ce quotient, & portez à mesure, les chiffres du produit sous les chiffres correspondans de votre dividende partiel. Faites la soustraction, & à côté du reste abaissez le chiffre suivant du dividende, pour continuer l'opération de la même manière.

Nous allons éclaircir ceci par quelques exemples, & prévenir en même temps les cas qui peuvent causer quelque embarras.

DE MATHÉMATIQUES. 57.

EXEMPLE.

On propose de diviser 75347 par 53.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 75\overline{)347} \\
 \underline{53} \\
 223 \\
 \underline{212} \\
 114 \\
 \underline{106} \\
 87 \\
 \underline{53} \\
 34
 \end{array}
 \end{array}$$

Je prends seulement les deux premiers chiffres du dividende , parce qu'ils contiennent le diviseur , & au lieu de dire en 75 combien de fois 53 , je cherche seulement combien les 7 dizaines de 75 contiennent le 5 dizaines de 53 , c'est-à-dire , combien 7 contient 5 : je trouve une fois que j'écris au quotient.

Je multiplie 53 par 1 , & je porte le produit 53 sous 75 : la soustraction faite il reste 22 , à côté duquel j'abaisse le chiffre 3 du dividende , & je poursuis , en disant , pour plus de facilité , en 22

combien de fois 5, (au lieu de dire en 223 combien de fois 53); je trouve 4 fois que j'écris au quotient.

Je multiplie successivement par 4 les deux chiffres du diviseur, & je porte le produit 212, sous mon dividende partiel 223; la soustraction faite, j'ai pour reste 11; j'abaisse à côté de ce reste, le chiffre 4 du dividende, & je dis simplement, comme ci-dessus, en 11 combien de fois 5? 2 fois; je l'écris au quotient, & je multiplie 53 par 2, ce qui me donne 106 que j'écris sous le dividende partiel 114; faisant la soustraction, j'ai pour reste 8, à côté duquel j'abaisse le dernier chiffre 7; je divise de même 87, & continuant comme ci-dessus, je trouve 1 pour quotient, & 34 pour reste que j'écris à côté du quotient, de la manière qui a été indiquée plus haut (60).

63. On devroit, à la rigueur, chercher combien de fois chaque dividende partiel contient le diviseur entier; mais comme cette recherche seroit souvent longue & pénible, on se contente, comme on vient de le voir, de chercher combien la partie la plus forte de ce dividende contient la partie la plus forte du diviseur. Le quotient qu'on trouve p

cette voie n'est pas toujours le véritable, parce qu'en prenant ce parti, on ne fait réellement qu'une estimation approchée ; mais outre que cette estimation met presque toujours sur le but, & que dans les cas où elle n'y met pas, elle en écarte peu ; la multiplication qui vient ensuite, sert à redresser ce qu'il peut y avoir de défectueux dans ce jugement. En effet, si le dividende partiel contenoit réellement le diviseur trois fois, par exemple, & que par l'essai qu'on fait, on eût trouvé qu'il le contient 4 fois, il est facile de voir qu'en faisant la multiplication par 4, on auroit un produit plus grand que le dividende ; puisqu'on prendroit le diviseur plus de fois qu'il n'est réellement dans ce dividende, & par conséquent la soustraction deviendra impossible ; alors on diminuera le quotient successivement d'une, deux, &c. unités, jusqu'à ce qu'on trouve un produit qu'on puisse retrancher : au contraire, si l'on n'avoit mis que 2 au quotient, le reste de la soustraction se trouveroit plus grand que le diviseur ; ce qui prouveroit que le diviseur y est encore contenu, & que par conséquent le quotient est trop foible.

Au reste, on acquiert en peu de temps l'usage de prévoir de combien on doit diminuer ou augmenter le quotient que donne la première épreuve.

EXEMPLE II.

On propose de diviser 189492 par 375.

$$\begin{array}{r}
 189492 \quad | \quad \begin{array}{r} 375 \\ \hline 505 \frac{117}{375} \end{array} \\
 \underline{1875} \\
 1992 \\
 \underline{1875} \\
 117
 \end{array}$$

Je prends les quatre premiers chiffres du dividende, parce que les trois premiers ne contiennent pas le diviseur.

Je dis, ensuite, en 18 seulement, combien de fois 3 ? il y est réellement 6 fois ; mais en multipliant 375 par 6, j'aurois plus que mon dividende 1894, c'est pourquoi j'écris seulement 5 au quotient. Je multiplie 375 par 5, & après avoir écrit le produit, sous 1894, je fais la soustraction, & j'ai pour reste 19.

J'abaisse à côté de 19, le chiffre 9 du dividende ; & comme 199 que j'ai alors, ne contient pas 375, je pose 0 au quotient,

DE MATHÉMATIQUES. 61

& j'abaisse à côté de 199, le chiffre 2 du dividende, ce qui me donne 1992 pour lequel je dis, en 19 seulement, combien de fois 3 ? six fois. Mais par la même raison que ci-dessus, je n'écris au quotient, que 5 : & après avoir opéré comme ci-devant, j'ai pour reste 117.

64. Voici une réflexion qui peut servir à éviter dans un grand nombre de cas, les tentatives inutiles. On est principalement exposé à ces essais douteux, lorsque le second chiffre du diviseur est sensiblement plus grand que le premier. Dans ce cas, au lieu de chercher combien le premier chiffre du diviseur est contenu dans la partie correspondante du dividende, il faut chercher combien ce premier chiffre augmenté d'une unité, se trouve contenu dans la partie correspondante du dividende; cette épreuve sera toujours beaucoup plus approchante que la première.

E X E M P L E.

On propose de diviser 1832 par 288.

$$\begin{array}{r} 1832 \overline{) 288} \\ 1728 \\ \hline 104 \end{array}$$

Au lieu de dire en 18 combien de fois 2 ; je dirai en 18 combien de fois 3 , parce que le diviseur 288 approche beaucoup plus de 300 que de 200 , je trouve 6 qui est le véritable quotient , au lieu que j'aurois trouvé 9 , & j'aurois par conséquent été obligé de faire trois essais inutiles.

*Moyens d'abrégér la Méthode
précédente.*

65. C'est pour rendre la méthode plus facile à saisir , que nous avons prescrit d'écrire sous chaque dividende partiel , le produit qu'on trouve en multipliant le diviseur par le quotient ; mais comme le but de l'Arithmétique doit être d'abrégér les opérations , nous croyons devoir faire remarquer qu'on peut se dispenser d'écrire ces produits , & faire la soustraction à mesure qu'on a multiplié chaque chiffre du diviseur. L'exemple suivant suffira pour faire entendre comment se fait cette soustraction.

E X E M P L E.

On peut diviser 756984 par 932.

$$\begin{array}{r}
 756984 \quad | \quad \begin{array}{r} 812 \\ \hline 200 \end{array} \\
 \begin{array}{r} 1138 \\ 2064 \\ \hline 200 \end{array}
 \end{array}$$

Après avoir pris les quatre premiers chiffres du dividende, qui sont nécessaires pour contenir le diviseur, je trouve que 75 contient 9, 8 fois; c'est pourquoi j'écris 8 au quotient; & au lieu de porter sous 7569, le produit de 932 par 8, je multiplie d'abord 2 par 8, ce qui me donne 16; mais comme je ne puis ôter 16 de 9, j'emprunte sur le chiffre suivant 6 une dizaine, qui jointe à 9 me donne 19, duquel ôtant 16, il me reste 3 que j'écris au-dessous.

Pour tenir compte de cette dizaine empruntée, au lieu de diminuer d'une unité le chiffre 6 sur lequel j'ai emprunté, je retiens cette unité que je vais ajouter au produit suivant; ainsi continuant la multiplication, je dis 8 fois 3 font 24, & 1 que j'ai retenu font 25; comme je ne puis ôter 25 de 6, j'emprunte sur le chiffre

suivant 5 du dividende, deux dixaines, qui jointes à 6, me donnent 26, desquelles j'ôte 25, & il me reste 1 que j'écris sous 6; par-là j'ai tenu compte de la premiere dixaine dont j'aurois dû diminuer 6, parce que j'ai retranché une dixaine de plus. Je tiendrai, de même, compte des deux dixaines que je viens d'emprunter. Je continue donc, en disant 8 fois 9 font 72, & 2 que j'ai empruntés font 74, lesquels ôtés de 75, il reste 1.

J'abaisse à côté du reste 113 le chiffre 8 du dividende, & je continue de la même maniere, en disant en 11 combien de fois 9? 1 fois; puis une fois 2 fait 2, qui ôtés de 8 il reste 6; 1 fois 3 fait 3, qui ôtés de 3, il reste 0; 1 fois 9 est 9, qui ôtés de 11 il reste 2. J'abaisse le chiffre 4 à côté du reste 206, & je dis en 20 combien de fois 9? 2 fois; & faisant la multiplication, 2 fois 2 font 4, qui ôtés de 4, il reste 0; 2 fois 3 font 6, qui ôtés de 6, il reste 0; & enfin 2 fois 9 font 18, qui ôtés de 20, il reste 2.

66. Il peut arriver dans le cours de ces divisions partielles, que le dividende contienne le diviseur plus de 9 fois; cependant on ne doit jamais mettre plus de

de 9 au quotient ; car si l'on pouvoit seulement mettre 10 , ce seroit une preuve que le quotient trouvé par l'opération précédente , seroit faux , puisque la dixaine qu'on trouveroit dans le quotient actuel , appartiendrait à ce premier quotient.

67. Si le dividende & le diviseur étoient suivis de zéros , on pourroit en ôter à l'un & à l'autre autant qu'il y en a à la suite de celui qui en a le moins. Par exemple , pour diviser 8000 par 400 , je diviserai seulement 80 par 4 ; car il est évident que 80 centaines ne contiennent pas plus 4 centaines , que 80 unités ne contiennent 4 unités.

De la Division des Parties Décimales.

68. Pour ne pas nous arrêter à des distinctions superflues , nous réduirons l'opération de la division des décimales à cette règle seule.

Mettez à la suite de celui des deux nombres proposés , qui a le moins de décimales , un nombre de zéros suffisant pour que le nombre des décimales soit le même dans chacun ; (cela ne changera rien à

Arithmétique.

E

la valeur de ce nombre (30) ; supprimez la virgule dans l'un & dans l'autre , & faites l'opération comme pour les nombres entiers ; il n'y aura rien à changer au quotient que vous trouverez.

E X E M P L E.

On propose de diviser 12,52 par 4,3 :

J'écris 12,52 | 4,3

Ou plutôt . . 12,52 | 4,30

en complétant le nombre des décimales.

Supprimant la virgule, j'ai 1252 à diviser par 430 ; faisant l'opération ,

$$\begin{array}{r} 1252 \quad | \quad 43 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 392 \quad | \quad 2\frac{302}{430} \\ \hline \end{array}$$

Je trouve 2 pour quotient, & 392 pour reste, c'est-à-dire, que le quotient est 2 & $\frac{392}{430}$.

Mais comme l'objet qu'on se propose quand on se sert de décimales, est d'éviter les fractions ordinaires ; au lieu d'écrire le reste 392 sous la forme de fraction, comme on vient de le faire, on continueroit l'opération comme dans l'exemple suivant.

E X E M P L E.

$$\begin{array}{r}
 1252 \overline{) 430} \\
 \underline{29116} \\
 3920 \\
 \underline{500} \\
 700 \\
 \underline{2700} \\
 120
 \end{array}$$

Après avoir trouvé le quotient , en entier , qui est ici 2 , on mettra à côté du reste 392 , un zéro qui , à la vérité , rendra ce reste dix fois trop grand ; on continuera de diviser par 430 , & ayant trouvé qu'il faudroit mettre 9 au quotient , on l'y mettra en effet , mais après avoir marqué la place des unités entières , en mettant une virgule après le 2 ; par ce moyen le 9 ne marquera plus que des dixièmes : après la multiplication & la soustraction faites , on mettra à côté du reste 50 , un zéro , ce qui est la même chose que si l'on en avoit mis d'abord deux à côté du dividende , mais en mettant après 9 , le quotient 1 qu'on trouvera , on lui donnera par-là sa véritable valeur , puisqu'alors il marque des centièmes ; on continuera ainsi tant

qu'on le jugera nécessaire. En s'en tenant à deux décimales, on a la valeur du quotient à moins d'un centieme d'unité près; en poussant jusqu'à trois chiffres, on a le quotient à moins d'un millieme près, & ainsi de suite; puisqu'on n'auroit pas pu mettre une unité de plus ou de moins, sans rendre le quotient trop fort ou trop foible.

Tous les restes de division peuvent être réduits ainsi en décimales.

Il reste à expliquer pourquoi la suppression de la virgule dans le dividende & dans le diviseur ne change rien au quotient, lorsqu'on a rendu le nombre des décimales le même dans chacun de ces deux nombres: c'est ce qu'il est aisé d'appercevoir, parce que dans l'exemple ci-dessus, le dividende 12,52, & le diviseur 4,30 ne sont autre chose que 1252 centiemes & 430 centiemes, puisque les unités entieres valent des centaines de centiemes (22); or il est clair que 1252 centiemes ne contiennent pas autrement 430 centiemes, que 1252 unités ne contiennent 430 unités; donc la considération de la virgule est inutile quand on a complété le nombre des décimales.

69. Lorsqu'on n'a besoin de connoître le quotient d'une division, que jusqu'à un degré d'exactitude proposé, on peut abrégé le calcul, par la méthode suivante. Nous supposerons, d'abord, qu'on n'a besoin de connoître ce quotient, qu'à une unité près : nous ferons voir ensuite, comment on doit appliquer la méthode pour l'avoir aussi près qu'on voudra : voici la règle.

Supprimez, sur la droite du dividende, autant de chiffres, moins un, qu'il y en a dans le diviseur : faites, ensuite, la division, comme à l'ordinaire : s'il n'y a point de reste, vous mettrez à la suite du quotient, autant de zéros, que vous avez supprimé de chiffres dans le dividende. Mais s'il y a un reste, vous continuerez de diviser, non pas par le même diviseur qu'auparavant, ce qui n'est plus possible, mais par ce diviseur dont vous aurez supprimé le dernier chiffre de la droite : après cette division, vous diviserez le nouveau reste, par le diviseur précédent dont vous supprimerez le dernier chiffre sur la droite : & vous continuerez, ainsi, de diviser, en supprimant à chaque division, un chiffre sur la droite du diviseur.

E X E M P L E.

On veut avoir ; à moins d'une unité près, le quotient de 8789236487 divisé par 64423. Je supprime les quatre derniers chiffres de la droite du dividende, & je divise 878923, par le diviseur proposé 64423.

$$\begin{array}{r|l}
 878923 & 64423 \\
 \hline
 234693 & 136430 \\
 41424 & \cdot \cdot 6442 \\
 2772 & \cdot \cdot 644 \\
 196 & \cdot \cdot 64 \\
 4 & \cdot \cdot 6
 \end{array}$$

Je trouve, d'abord, 13 pour quotient, & 41424 pour reste : je divise donc les 41424, par 6442, en supprimant le dernier chiffre 3 du diviseur : j'ai pour quotient 6, que j'écris à la suite du premier quotient 13 ; & le reste est 2772 que je divise par 644, en supprimant encore un chiffre sur la droite du diviseur primitif : j'ai pour quotient 4, que

J'écris à la suite du quotient principal 136 ; le reste est 198 que je divise par 64 , en supprimant encore un chiffre dans le diviseur : le quotient est 3 , & le reste , 4. Enfin , je divise par 6 , & j'ai 0 pour quotient ; en sorte que le quotient de 8789236487 divisé par 64423 , est 136430 , à moins d'une unité près. En effet , le quotient exact est

136430 $\frac{6597}{0.423}$.

Il n'est pas indispensable d'écrire , à chaque fois , comme nous l'avons fait , le nouveau diviseur ; on peut se contenter de barrer , dans le diviseur primitif , chaque chiffre à mesure qu'on passe à une nouvelle division : ce n'a été que pour rendre l'opération plus sensible , que nous avons écrit ces diviseurs à côté des restes successifs.

70. Si le reste de la première division se trouvoit plus petit que n'est le diviseur après qu'on en a supprimé le dernier chiffre , on mettroit zéro au quotient ; & s'il se trouvoit encore plus petit que ne seroit ce diviseur après qu'on en a encore ôté le dernier des chiffres restans , on mettroit encore un zéro au quotient , & ainsi de suite.

EXEMPLE.

Pour avoir , à moins d'une unité près , le quotient de 55106054 divisé par 643 ; je divise comme à l'ordinaire , la partie 551060 qui reste après la suppression des deux derniers chiffres du dividende proposé.

551060	643	
3666	85701	
4510	64	
009	6	
9	.	
9	.	
3	.	

J'ai pour quotient 857 , & 9 pour reste : il faut donc diviser ce reste , par 64 seulement ; comme 9 ne contient pas ce diviseur , je mets 0 au quotient , & j'ai encore pour reste , 9 , que je divise par 6 seulement ; en sorte que le quotient cherché , est 85701 , à moins d'une unité près.

71. Si lorsqu'on commence de l'opération on suppose sur la droite du dividende , les chiffres que la règle

prescrit de supprimer, il se trouve que les chiffres restans ne contiennent pas le diviseur, on supprimera tout de suite, sur la droite du diviseur, autant de chiffres qu'il est nécessaire pour que le diviseur y soit contenu.

E X E M P L E.

On veut avoir, à moins d'une unité près, le quotient de 1611527 divisé par 64524.

Je supprime les quatre chiffres 1527 de la droite du dividende. Mais comme les chiffres restans 161 ne peuvent pas être divisés par 64524, je supprime dans ce diviseur, les trois derniers chiffres 524 qui doivent être supprimés pour que ce diviseur soit contenu dans le dividende restant 161; ainsi je divise 161 par 64, en opérant comme dans l'exemple précédent,

$$\begin{array}{r|l} & 64 \\ 161 & 25 \\ \hline 33 & . 6 \\ 3 & \end{array}$$

& j'ai 25 pour le quotient de 1611527 divisé par 64524, à moins d'une unité près : en effet, le quotient exact est $24\frac{62952}{64524}$ qui est beaucoup plus près de 25 que de 24.

72. A mesure qu'on supprime un chiffre dans le diviseur, il convient, pour plus d'exactitude, d'augmenter d'une unité, le dernier de ceux qui restent, si celui qu'on supprime, est au-dessus de 5 ou égal à 5. On augmentera de même, d'une unité le dernier des chiffres qui restent dans le dividende, après la suppression que la règle prescrit, si ceux-ci surpassent ou 5, ou 50, ou 500, selon qu'il y en a 1 ou 2, ou 3, &c.

E X E M P L E.

On veut avoir, à moins d'une unité près, le quotient de 8657627 divisé par 1987.

Je divise donc 8658 par 1987, comme il suit,

$$\begin{array}{r|l} & 1987 \\ 8658 & 4357 \\ \hline 710 & . 199 \\ 113 & . 20 \\ 13 & . 2 \end{array}$$

C'est-à-dire qu'au lieu de diviser le reste 710 par 198 seulement, je le divise par 199, parce que le dernier chiffre 7, que je supprime, est au-dessus de 5. Même raison pour la division suivante. Mais comme le dernier diviseur qui est contenu 6 fois $\frac{1}{2}$ dans 13 est un peu trop fort, je mets 7 au quotient, pour compenser.

73. Maintenant, il est facile de voir ce qu'il y a à faire, lorsqu'on veut avoir le quotient beaucoup plus exactement. Par exemple, si l'on vouloir avoir le quotient, à un dix-millième d'unité près, la question se réduiroit à mettre autant de zéros (ici, ce seroit quatre) à la suite du dividende, qu'on veut avoir de décimales au quotient; après quoi, on fera la division selon la méthode actuelle. Et lorsqu'on aura trouvé le quotient, à moins d'une unité près, on en séparera sur la droite, par une virgule, autant de chiffres, qu'on veut avoir de décimales.

E X E M P L E.

On veut avoir, à moins d'un dix-millième d'unité près, le quotient de 6927 divisé par 4532; je mets quatre zéros à la suite de 6927, & la question se réduit à avoir, à moins d'une unité près, le quotient de 69270000 divisé par 4532; c'est-à-dire, conformément à la règle ci-dessus, à diviser 69270 par 4532, comme il suit,

$$\begin{array}{r}
 69270 \quad | \quad 4532 \\
 23950 \quad | \quad 15285 \\
 1290 \quad \cdot \quad 453 \\
 384 \quad \cdot \quad 45 \\
 24 \quad \cdot \quad 5
 \end{array}$$

Le quotient cherché est donc, 1,5285, à moins d'un dix-millième d'unité près.

S'il y avoit des décimales dans le dividende, ou dans le diviseur, ou dans tous les deux, on les ramèneroit d'abord à n'en point avoir, selon ce qui a été dit (68), après quoi on opéreroit comme dans ce dernier exemple.

Donc si l'on vouloir réduire une fraction proposée en décimales, on y parviendroit promptement par cette méthode, ayant égard à ce qui a été dit (71).

Mais on peut vérifier ces opérations par un moyen plus prompt que nous allons exposer : il ne faut pas , pour cela , négliger les réflexions que nous venons de faire : elles seront utiles dans beaucoup d'autres occasions.

Preuve par 9.

76. Supposons qu'après avoir multiplié 65498 par 454, & trouvé que le produit est 29736092, on veuille éprouver si ce produit est exact.

On ajoutera tous les chiffres 6, 5, 4, 9, 8, du multiplicande, comme s'ils ne contenoient que des unités simples, & on retranchera 9 à mesure qu'il se trouvera dans la somme ; on aura un reste qui sera ici 5.

On ajoutera pareillement les chiffres 4, 5, 4 du multiplicateur, & retranchant pareillement tous les 9 que produira cette addition, on aura pour reste 4.

On multipliera le reste 5 du multiplicande par le reste 4 du multiplicateur, & du produit 20, on retranchera les 9 qu'il peut renfermer ; il restera 2.

Si le produit est exact, il faut qu'ajoutant de même tous les chiffres 2, 9, 7, 3, 6, 0, 9, 2, de ce produit, & retranchant

tous les 9, il ne reste aussi que 2; ce qui a lieu en effet.

Cette règle est fondée sur ce principe; que pour avoir le reste de la soustraction de tous les 9 qu'un nombre peut renfermer, il n'y a qu'à chercher le reste que ces chiffres ajoutés comme des unités simples; donneroient après la suppression des 9.

En effet, si d'un nombre exprimé par un seul chiffre suivi de plusieurs zéros, on retranche tous les 9, le reste sera exprimé par ce seul chiffre: si de 4000 ou de 500 ou de 60000 vous retranchez tous les 9, le reste sera 4 ou 5 ou 6, &c. ce qui est aisé à voir.

Donc le reste que donneroit, par la suppression des 9, un nombre tel que 65498, (qui est la même chose que 60000, plus 5000, plus 400, plus 90, plus 8), sera le même que celui que donneroient 6, plus 5, plus 4, plus 9, plus 8; c'est-à-dire; le même que si l'on ajoutoit ses chiffres comme contenant des unités simples.

En voici maintenant l'application à la preuve de la multiplication.

Puisque 65498 est composé d'un certain nombre de 9 & d'un reste 5, & que le multiplicateur 454 est composé aussi d'un

Certain nombre de 9, & d'un reste 4, il ne peut s'en falloir que du produit de 5 par 4 ou 20 que le produit total ne soit divisible par 9; ou en ôtant les 9, il ne doit s'en falloir que de 2, que le produit total ne soit divisible par 9: donc il doit rester au produit la même quantité que dans le produit des deux restes après la suppression des 9 qu'il renferme.

On pourroit faire aussi cette preuve de la même manière par le nombre 3.

A l'égard de la division, elle devient facile à éprouver, après ce qui a été dit (70). Après avoir ôté du dividende le reste qu'a donné la division, on regardera le résultat comme un produit dont le diviseur & le quotient sont les facteurs, & par conséquent on y appliquera la preuve par 9; de la même manière qu'on vient de le faire.

A parler exactement, cette vérification n'est pas infail-
 lible, parce que, dans la multiplication, par exemple, si l'on s'étoit trompé de quelques unités sur quelque chiffre du produit, & qu'en même tems on eût fait une erreur égale, mais en sens contraire, sur quelque autre chiffre du même produit; comme cela ne changeroit rien au reste que l'on auroit après la suppression des 9, cette règle ne seroit point appercevoir l'erreur; mais comme il faut, ainsi qu'on le voit, au moins deux erreurs, & deux erreurs qui se compensent, ou qui ne diffèrent que d'un certain nombre de fois 9, les cas où cette vérification seroit fautive, seront très-rare dans l'usage.

*Quelques usages de la Regle
précédente.*

77. La division sert non - seulement à trouver combien de fois un nombre en contient un autre , mais encore à partager un nombre en parties égales. Prendre la moitié , le tiers , le quart , le cinquieme , le vingtieme , le trentieme , &c. d'un nombre ; c'est diviser ce nombre par 2 , 3 , 4 , 5 , 20 , 30 , &c. ou le partager en 2 , 3 , 4 , 5 , 20 , 30 , &c. parties égales , pour prendre une de ces parties.

La division sert encore à convertir les unités d'une certaine espece , en unités d'une espece supérieure ; par exemple , un certain nombre de deniers en sols , & ceux - ci en livres. Pour réduire 5864 deniers en sols , on remarquera que puisqu'il faut 12 deniers pour faire un sol , autant de fois il y aura 12 deniers dans 5864 deniers , autant il y aura de sols ; il faut donc diviser par 12 , & on trouvera 488^f & 8^d de reste. Pour réduire en livres les 488^f on divisera 488 par 20 , puisqu'il faut 20^f pour faire la livre ; & on aura en total 24 livres 8 sols 8 deniers.

A l'occasion de cette division par 20 ,

remarquons que quand on a à diviser par un nombre suivi de zéros, on peut abrégér l'opération en séparant sur la droite du dividende autant de chiffres qu'il y a de zéros; on divise la partie qui reste à gauche, par les chiffres significatifs du diviseur; s'il y a un reste, on écrit à la suite, les chiffres qu'on a séparés, ce qui donne le reste total. Par exemple, pour diviser 5834, par 20; je sépare le dernier chiffre 4, & je divise par 2, la partie restante 583; j'ai pour quotient 291, & 1 pour reste; j'écris à côté de ce reste 1, le chiffre séparé 4, ce qui me donne 14 pour reste total; en sorte que le quotient est $291 \frac{14}{20}$.

Cette abréviation peut être appliquée à la réduction de la charge d'un navire en tonneaux de poids: si l'on fait que la charge est de 2584954 livres; pour la réduire en tonneaux, c'est-à-dire, pour diviser par 2000; on séparera les trois derniers chiffres de la droite, & prenant la moitié des autres on aura 1292 tonneaux & 954 livres.

Quand on veut évaluer en livres & sols le vingtième d'un nombre de livres proposé, il suit de cette règle, que l'opération se réduit à compter le dernier chiffre pour des sols, & prendre moitié des autres chiffres que l'on comp-

tera pour des livres. Si en prenant cette moitié, il reste une unité, on la comptera pour une dizaine de sols qu'on placera à la gauche du chiffre qu'on a séparé d'abord. Par exemple, si l'on veut avoir le vingtième de 54672 liv. on séparera le dernier chiffre 2 que l'on comptera pour 2 sols ; & prenant la moitié de 5467 qui est 2733 avec une unité de reste, on écrira 2733 livres 12 sols : la raison de cette règle est évidente, en faisant attention que 54672 liv. est 54660 liv. plus 12 livres ; or le vingtième de 54660 est évidemment 2733, & celui de 12 liv. est 12 sols, puisque le vingtième d'une livre est un sol. S'il y avoit des sols & deniers dans la somme proposée, on négligeroit les deniers, dont la vingtième partie ne peut jamais faire un denier. A l'égard des sols, on les tripleroit ; & prenant le cinquième, on le porteroit aux deniers. Ainsi le vingtième de 54672 liv. 17 sols 7 deniers, est 2733 liv. 12 sols 10 deniers.

S'il s'agissoit d'avoir le dixième d'un nombre de livres, on sépareroit le dernier chiffre, & l'ayant doublé, on le compteroit pour des sols ; & on compteroit comme des livres, tous les chiffres restans sur la gauche. Ainsi le dixième de 67987 liv. est 6798 liv. 14 sols. La raison pour laquelle on double le dernier chiffre, est que le dixième d'une livre, est 2 sols.

On a assez souvent besoin de prendre les quatre deniers pour livre, d'une somme proposée : cela se réduit à en prendre d'abord le vingtième, comme il vient d'être dit : puis prendre le tiers de ce vingtième. Ainsi pour avoir les quatre deniers pour livre de 8762 livres, j'en prends le vingtième qui est 438 liv. 2 sols, dont le tiers 146 liv. 0 sol 8 deniers forme les quatre deniers pour livre, de 8763 liv. En effet, les quatre deniers pour livre, ne sont autre chose que le soixantième ; puisque 4 deniers sont contenus 60 fois dans la livre. Or le soixantième est le tiers du vingtième.

Des Fractions.

78. Les fractions considérées arithmétiquement sont des nombres par lesquels
on

on exprime les quantités plus petites que l'unité.

Pour se faire une idée nette des fractions, il faut concevoir que la quantité qu'on a prise d'abord pour unité, est elle-même composée d'un certain nombre d'unités plus petites, comme l'on conçoit, par exemple, que la livre est composée de vingt parties ou de vingt unités plus petites qu'on appelle sols.

Une ou plusieurs de ces parties forment ce qu'on appelle une fraction de l'unité. On donne aussi ce nom aux nombres qui représentent ces parties.

79. Une fraction peut être exprimée en nombres, de deux manières qui sont chacune en usage.

La première manière consiste à représenter, comme les nombres entiers, les parties de l'unité que contient la quantité dont il s'agit; mais alors on donne un nom particulier à ces parties: ainsi pour marquer 7 parties dont on en conçoit 20 dans la livre, on emploieroit le chiffre 7, mais on prononceroit 7 sols, & on écriroit 7 s.: cette manière de marquer les parties de l'unité, a lieu dans les nombres complexes dont nous parlerons par la suite.

Arithmétique.

E

80. Mais comme il faudroit un signe particulier pour chaque division qu'on pourroit faire de l'unité, on évite cette multiplicité de signes, en marquant une fraction par deux nombres placés l'un au-dessous de l'autre, & séparés par un trait. Ainsi, pour marquer les 7 parties dont il vient d'être question, on écrit $\frac{7}{10}$; c'est-à-dire, qu'en général, on écrit d'abord le nombre qui marque combien la quantité dont il s'agit, contient de parties de l'unité; & on écrit au-dessous de ce nombre, celui qui marque combien on conçoit de ces parties dans l'unité.

81. Et pour énoncer une fraction, on énonce d'abord le nombre supérieur (qui s'appelle *le numérateur*); ensuite le nombre inférieur (qui s'appelle *le dénominateur*); mais on ajoute au nom de celui-ci la terminaison *ième*: par exemple, pour énoncer $\frac{7}{10}$ on prononcera *sept vingtièmes*. Pour énoncer $\frac{4}{5}$, on prononcera *quatre cinquièmes*; & par cette expression *quatre cinquièmes*, on doit entendre quatre parties, dont il en faudroit cinq pour composer l'unité.

Il faut seulement excepter de la terminaison générale, les fractions dont le dé-

nominateur est 2 ou 3 ou 4, qui se prononcent, *moitiés* ou *demis*, *tiers*, *quarts*. Ainsi ces fractions $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, se prononceroient un *demi*, *deux tiers*, *trois quarts*.

82. Le numérateur marque donc combien la quantité représentée par la fraction contient de parties de l'unité; & le dénominateur fait connoître de quelle valeur sont ces parties, en marquant combien il en faut pour composer l'unité. On lui donne le nom de dénominateur, parce que c'est lui, en effet, qui donne le nom à la fraction, & qui fait que dans ces deux fractions, par exemple, $\frac{3}{5}$ & $\frac{2}{7}$, les parties de la première s'appellent des *cinquièmes*, & les parties de la seconde, des *septièmes*.

83. Le numérateur & le dénominateur s'appellent aussi, d'un nom commun, les deux *termes de la fraction*.

Des Entiers considérés sous la forme de Fraction.

84. Les opérations qu'on fait sur les fractions, conduisent souvent à des résultats fractionnaires dont le numérateur est plus grand que le dénominateur, par exemple, à des résultats tels que $\frac{8}{8}$, $\frac{27}{5}$, &c.

Ces sortes d'expressions ne sont pas des fractions proprement dites , mais ce sont des nombres entiers joints à des fractions.

85. Pour extraire les entiers qui s'y trouvent renfermés , il faut diviser le numérateur par le dénominateur. Le quotient marquera les entiers , & le reste de la division sera le numérateur de la fraction qui accompagne ces entiers. Ainsi $\frac{27}{5}$ donneront $5 \frac{2}{5}$, c'est-à-dire , cinq entiers & deux cinquièmes.

En effet , dans l'expression $\frac{27}{5}$, le dénominateur 5 fait connoître que l'unité est composée de 5 parties ; donc autant de fois il y aura 5 dans 27 , autant il y aura d'unités entières dans la valeur de la fraction $\frac{27}{5}$.

86. Les multiplications & les divisions des nombres entiers joints aux fractions exigent , du moins , pour la facilité , qu'on convertisse ces entiers en fraction.

On fait cette conversion en multipliant le nombre entier , par le dénominateur de la fraction en laquelle on veut réduire cet entier. Par exemple , si on veut convertir 8 entiers en cinquièmes , on multipliera 8 par 5 , & on aura $\frac{40}{5}$. En effet , lorsqu'on veut convertir 8 en cinquièmes , on re-

garde l'unité comme composée de 5 parties ; les 8 unités en contiendront donc 40 : pareillement $7\frac{4}{9}$ convertis en neuvièmes, feront $\frac{67}{9}$.

Des changemens qu'on peut faire subir aux deux termes d'une Fraction sans changer sa valeur.

87. Il est visible que plus on concevra de parties dans l'unité, & plus il faudra de ces parties pour composer une même quantité.

88. Donc on peut rendre le dénominateur d'une fraction, double, triple, quadruple, &c. sans rien changer à la valeur de la fraction, pourvu qu'en même temps on rende aussi le numérateur double, triple, quadruple, &c.

On peut donc dire en général qu'une fraction ne change point de valeur quand on multiplie ses deux termes par un même nombre.

Ainsi $\frac{1}{4}$ est la même chose que $\frac{6}{8}$; $\frac{1}{2}$ la même chose que $\frac{2}{4}$, que $\frac{3}{6}$, que $\frac{4}{8}$; &c.

89. Par un raisonnement semblable, on voit que moins on supposera de parties dans l'unité, moins il faudra de ces parties

pour former une même quantité ; que par conséquent on peut , sans changer une fraction , rendre son dénominateur 2 , 3 , 4 , &c. fois plus petit , pourvu qu'en même tems on rende son numérateur 2 , 3 , 4 , &c. fois plus petit ; & en général , *une fraction ne change point de valeur quand on divise ses deux termes par un même nombre.*

Pour voir distinctement la vérité de ces deux propositions , il suffit de se rappeler ce que c'est que le dénominateur , & ce que c'est que le numérateur d'une fraction.

Remarquons donc que multiplier ou diviser les deux termes d'une fraction par un même nombre , n'est point multiplier ou diviser la fraction ; puisque , comme nous venons de le dire , elle ne change point de valeur par ces opérations.

Les deux principes que nous venons de poser , sont la base des deux réductions suivantes qui sont d'un très-grand usage.

Réduction des Fractions à un même Dénominateur.

90. 1°. Pour réduire deux fractions à un même dénominateur , multipliez les

deux termes de la première, chacun par le dénominateur de la seconde; & les deux termes de la seconde, chacun par le dénominateur de la première.

Par exemple, pour réduire à un même dénominateur les deux fractions $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, je multiplie 2 & 3 qui sont les deux termes de la première fraction, chacun par 4 dénominateur de la seconde; & j'ai $\frac{8}{12}$ qui (88) est de même valeur que $\frac{2}{3}$. $\frac{2}{3} \times \frac{4}{4} =$
 $\frac{8}{12} \times \frac{3}{3} =$

Je multiplie de même, les deux termes 3 & 4 de la seconde fraction, chacun par 3 dénominateur de la première, & j'ai $\frac{9}{12}$ qui est de la même valeur que $\frac{3}{4}$; en sorte que les fractions $\frac{2}{3}$ & $\frac{3}{4}$ sont changées en $\frac{8}{12}$ & $\frac{9}{12}$, qui sont respectivement de même valeur que celles-là, & qui ont le même dénominateur entr'elles.

Il est aisé de voir que par cette méthode le dénominateur sera toujours le même pour chacune des deux nouvelles fractions, puisque dans chaque opération le nouveau dénominateur est formé de la multiplication des deux dénominateurs primitifs.

91. 2°. Si on a plus de deux fractions; on les réduira toutes au même dénominateur, en multipliant les deux termes de

chacune, par le produit résultant de la multiplication des dénominateurs des autres fractions.

Par exemple, pour réduire à un même dénominateur les quatre fractions $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{7}$, je multiplierai les deux termes 2 & 3 de la première, par le produit des trois dénominateurs 4, 5, 7 des autres fractions, produit que je trouve en disant: 4 fois 5 font 20, puis 7 fois 20 font 140; je multiplie donc 2 & 3, chacun par 140, & j'ai $\frac{280}{420}$, qui est de même valeur que $\frac{2}{3}$ (88).

Je multiplie pareillement les deux termes 3 & 4 de la seconde fraction, par le produit de 3, 5, 7, produit que je forme en disant: 3 fois 5 font 15, puis 7 fois 15 font 105; je multiplie donc 3 & 4 chacun par 105, ce qui me donne $\frac{315}{420}$, fraction de même valeur que $\frac{3}{4}$.

Passant à la troisième fraction, je multiplie ses deux termes 4 & 5 chacun par 84, produit des trois dénominateurs 3, 4 & 7, & j'ai $\frac{336}{420}$ au lieu de $\frac{4}{5}$.

Enfin pour la quatrième je multiplierai 5 & 7, chacun par le produit 60 des dénominateurs 3, 4, 5 des trois premières fractions, & j'aurai $\frac{300}{420}$ au lieu de $\frac{5}{7}$, en sorte

que les quatre fractions $\frac{3}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{7}$ sont changées en $\frac{280}{420}$, $\frac{315}{420}$, $\frac{336}{420}$, $\frac{300}{420}$, moins simples, à la vérité, que celles-là, mais de même valeur qu'elles, & plus susceptibles, par leur dénominateur commun, des opérations de l'addition & de la soustraction.

Remarquons que le dénominateur de chaque nouvelle fraction étant formé du produit de tous les dénominateurs primitifs, ce nouveau dénominateur ne peut manquer d'être le même pour chaque fraction.

Réduction des Fractions à leur plus simple expression.

92. Une fraction est d'autant plus simple, que ses deux termes sont de plus petits nombres. Il est souvent possible d'amener une fraction proposée, à être exprimée par de moindres nombres, & cela lorsque son numérateur & son dénominateur peuvent être divisés par un même nombre; comme cette opération n'en change point la valeur (89), c'est une simplification qu'on ne doit pas négliger.

Voici le procédé qu'il faudra suivre.

93. On divisera le numérateur & le dénominateur, chacun par 2, & on répétera cette division tant qu'elle pourra se faire exactement.

On divisera ensuite les deux termes par 3, & on continuera de diviser l'un & l'autre par 3, tant que cela pourra se faire.

On fera la même chose successivement avec les nombres, 5, 7, 11, 13, 17, &c. c'est-à-dire, avec les nombres qui n'ont aucun diviseur qu'eux-mêmes, ou l'unité, & qu'on appelle *nombres premiers*.

Ainsi la seule difficulté qu'il y ait, est de savoir quand est-ce qu'on pourra diviser par 2, 3, 5, &c.

On pourra dans cette recherche s'aider des principes suivans.

94. Tout nombre qui finit par un chiffre pair est divisible par 2.

Tout nombre dont la somme des chiffres ajoutés ensemble comme s'ils étoient des unités simples, fera 3 ou un *multiple* de 3, c'est-à-dire, un nombre exact de fois 3, sera divisible par 3. Par exemple, 54231 est divisible par 3, parce que ses chiffres 5, 4, 2, 3, 1 font 15, qui est 5 fois 3.

La même chose a lieu pour le nombre 9, si les chiffres ajoutés ensemble font 9, ou un multiple de 9.

Cette propriété du nombre 3 se démontre comme celle du nombre 9 à très-peu de chose près ; & l'un & l'autre se démontrent comme on l'a fait à la preuve de 9 (75).

Tout nombre terminé par un 5 ou par un zéro, est divisible par 5.

A l'égard du nombre 7 & des suivans ; quoiqu'il soit facile de trouver de pareilles règles, comme l'examen qu'elles supposent est aussi long que la division, il faudra essayer la division.

Proposons-nous, pour exemple, de réduire la fraction $\frac{2016}{1796}$. Je divise les deux termes par 2, parce que les deux derniers chiffres de chacun sont pairs, & j'ai $\frac{1008}{898}$. Je divise encore par 2 & j'ai $\frac{504}{449}$. Ce qui a été dit ci-dessus, m'apprend que je puis diviser par 3 ; je divise en effet & j'ai $\frac{168}{149}$; je divise encore par 3, ce qui me donne $\frac{56}{49}$; enfin j'essaye de diviser par 7 ; la division réussit & donne $\frac{8}{7}$.

La raison pour laquelle nous prescrivons de ne tenter la division que par les nombres premiers 2, 3, 5, 7, &c. c'est qu'après

avoir épuisé la division par 2, par exemple, il est inutile de tenter de diviser par 4, puisque si celle-ci pouvoit réussir, à plus forte raison la division par 2 auroit-elle pu encore se faire.

95. De tous les moyens qu'on peut employer pour réduire une fraction à une expression plus simple, le plus direct est celui de diviser les deux termes par le plus grand diviseur commun, qu'ils puissent avoir : voici la règle pour trouver ce plus grand diviseur.

Divisez le plus grand des deux termes par le plus petit ; s'il n'y a point de reste, c'est le plus petit terme qui est le plus grand diviseur commun.

S'il y a un reste divisez le plus petit terme par ce reste, & si la division se fait exactement, c'est ce premier reste qui est le plus grand diviseur commun.

Si cette seconde division donne un reste, divisez le premier reste par le second, & continuez toujours de diviser le reste précédent par le dernier reste jusqu'à ce que vous arriviez à une division exacte. Alors le dernier diviseur que vous aurez employé, sera le plus grand diviseur des deux termes de la fraction.

Si le dernier diviseur se trouve être l'unité, c'est une preuve que la fraction ne peut être réduite.

Prenons pour exemple la fraction $\frac{3760}{9024}$.

Je divise 9024 par 3760 ; j'ai pour quotient 2, & pour reste 1504.

Je divise 3760 par 1504 ; j'ai pour quotient 2, & pour reste 752.

Je divise le premier reste 1504 par le second reste 752 ; la division réussit, & j'en conclus que 752 peut diviser les deux termes de la fraction $\frac{3760}{9024}$, & la réduire à sa plus simple expression qu'on trouve, en faisant l'opération, être $\frac{5}{12}$.

En effet, on a trouvé que 752 divise 1504 ; il doit donc diviser 3760 qu'on a vu être composé de deux fois 1504, & de 752 ; on voit de même, qu'il doit diviser 9024, puisqu'il est composé de deux fois 3760, & de 1504.

On voit de plus que 752 est le plus grand diviseur commun que puissent avoir 3760 & 9024 ; car il ne peut y avoir

de diviseur commun entre 9024 & 3760 qui ne le soit en même temps de 3760 & 1504 ; & entre ces deux-ci , il ne peut y en avoir un qui ne soit en même temps diviseur commun de 1504 & de 752 ; mais il est évident qu'entre ces deux-ci , il ne peut y avoir de diviseur commun plus grand que 752 ; donc , &c.

Différentes manieres dont on peut envisager une fraction ; & conséquences qu'on peut en tirer.

96. L'idée que nous avons donnée jusqu'ici d'une fraction , est que le dénominateur représente de combien de parties l'unité est composée ; & le numérateur , combien il y a de ces parties dans la quantité que la fraction exprime.

On peut encore envisager une fraction sous un autre point de vue : on peut considérer le numérateur comme représentant une certaine quantité qui doit être divisée en autant de parties qu'il y a d'unités dans le dénominateur. Par exemple , dans $\frac{4}{5}$, on peut considérer 4 comme représentant quatre choses quelconques , 4 liv. par exemple , qu'il s'agit de partager en cinq parties ; car il est évident que c'est la même chose de partager 4 liv. en cinq parties pour prendre une de ces parties , ou de partager une livre en cinq parties

$$\frac{80}{10} \div \frac{20}{5}$$

pour prendre 4 de ces parties.

97. On peut donc considérer le numérateur d'une fraction comme un dividende, & le dénominateur comme un diviseur. On voit par-là, ce que signifient les restes de division mis sous la forme que nous leur avons donnée (60).

98. Il suit de là 1^o, qu'un entier peut toujours être mis sous la forme d'une fraction, en faisant de cet entier le numérateur, & lui donnant l'unité pour dénominateur; ainsi 8 ou $\frac{8}{1}$ sont la même chose; 5 ou $\frac{5}{1}$ sont la même chose.

99. 2^o Que pour convertir une fraction quelconque en décimales, il n'y a qu'à considérer le numérateur comme un reste de division où le dénominateur étoit diviseur, & opérer par conséquent, comme il a été dit (pag. 67), en observant de mettre d'abord un zéro au quotient pour tenir la place des unités; c'est ainsi qu'on trouvera que $\frac{3}{5}$ valent en décimales, 0, 6, que $\frac{5}{9}$ valent 0, 555, &c. que $\frac{1}{25}$ vaut 0, 04, & ainsi de suite.

C'est ainsi qu'on peut réduire en décimales, tout nombre complexe proposé. Par exemple, s'il s'agit de réduire 3^t 5^p 8^p 7^l en décimales de la toise, de manière à ne

pas négliger une demi-ligne : j'observe que la toise contient 864 lignes, & par conséquent 1728 demi-lignes ; il faut donc pour ne pas négliger les demi-lignes, porter l'exactitude au-delà des millièmes ; c'est-à-dire, jusqu'aux dix millièmes.

Cela posé, je réduis les 5^P 8^P 7^L tout en lignes ; & j'ai 823 lignes ou $\frac{823}{864}$ de la toise : réduisant cette fraction en décimales, comme il vient d'être dit, on a 0,9525, & par conséquent 3^T,9525, pour le nombre proposé.

Des opérations de l'Arithmétique sur les Fractions.

100. On fait sur les fractions les mêmes opérations que sur les nombres entiers. Les deux premières opérations, l'addition & la soustraction, exigent le plus souvent une opération préparatoire ; les deux autres n'en exigent pas.

De l'addition des Fractions.

101. Si les fractions ont le même dénominateur, on ajoutera tous les numérateurs, & on donnera à la somme, le dénominateur commun de ces fractions.

Ainsi pour ajouter $\frac{2}{7}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{5}{7}$, j'ajoute les numérateurs 2, 3 & 5, & j'ai par conséquent $\frac{10}{7}$ que je réduis à $1\frac{3}{7}$ (85).

102. Si les fractions n'ont pas le même dénominateur, on commencera par les y réduire par ce qui a été enseigné (90) & (91); après quoi on ajoutera ces nouvelles fractions de la manière qui vient d'être prescrite. Ainsi si l'on propose d'ajouter $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{5}$, je change ces trois fractions en ces trois autres $\frac{45}{60}$, $\frac{40}{60}$, $\frac{48}{60}$, dont la somme est $\frac{133}{60}$ qui se réduit à $2\frac{13}{60}$ (85).

De la soustraction des Fractions.

103. Si les deux fractions proposées ont le même dénominateur, on retranchera le numérateur de l'une, du numérateur de l'autre, & on donnera au reste; le dénominateur commun de ces deux fractions. S'il est question de retrancher $\frac{1}{9}$ de $\frac{8}{9}$, le reste sera $\frac{7}{9}$, qui se réduit à $\frac{1}{3}$ (93).

104. Si de $9\frac{4}{5}$ on vouloit retrancher $4\frac{7}{8}$ comme on ne peut ôter $\frac{7}{8}$ de $\frac{4}{5}$, on emprunteroit sur 9 une unité, laquelle réduite en huitièmes & ajoutée à $\frac{4}{5}$, feroit $\frac{13}{8}$, desquels ôtant $\frac{7}{8}$, il resteroit $\frac{6}{8}$; ôtant ensuite 4 de 8 qui restent après l'emprunt, il

il resteroit en tout $4\frac{6}{8}$ ou $4\frac{3}{4}$.

105. Si les fractions n'ont pas le même dénominateur, on les y réduira (90) & (91), après quoi on fera la soustraction comme il vient d'être dit. Ainsi pour ôter $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$, je change ces fractions en $\frac{8}{12}$ & $\frac{9}{12}$; & retranchant 8 de 9, il me reste $\frac{1}{12}$.

De la multiplication des Fractions.

106. Pour multiplier une fraction par une fraction, il faut multiplier le numérateur de l'une par le numérateur de l'autre, & le dénominateur par le dénominateur. Par exemple, pour multiplier $\frac{2}{3}$ par $\frac{4}{5}$, on multipliera 2 par 4, ce qui donnera 8 pour numérateur; multipliant pareillement 3 par 5, on aura 15 pour dénominateur, & par conséquent $\frac{8}{15}$ pour le produit.

Pour sentir la raison de cette règle, il faut se rappeler que multiplier un nombre par un autre, c'est prendre le multiplicande autant de fois que le multiplicateur contient d'unités. Ainsi multiplier $\frac{2}{3}$ par $\frac{4}{5}$, c'est prendre $\frac{4}{5}$ de fois la fraction $\frac{2}{3}$, ou, plus exactement, c'est prendre 4 fois la cinquième partie de $\frac{2}{3}$: or en multipliant le dénominateur 3 par 5, on change les tiers

Arithmétique.

G

en quinziemes, c'est - à - dire, en parties cinq fois plus petites; & en multipliant le numérateur 2 par 4, on prend ces nouvelles parties quatre fois; on prend donc quatre fois la cinquieme partie de $\frac{2}{3}$: on multiplie donc en effet $\frac{2}{3}$ par $\frac{4}{5}$.

107. Si l'on avoit un entier à multiplier par une fraction, ou une fraction à multiplier par un entier, on mettroit l'entier sous la forme de fraction, en lui donnant l'unité pour dénominateur; par exemple, si j'ai 9 à multiplier par $\frac{4}{7}$, cela se réduit à multiplier $\frac{9}{1}$ par $\frac{4}{7}$, ce qui, selon la regle qu'on vient de donner, produit $\frac{36}{7}$ qui se réduisent à $5\frac{1}{7}$.

On voit donc que pour multiplier une fraction par un entier, ou un entier par une fraction, l'opération se réduit à multiplier le numérateur de cette fraction, par l'entier.

108. S'il y avoit des entiers joints aux fractions, il faudroit, avant de faire la multiplication, réduire ces entiers chacun en fraction de même espece que celle qui l'accompagne; par exemple, si l'on a $12\frac{3}{4}$ à multiplier par $9\frac{3}{4}$, je change (86) le multiplicande en $\frac{63}{4}$, & le multiplicateur en $\frac{39}{4}$; & je multiplie $\frac{63}{4}$ par $\frac{39}{4}$, selon

$$\begin{array}{r} 12 \\ 5 \\ \hline 60 \\ 3 \\ \hline 63 \\ 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 4 \\ \hline 36 \\ 3 \\ \hline 39 \\ 4 \end{array}$$

la regle ci-dessus (106), ce qui me donne $\frac{2 \frac{1}{2} \frac{1}{10}}{10}$ qui valent $122 \frac{1}{20}$.

Division des Fractions.

109. *Pour diviser une fraction par une fraction, il faut renverser les deux termes de la fraction qui sert de diviseur, & multiplier la fraction dividende, par cette fraction ainsi renversée.*

Par exemple, pour diviser $\frac{4}{7}$ par $\frac{2}{3}$, je renverse la fraction $\frac{2}{3}$, ce qui me donne $\frac{3}{2}$, je multiplie $\frac{4}{7}$ par $\frac{3}{2}$, selon la regle donnée (106), & j'ai $\frac{12}{14}$ ou $1 \frac{2}{7}$ pour le quotient de $\frac{4}{7}$ divisé par $\frac{2}{3}$.

Pour appercevoir la raison de cette regle, il faut observer que diviser $\frac{4}{7}$ par $\frac{2}{3}$, c'est chercher combien de fois $\frac{2}{3}$ contiennent $\frac{4}{7}$; or il est facile de voir que, puisque le diviseur est 2 tiers, il sera contenu dans le dividende trois fois autant que s'il étoit 2 entiers; donc il faut diviser d'abord par 2 & multiplier ensuite par 3, ce qui n'est autre chose que prendre trois fois la moitié du dividende, ou le multiplier par $\frac{3}{2}$ qui est la fraction diviseur renversée.

110. Si l'on avoit une fraction à diviser par un entier, ou un entier à diviser,

par une fraction, on commenceroit par mettre l'entier sous la forme de fraction, en lui donnant l'unité pour dénominateur par exemple, si l'on a 12 à diviser par $\frac{5}{7}$ on réduira l'opération à diviser $\frac{12}{1}$ par $\frac{5}{7}$, ce qui, selon la règle qu'on vient de donner se réduit à multiplier $\frac{12}{1}$ par $\frac{7}{5}$, & donne $\frac{84}{5}$ ou $16\frac{4}{5}$. Pareillement, si l'on avoit $\frac{3}{4}$ à diviser par 5, on réduiroit l'opération à diviser $\frac{3}{4}$ par $\frac{5}{1}$, c'est-à-dire, à multiplier $\frac{3}{4}$ par $\frac{1}{5}$, ce qui donne $\frac{3}{20}$.

On voit donc que lorsqu'on a une fraction à diviser par un entier, l'opération se réduit à multiplier le dénominateur, par cet entier.

III. S'il y avoit des entiers, joints aux fractions, on réduiroit ces entiers chacun en fraction de même espèce que celle qui l'accompagne : par exemple, si l'on avoit $54\frac{2}{3}$ à diviser par $12\frac{2}{3}$, on changeroit le dividende en $\frac{272}{3}$, & le diviseur en $\frac{38}{3}$, & l'opération seroit réduite à diviser $\frac{272}{3}$ par $\frac{38}{3}$, c'est-à-dire, (109) à multiplier $\frac{272}{3}$ par $\frac{3}{38}$, ce qui donneroit $\frac{819}{19}$ ou $42\frac{9}{19}$.



Quelques applications des Regles précédentes.

112. Après ce que nous avons dit (96), il est aisé de voir comment on peut évaluer une fraction. Qu'on demande, par exemple, ce que valent les $\frac{5}{7}$ d'une livre. Puisque les $\frac{5}{7}$ d'une livre sont la même chose (96) que le septieme de 5 livres, je réduis les 5 livres en sols (57), & je divise les 100 sols qu'elles me donnent, par 7, ce qui me donne 14 sols pour quotient & 2 sols de reste; je réduis ces 2 sols en deniers, & je divise 24 deniers par 7, j'ai 3 deniers $\frac{3}{7}$, ainsi les $\frac{5}{7}$ d'une livre, sont 14 sols 3 deniers & $\frac{3}{7}$ de denier.

Si l'on demandoit les $\frac{5}{7}$ de 24 liv. il est visible qu'on pourroit d'abord prendre, comme nous venons de le faire, les $\frac{5}{7}$ d'une livre; & multiplier ensuite par 24, ce qu'auroit donné cette opération; mais il est plus commode de multiplier d'abord $\frac{5}{7}$ par 24 liv. ce qui (197) donne $\frac{120}{7}$ liv. & d'évaluer ensuite cette dernière fraction qu'on trouvera valoir 17 liv. 2 sols 10 deniers $\frac{2}{7}$.

113. Les fractions décimales n'ayant point de dénominateur, sont encore plus

faciles à évaluer : si l'on demande , par exemple , combien valent 0,532 de toise ; comme la toise est de 6 pieds , je multiplierai 0,532 par 6 , ce qui me donnera 3,192 pieds ; c'est-à-dire, 3^p & 0,192 de pied ; multipliant cette dernière fraction par 12 pour évaluer en pouces , on aura 2,304 pouces , c'est-à-dire , 2^p & 0,304 de pouce ; enfin multipliant celle-ci par 12 pour réduire en lignes , on aura 3,648 lignes , ou 3^l & 0,648 de ligne ; c'est-à-dire , que la valeur de la fraction 0,532 de toise , sera 3^p 2^{pl} 3^l & 0,648 de ligne.

II 4. L'évaluation des fractions nous conduit naturellement à parler des *fractions de fractions* : on appelle ainsi une suite de fractions séparées les unes des autres par l'article *de* ; par exemple , $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$; $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$ de $\frac{5}{6}$, &c. sont des fractions de fractions. On les réduit à une seule fraction , en multipliant tous les numérateurs entr'eux , & tous les dénominateurs entr'eux : en sorte que la fraction $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$ se réduit à $\frac{6}{12}$ ou $\frac{1}{2}$; la fraction $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$ de $\frac{5}{6}$ se réduit à $\frac{30}{72}$ ou $\frac{5}{12}$.

En effet , il est facile de voir que prendre les $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$ n'est autre chose que multiplier $\frac{3}{4}$ par $\frac{2}{3}$, puisque c'est prendre $\frac{2}{3}$ de

fois la fraction $\frac{3}{4}$. Pareillement prendre les $\frac{2}{3}$ des $\frac{3}{4}$ de $\frac{5}{6}$, revient à prendre les $\frac{6}{12}$ de $\frac{5}{6}$, puis que $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$ reviennent à $\frac{6}{12}$; & ce qu'on vient de dire, fait connoître que les $\frac{6}{12}$ de $\frac{5}{6}$ reviennent à $\frac{5}{12}$ ou $\frac{5}{12}$.

Si l'on demandoit les $\frac{3}{4}$ de $5\frac{3}{8}$, on convertiroit l'entier 5 en huitièmes, & la question seroit réduite à évaluer la fraction de fraction $\frac{3}{4}$ de $\frac{43}{8}$ qu'on trouveroit être $\frac{129}{32}$ ou $4\frac{1}{32}$.

Ajoutons à tout ce que nous avons dit sur les fractions, un exemple qui renferme plusieurs des regles que nous avons établies.

Supposons qu'on veut construire un vaisseau de 140 pieds $\frac{2}{3}$ de longueur; que les distances entre les sabords, en y comprenant l'espace entre le premier sabord & la rablure de l'étrave, & l'espace entre le dernier sabord & la rablure de l'étambot, fassent $108\frac{3}{4}$ pieds: on demande si l'on peut percer 12 sabords à la premiere batterie de chaque bord.

De 140 pieds $\frac{2}{3}$, je retranche $108\frac{3}{4}$ (103 & suiv.) il me reste $31\frac{1}{12}$ pour les sabords; je divise $31\frac{1}{12}$ par 12, c'est-à-dire, $\frac{383}{12}$ par $\frac{1}{12}$ (86) & (110), j'ai pour quotient $\frac{383}{144}$ de pied, qui valent 2 pieds & $\frac{95}{144}$, fraction qui évaluée en pouces & lignes, vaut 7

pouces 11 lignes ; ainsi il faudroit donner à chaque sabord 2 pieds 7 pouces 11 lignes, c'est-à-dire, 2 pieds 8 pouces à peu près, ce qui est une mesure convenable pour un vaisseau de 140 pieds $\frac{2}{3}$.

115. Lorsqu'une fraction exprimée par des nombres un peu considérables, n'est pas réductible par la méthode donnée (95), & qu'on peut se contenter d'en avoir une valeur approchée, on peut y parvenir par la méthode suivante qui donne alternativement des fractions plus grandes & plus petites que la proposée, mais toujours de plus en plus approchées, en sorte qu'à la dernière opération, on retombe sur la fraction proposée. Prenons, par exemple, la fraction $\frac{100000}{314159}$, qui, comme on le verra en Géométrie, exprime le rapport très-approché du diamètre à la circonférence ; & proposons-nous d'exprimer cette fraction par d'autres fractions moins exactes, à la vérité, mais exprimées par des nombres plus simples.

Divisez le numérateur & le dénominateur, par le numérateur ; vous aurez $\frac{1}{3}$ Pour avoir une première valeur approchée, négligez la fraction qui accompagne 3, & vous aurez $\frac{1}{3}$ pour première valeur approchée, mais un peu trop forte.

Pour avoir une valeur plus approchée, divisez le numérateur & le dénominateur de la fraction qui accompagne 3, chacun par le numérateur de cette fraction, & vous aurez

$\frac{1}{3 \frac{1}{7}}$; négligez la fraction qui accompagne 7, & vous aurez $\frac{1}{3 \frac{1}{7}}$, ou (86) $\frac{1}{\frac{23}{7}}$, ou (109) $\frac{7}{12}$ pour se-

conde valeur, qui est plus approchée que la première, mais un peu trop faible.

Pour avoir une valeur encore plus approchée, divisez le numérateur & le dénominateur de la fraction qui accompagne 7, chacun par le numérateur de cette fraction ;

vous aurez $\frac{1}{3\frac{1}{7}}$: supprimez la fraction qui accompa-

gne 15, & vous aurez $\frac{1}{3\frac{1}{7\frac{1}{5}}}$ qui revient à $\frac{1+6}{375}$, valeur plus approchée, mais un peu trop forte.

Pour avoir une valeur encore plus approchée, divisez les deux termes de la fraction qui accompagne 15, chacun par le numérateur 854, & vous aurez $\frac{1}{3\frac{1}{7\frac{1}{15\frac{1}{854}}}}$; négligeant la

$$\frac{1}{3\frac{1}{7\frac{1}{15\frac{1}{854}}}}$$

fraction $\frac{1}{854}$, vous aurez pour valeur plus approchée, $\frac{1+1}{359}$, mais qui est un peu trop foible. On voit à présent comment on peut continuer.

Des Nombres complexes.

116. Quoique les regles que nous avons exposées jusqu'ici, puissent servir aussi à calculer les nombres complexes, nous croyons cependant devoir considérer ceux-ci d'une maniere plus particuliere, parce que la division qu'on y fait de l'unité principale, en facilite souvent le calcul.

Il y a plusieurs sortes de nombres complexes, & les regles pour les calculer tiennent beaucoup à la division qu'on a faite de l'unité : cependant il n'est pas nécessaire d'examiner toutes ces especes pour être en état de les calculer ; mais il importe de

savoir quels rapports leurs différentes parties ont tant entr'elles, qu'à l'égard de l'unité principale; c'est par cette raison que nous donnons ici une Table des nombres complexes dont l'usage est le plus fréquent.

*TABLE des unités de quelques especes,
& caracteres par lesquels on représente ces différentes unités.*

P O U R L E S M O N N O I E S .

℥ signifielivre	1 livre vaut20 sols
ℓ.....sol	1 sol vaut.....12 deniers

P O U R L E S P O I D S .

℔ signifie.....livre	1 livre (poids) vaut 2 mars
M.....marc	1 marc8 onces
O ou ʒ.....once	1 once8 gros
G ou ʒ.....gros	1 gros 3 deniers ou scrupules
D ou ʒ. denier ou scrupule.	1 denier24 grains
.....grain	

P O U R L'É T E N D U E D E S L I G N E S .

T signifietoise	1 toise vaut.....6 pieds
P.....pied	1 pied.....12 pouces
p.....pouce	1 pouce12 lignes
l.....ligne	1 ligne12 points
pt.....point	

P O U R L E T E M S .

J signifiejour	1 jour vaut....24 heures
H.....heure	1 heure60 minutes
'.....minute	1 minute.....60 secondes
".....seconde	1 seconde.....60 tierces

Nous donnerons en Géométrie les divisions des mesures relatives aux superficies & aux capacités des Corps.

Addition des Nombres complexes.

117. Pour faire cette opération, on écrit tous les nombres proposés, les uns au-dessous des autres, de manière que toutes les parties d'une même espece se trouvent chacune dans une même colonne verticale, & après avoir souligné le tout, on commence l'addition par les parties de l'espece la plus petite; si leur somme ne compose pas une unité de l'espece immédiatement supérieure, on l'écrit sous les unités de son espece; si elle renferme assez de parties pour composer une ou plusieurs unités de l'espece immédiatement supérieure, on n'écrit, au-dessous de cette colonne, que l'excédent d'un nombre juste d'unités de cette seconde espece, & on retient celles-ci pour les ajouter avec leurs semblables sur lesquelles on procede de la même manière.

E X E M P L E I.

On propose d'ajouter.. 227^u 14^f 8^d

2549 18 5

184 11 11

17 10 7

2979^u 15^f 7^{d o.n.}

La somme des deniers est 31 qui renferme 2 douzaines de deniers ou 2 sols & 7 deniers ; je pose les 7 deniers , & je retiens 2 sols que j'ajoute avec les unités de sols , ce qui donne 15 sols , dont je pose seulement le chiffre 5 , & je retiens la dizaine pour l'ajouter aux dizaines , ce qui me donne 5 ; & comme il faut 2 dizaines de sols pour faire une livre , je prends la moitié de 5 qui est 2 avec 1 pour reste ; je pose ce reste , & je porte les 2 livres à la colonne des livres que j'ajoute comme à l'ordinaire.

E X E M P L E I I.

On propose d'ajouter

54 ^T	2 ^P	3 ^P	9 ^L
12	5	4	11
9	4	11	11
8	2	9	10
<hr/>			
85 ^T	3 ^P	6 ^P	5 ^L

La somme des lignes monte à 41 qui font 3 pouces 5 lignes ; je pose 5 lignes , & je retiens les 3 pouces que j'ajoute avec les pouces ; le tout me donne 30 qui valent 2 pieds 6 pouces , je pose les 6 pouces , & je retiens les 2 pieds , qui , ajoutés avec les pieds , me donnent 15 pieds

qui valent $2^T 3^P$; je pose les 3^P & j'ajoute les deux toises avec les toises ; le tout monte à 85, enforte que la somme est $85^T 3^P 5^P 5^L 6^{\text{pts}}$.

Soustraction des Nombres complexes.

II 8. Ecrivez les nombres proposés, comme dans l'addition, & commencez la soustraction par les unités de l'espece la plus basse. Si le nombre inférieur peut être retranché du nombre supérieur, écrivez le reste au-dessous. S'il ne peut en être retranché, empruntez sur l'espece immédiatement supérieure, une unité que vous réduirez à l'espece dont il s'agit, & que vous ajouterez au nombre dont vous ne pouvez retrancher. Faites la même chose pour chaque espece ; & lorsque vous aurez été obligé d'emprunter, diminuez d'une unité le nombre sur lequel vous avez fait cet emprunt. Enfin, écrivez chaque reste, à mesure que vous le trouverez, au-dessous du nombre qui l'a donné.

E X E M P L E I.

$$\begin{array}{r}
 \text{De } 143^{\text{th}} \ 17^{\text{f}} \ 6^{\text{d}} \\
 \text{on veut ôter. . . . } 75^{\text{th}} \ 12^{\text{f}} \ 9^{\text{d}} \\
 \hline
 68^{\text{th}} \ 4^{\text{f}} \ 9^{\text{d}} \text{ reste}
 \end{array}$$

Ne pouvant ôter 9^{d} de 6^{d} , j'emprunte 1^{f} qui vaut 12^{d} , & 6 font 18, desquels ôtant 9, il reste 9; j'ôte ensuite 12, non pas de 17, mais de 16 qui restent après l'emprunt, & il reste 4; enfin je retranche 75 liv. de 143 liv. & il me reste 68 liv.

E X E M P L E II.

$$\begin{array}{r}
 \text{De } 163^{\text{th}} \ 0^{\text{f}} \ 5^{\text{d}} \\
 \text{on veut ôter . . . } 84^{\text{th}} \ 18^{\text{f}} \ 9^{\text{d}} \\
 \hline
 78^{\text{th}} \ 1^{\text{f}} \ 8^{\text{d}} \text{ reste}
 \end{array}$$

Comme je ne puis ôter 9^{d} de 5^{d} , & que d'ailleurs il n'y a pas de sols sur lesquels je puisse emprunter, j'emprunte 1 liv. sur 163 liv. mais j'en laisse, par la pensée, 19 sols à la place du zéro, après quoi j'opere comme ci-dessus.

*Multiplication des Nombres
complexes.*

119. On peut réduire généralement

la multiplication des nombres complexes , à la multiplication d'une fraction par une fraction , multiplication dont nous avons donné la regle (106). Par exemple , si l'on demande ce que doivent coûter $54^T 3^P$ d'ouvrage , à raison de 42 livres 17 sols 8 den. la toise , on peut réduire le multiplicande 42 liv. 17 sols 8 den. tout en den. (57) ; ce qui donnera 10292 den. & comme le denier est la 240^e partie de la livre , le multiplicande peut être représenté par $\frac{10292}{240}$ de la livre ; pareillement on réduira le multiplicateur $54^T 3^P$ tout en piéds , ce qui donnera 327^P ; & comme le pied est la sixieme partie de la toise , on aura pour multiplicateur $\frac{327}{6}$ de toise , en sorte que la question est réduire à multiplier $\frac{10292}{240}$ de livre , par $\frac{327}{6}$, ce qui (106) donnera $\frac{3361484}{1440}$ de livre , qui (112) valent 2337 liv. 2 sols 10 deniers.

Cette méthode s'étend à toute espece de nombres complexes , mais elle exige plus de calcul que celle que nous allons exposer ; c'est pourquoi nous ne nous y arrêterons pas davantage.

120. Un nombre qui est contenu exactement dans un autre , est dit partie *aliquote* de cet autre : ainsi 3 est partie aliquote

On multipliera d'abord , selon les regles ordinaires 72 liv. par 54. Ensuite pour multiplier par 3^p qui font la moitié de la toise , & qui par conséquent ne doivent donner que la moitié du prix de la toise , on prendra la moitié de 72 liv. & additionnant , on aura 3924[#] pour produit total.

EXEMPLE II.

Si on avoit	72 [#]	
à multiplier par	54 ^T	5 ^p
	<hr/>	
	288 [#]	c ^l o ^d
	360	
	36	
	24	
	<hr/>	
	3948 [#]	o ^f o ^d

On multipliera d'abord 72 liv. par 54. Ensuite au lieu de multiplier par $\frac{1}{2}$, parce que 5 pieds font les $\frac{1}{2}$ de la toise , on décomposera 5^p, en 3^p & 2^p, dont le premier est la moitié , & le second le $\frac{1}{3}$ de la toise ; on prendra donc d'abord la moitié de 72 liv. & ensuite le $\frac{1}{3}$ de 72 liv. & on aura , en réunissant tous ces produits particuliers , 3948 liv. pour produit total.

EXEMPLE III.

Que l'on ait 72^l
 à multiplier par 5^T 4^P 8^P

360^l 0^f 0^d
 36
 12
 4
 4

416^l 0^f 0^d

Après avoir multiplié par 5^T on multipliera par 4^P, & pour cet effet on décomposera ce nombre en 3^P & 1^P; pour 3^P on prendra la moitié de 72 l. qui est 36 l. & pour un pied, on remarquera que c'est le $\frac{1}{3}$ de 3 pieds, & par conséquent on prendra le $\frac{1}{3}$ de 36 liv. qui est 12 liv. Ensuite pour multiplier par 8 pouces, au lieu de comparer ces 8 pouces à la toise, on les comparera au pied, & on les décomposera en 4 pouces, & 4 pouces qui sont chacun le $\frac{1}{3}$ du pied, & qui par conséquent donneront chacun le $\frac{1}{3}$ de 12 liv. Enfin réunissant, on aura 416 liv. 0^f 0^d pour produit.

122. Si le multiplicande est aussi un nombre complexe, on se conduira comme

il va être expliqué dans l'exemple suivant.

EXEMPLE IV.

Si l'on a . . . 72^l 6^s 6^d
à multiplier par 27T 4^p 8^p

$$\begin{array}{r}
 504^{\text{d}} \quad 0^{\text{s}} \quad 0^{\text{d}} \\
 144 \\
 \hline
 6 \quad 15 \quad 0 \\
 1 \quad 7 \quad 0 \\
 0 \quad 13 \quad 6 \\
 36 \quad 3 \quad 3 \\
 12 \quad 1 \quad 1 \\
 4 \quad 0 \quad 4\frac{1}{3} \\
 4 \quad 0 \quad 4\frac{1}{3} \\
 \hline
 2009^{\text{d}} \quad 0^{\text{s}} \quad 6^{\text{d}} \frac{2}{3}
 \end{array}$$

On multipliera d'abord 72 liv. par 27.

Ensuite pour multiplier 6 sols par 27, on décomposera ces 6 sols en 5 sols & 1 sol.

Les 5 sols faisant le quart de la livre, doivent, étant multipliés par 27; donner 27 fois le quart de la livre, ou le quart de 27 liv. on prendra donc le quart de 27 liv. qui est 6 liv. 15 sols. Pour multiplier 1 sol par 27, on remarquera qu'un sol est la cinquième partie de 5 qu'on vient de multiplier, ainsi on prendra le cinquième des 6 liv. 15 sols, qui sera 1 livre 7 sols.

A l'égard des 6 deniers, on fera attention qu'ils font la moitié d'un sol, & par conséquent on prendra la moitié de 1 liv. 7 sols qu'on a eu pour un sol.

Jusques-là tout le multiplicande est multiplié par 27.

Pour multiplier par 4 pieds, on s'y prendra de la même manière que dans l'exemple précédent, c'est-à-dire, que pour les 2^p, on prendra d'abord pour 3^p, la moitié 36 liv. 3 sols 3 den. du multiplicande, & pour 1^p le tiers de ce que donnent les 3^p.

Enfin pour 8^p, on prendra 2 fois pour 4; c'est-à-dire, qu'on écrira 2 fois le tiers de ce qu'on vient d'avoir pour 1^p; en réunissant toutes ces différentes parties, on aura 2009 liv. or 6 den. $\frac{2}{3}$ pour produit total.

123. Jusqu'ici les parties du multiplicande qu'il a fallu prendre, ont été assez faciles à évaluer, mais dans les cas où ces parties seroient plus composées, on se conduiroit comme dans l'exemple suivant.

EXEMPLE V.

A raison de 34^l 10^s 2^d la toise,
combien doivent coûter 17^T

$$\begin{array}{r}
 238^{\text{li}} \quad 0^{\text{li}} \quad 0^{\text{d}} \\
 34 \\
 \hline
 8 \quad 10 \\
 0 \quad 17 \\
 0 \quad 2 \quad 10 \\
 \hline
 586^{\text{li}} \quad 12^{\text{li}} \quad 10^{\text{d}}
 \end{array}$$

Après avoir multiplié 34 liv. par 17 ;
& ensuite les 10 sols par 17 en prenant
moitié de 17 , on multipliera 2 deniers
qui sont la sixieme partie d'un sol , & par
conséquent la sixieme partie de la dixieme
partie ou (114) la 60^e partie de 10 sols ,
mais au lieu de prendre la 60^e partie de
8 liv. 10 sols , il sera plus commode de
faire un faux produit , & de prendre d'a-
bord le dixieme de ce qu'ont donné
10 sols , c'est-à-dire , le dixieme de 8 liv.
10 sols ; ce dixieme qui est 0 liv. 17 sols ,
est pour un sol ; mais comme il ne faut
que pour le sixieme d'un sol , on barrera
ce faux produit , & on en écrira le sixieme
au dessous.

EXEMPLE VI.

Combien pour 34 liv. 10 sols 2 deniers
fera-t-on faire d'ouvrage, à raison de 1 liv.
pour 17 toises ?

Il faut multiplier 17 toises par 34 liv.
10 sols 2 deniers, c'est-à-dire, prendre 17
toises autant de fois que la livre est conte-
nue dans 34 liv. 10 sols 2 deniers.

$$\begin{array}{r}
 17^T \\
 34^{\text{e}} \text{ } 10^{\text{s}} \text{ } 2^{\text{d}} \\
 \hline
 68^T \text{ } 0^{\text{P}} \text{ } 0^{\text{P}} \text{ } 0^{\text{l}} \text{ } 0^{\text{pts.}} \\
 5^{\text{l}} \\
 8 \quad 3 \\
 0 \quad 5 \quad 2 \quad 2 \quad 4 \frac{4}{8} \\
 0 \quad 0 \quad 10 \quad 2 \quad 4 \quad \frac{4}{7} \\
 \hline
 586^T \text{ } 3^{\text{P}} \text{ } 10^{\text{P}} \text{ } 2^{\text{l}} \text{ } 4^{\text{pts.}} \frac{4}{7}
 \end{array}$$

Ainsi on multipliera d'abord 17 toises
par 34 ; ensuite pour multiplier 17 toises
par 10 sols, on prendra la moitié de 17
toises, parce que 10 sols font la moitié
de la livre, & on aura 8 toises 3 pieds.
Pour multiplier par deux deniers, on cher-
chera, pour plus de facilité, ce que don-
neroit 1 sol, en prenant le dixieme de

H 4

ce qu'ont donné 10 sols ; ce dixieme est 0 toises 5 pieds 1 ponce 2 lignes 4 points & $\frac{8}{10}$ ou $\frac{4}{5}$ de point ; on le barrera comme ne devant pas faire partie du produit , mais on en prendra le sixieme pour avoir le produit de 2 deniers , & on écrira au-dessous ce sixieme qui est 0 toises , 0 pieds 10 pouces 2 lignes 4 points & $\frac{24}{100}$ ou $\frac{4}{5}$.

Nous avons donné cet exemple , principalement , pour confirmer ce que nous avons dit (45) , qu'il importoit de distinguer le multiplicande du multiplicateur, lorsqu'ils sont tous les deux concrets : en effet , dans l'exemple précédent , ainsi que dans celui-ci , les facteurs du produit sont également 17 toises & 34 liv. 10 sols 2 deniers ; cependant les deux produits sont différents.

Division d'un Nombre complexe par un Nombre incomplex.

124. Si le dividende seul est complexe , & si en même temps le dividende & le diviseur ont des unités de différente espece , on divisera d'abord les unités principales du dividende , selon la regle ordinaire ; ce qui restera de cette division ,

on le réduira (57) en unités de la seconde espece, qu'on ajoutera avec celles de même espece, qui se trouveront dans le dividende, & on divisera le tout comme à l'ordinaire : on réduira pareillement le reste de cette division en unités de la troisieme espece ; auxquelles on ajoutera celles de la même espece qui se trouveront dans le dividende, & on divisera le tout comme ci-dessus ; on continuera de réduire les restes, en unités de l'espece suivante, tant qu'il s'en trouvera d'inférieures dans le dividende.

E X E M P L E.

On a donné 4783 liv. 3 sols 9 den. pour paiement de 87 toises d'ouvrage ; on demande à combien cela revient la toise ?

$$\begin{array}{r}
 4783^{\text{liv}} \quad 3^{\text{s}} \quad 9^{\text{d}} \quad | \quad 87 \\
 \underline{433} \\
 85 \\
 \hline
 1703^{\text{liv}} \\
 833 \\
 50 \\
 \hline
 609^{\text{liv}} \\
 000 \\
 \hline
 \end{array}$$

Il faut diviser 4783 liv. 3 sols 9 deniers par 87, en commençant par les livres.

Les 4783 liv. divisées par 87, selon la règle ordinaire, donneront 54 livres pour quotient, & 85 liv. pour reste : ces 85 liv. réduites en sols (57) donneront avec les 3 sols du dividende 1703 sols, qui divisés par 87, donneront 19 sols pour quotient, & 50 sols pour reste : ces 50 sols réduits en deniers, donnent avec les 9 deniers du dividende, 609 deniers, lesquels divisés par 87, donnent enfin 7 deniers pour quotient.

125. Mais si le dividende & le diviseur ont des unités de même espèce, il faut, avant de faire la division, examiner si le quotient doit être ou ne pas être de même espèce qu'eux ; ce que l'état de la question décide toujours.

126. Dans le cas où le dividende & le diviseur étant de même espèce, le quotient devra aussi être de même espèce qu'eux, la division se fera précisément comme dans le cas précédent ; par exemple, si l'on proposoit cette question, 1243 livres ont produit un bénéfice de 7254 livres, à combien cela revient-il par livre ? il est évident que le quotient doit avoir des

unités de même espece que le dividende & le diviseur, c'est-à-dire, doit être des livres, & qu'on doit diviser 7254 livres par 1243, en réduisant comme dans l'exemple précédent, le reste de cette division en sols, & le second reste en deniers; & on trouvera 5 liv. 16 sols 8 den. $\frac{760}{1243}$, pour réponse à la question.

127. Mais lorsque le dividende & le diviseur étant de même espece, le quotient devra être d'espece différente; alors il faudra commencer par réduire (57) le dividende & le diviseur, chacun à la plus petite espece qui soit dans le dividende, après quoi on fera la division comme dans le cas précédent, & on y traitera les unités du dividende, comme si elles étoient de même espece que celles que doit avoir le quotient: par exemple, si l'on proposoit cette question, combien pour 7954 livres 11 sols 7 den. fera-t-on faire d'ouvrage à raison de 72 liv. la toise? Il est clair, par la nature de la question, que le quotient doit être des toises & parties de toise. On réduira donc 7954 liv. 11 sols 7 den. tout en deniers, ce qui donnera 1909099: on réduira pareillement 72 livres en deniers, & on aura 17280;

ou d'ailleurs 100000 considéré comme des
milliers, par 1000, & on aura pour quo-
tient 110000000000.

Division d'un Nombre complexe par un Nombre complexe.

1. 11. Lorsque le directeur est aussi un
membre exécutif, il faut le retenir à
la tête pour éviter, en même temps
de l'absence du membre qui exerce une
fonction de premier ordre, de le laisser aller
et de le laisser aller. L'absence du membre
qui exerce une fonction de premier ordre, dans la direction
peut se faire sentir de la direction et
de l'exécution.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

61552 liv. 10 sols pour nouveau dividende,
 enforte que je divise comme il suit.

$$\begin{array}{r|l}
 61552^{\text{e}} 10 & 4169 \\
 19862 & \hline
 3186 & 14^{\text{e}} 15^{\text{f}} 3^{\text{d}} \frac{1833}{4169} \\
 \hline
 63730^{\text{f}} & \\
 22040 & \\
 1195 & \\
 \hline
 14340 & \\
 1833 & \\
 \hline
 \end{array}$$

Les 61552 liv. divisées par 4169 donnent 14 liv. pour quotient, & 3186 pour reste. Ces 3186 liv. réduites en sols, donnent avec les 10 sols du dividende, 63730 sols, qui divisés par 4169 donnent 15 sols pour quotient, & 1195 sols de reste. Ces 1195 sols réduits en deniers valent 14340 deniers, lesquels divisés par 4169 donnent 3 deniers pour quotient, & 1833 deniers pour reste; enforte que le quotient est 14 liv. 15 sols 3 den. $\frac{1833}{4169}$ de denier.

Pour entendre la raison de cette regle, il faut faire attention que les 57 5P 5P valant 4169P, & le pouce étant la soixante-douzieme partie de la toise, le diviseur

est $\frac{4169}{72}$ de la toise ; or , pour diviser p
une fraction , il faut (109) renverser
fraction diviseur , & multiplier ensuite p
cette fraction ainsi renversée ; il faut do
ici multiplier par $\frac{72}{4169}$; ce qui revient
multiplier d'abord par 72 , & à divi
ensuite par 4169 , ainsi que le prescrit la
regle que nous donnons.

Comme la division par un nombre com-
plexe se réduit , ainsi qu'on vient de le
voir , à la division par un nombre incom-
plexe , on doit avoir ici les mêmes atten-
tions à l'égard de la nature des unités que
nous avons eues (126) & (127).

Ce seroit ici le lieu de parler du toisé
ou de la multiplication & de la division
géométriques ; ces opérations ne diffèrent
en rien , pour le procédé , de celles que
nous venons d'exposer ; enforte qu'il n'y
auroit ici d'autre chose à ajouter , que d'ex-
pliquer quelle est la nature des unités des
facteurs & du produit ; mais cela appartient
à la Géométrie. Nous remettrons donc à en
parler , jusqu'à ce que nous soyons arrivés
à la Géométrie.



**De la formation des Nombres quarrés
& de l'extraction de leur racine.**

129. On appelle *quarré* d'un nombre, le produit qui résulte de la multiplication de ce nombre par lui-même ; ainsi 25 est le quarré de 5, parce que 25 résulte de la multiplication de 5 par 5.

130. La *racine quarrée* d'un nombre proposé, est le nombre qui multiplié par lui même, reproduiroit ce même nombre proposé : ainsi 5 est la racine quarrée de 25 ; 7 est la racine quarrée de 49.

131. Un nombre que l'on quarre, est donc tout à la fois multiplicande & multiplicateur ; il est donc deux fois facteur (42) du produit ; c'est pour cela qu'on appelle aussi ce produit ou quarré, la *seconde puissance* de ce nombre.

Il ne faut d'autre art pour quarrer un nombre, que de le multiplier par lui-même selon les regles ordinaires de la multiplication ; mais pour extraire la racine quarrée d'un nombre, c'est-à-dire, pour revenir du quarré à la racine, il faut une méthode, du moins lorsque le nombre ou quarré proposé a plus de deux chiffres.

Lorsque le nombre proposé n'a qu'un

ou deux chiffres , sa racine , en nombre entier , est quelqu'un des nombres

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Dont les quarrés sont,

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81.

Ainsi la racine quarrée de 72, par exemple, est 8 en nombre entier , parce que 72 étant entre 64 & 81, sa racine est entre les racines de ceux-ci , c'est-à-dire , entre 8 & 9 ; elle est 8 & une fraction , fraction qu'à la vérité on ne peut pas assigner exactement ; mais dont on peut approcher continuellement , ainsi que nous le verrons dans peu.

132. La racine quarrée d'un nombre qui n'est point un quarré parfait , s'appelle un nombre *sourd* ou *irrationnel* ou *incommensurable*.

133. Venons aux nombres qui ont plus de deux chiffres.

C'est en observant ce qui se passe dans la formation du quarré, que nous trouverons la méthode qu'on doit suivre pour revenir à la racine.

Pour

Pour quarrer un nombre tel que 54, par exemple.

$$\begin{array}{r}
 54 \\
 \times 54 \\
 \hline
 216 \\
 270 \\
 \hline
 2916
 \end{array}$$

Après avoir écrit le multiplicande & le multiplicateur, comme on le voit ici, nous multiplions comme à l'ordinaire, le 4 supérieur par le 4 inférieur, ce qui fait évidemment le *quarré des unités*.

Nous multiplions ensuite le 5 supérieur, par le 4 inférieur, ce qui fait le *produit des dizaines par les unités*.

Nous passons, après cela, au second chiffre du multiplicateur, & nous multiplions le 4 supérieur, par le 5 inférieur; ce qui fait le produit des unités par les dizaines, ou (44) le *produit des dizaines par les unités*.

Enfin nous multiplions le 5 supérieur par le 5 inférieur, ce qui fait le *quarré des dizaines*.

Nous ajoutons ces produits, & nous avons pour quarré, le nombre 2916 que nous voyons donc être composé du quarré

Arithmétique. 1

des dixaines , plus deux fois le produit des dixaines par les unités , plus le quarré des unités du nombre 54.

134. Ce que nous venons d'observer étant une conséquence immédiate des regles de la multiplication , n'est pas plus particulier au nombre 54 qu'à tout autre nombre composé de dixaines & d'unités ; en sorte qu'on peut dire généralement que le quarré de tout nombre composé de dixaines & d'unités renfermera les trois parties que nous venons d'énoncer ; savoir , le quarré des dixaines de ce nombre , deux fois le produit des dixaines par les unités , & le quarré des unités.

135. Cela posé comme le quarré des dixaines est des centaines , (puisque 10 fois 10 font 100) , il est visible que ce quarré des dixaines ne peut faire partie des deux derniers chiffres du quarré total.

Pareillement le produit du double des dixaines multipliées par les unités , étant nécessairement des dixaines , ne peut faire partie du dernier chiffre du quarré total.

136. Donc pour revenir du quarré 2916 à sa racine , on peut raisonner ainsi.

EXEMPLE I.

$$\begin{array}{r|l}
 2916 & 54 \text{ racine} \\
 416 & \\
 \hline
 104 & \\
 \hline
 000 &
 \end{array}$$

Commençons par trouver les dizaines de cette racine : or la formation du carré nous apprend qu'il y a, dans 2916, le carré de ces dizaines, & que ce carré ne peut faire partie des deux derniers chiffres ; il est donc dans 29 ; & comme la racine carrée de 29 ne peut être plus de 5, concluons-en que le nombre des dizaines de la racine, est 5, & portons-les à côté de 2916, comme on le voit ci-dessus.

Je carre 5, & je retranche le produit 25, de 29 ; il me reste 4 à côté duquel j'abaisse les deux autres chiffres 16 du nombre proposé 2916.

Pour trouver maintenant, les unités de la racine, je fais attention à ce que renferme le reste 416 ; il ne contient plus que deux parties du carré ; savoir le double des dizaines de la racine, multipliées par les unités, & le carré des unités de cette même racine. De ces deux parties, la

premiere suffit pour nous faire trouver les unités que nous cherchons ; car puisqu'elle est formée du double des dixaines multipliées par les unités , si on la divise par le double des dixaines que nous connoissons , elle doit (74) donner pour quotient les unités : il ne s'agit donc plus que de savoir dans quelle partie de 416 est renfermé ce double des dixaines multipliées par les unités ; or nous avons remarqué ci-dessus qu'il ne pouvoit faire partie du dernier chiffre ; il est donc dans 41 ; il faut donc diviser 41 , par le double 10 des dixaines trouvées ; j'écris donc sous 41 le double 10 des dixaines , & faisant la division , le quotient 4 que je trouve est le nombre des unités , que je porte à la droite des 5 dixaines trouvées ; enforte que la racine cherchée est 54.

Mais il faut observer que quoique le quotient 4 que nous venons de trouver ; soit en effet celui qui convient ; cependant il peut arriver quelquefois que le quotient trouvé de cette maniere , soit plus fort qu'il ne convient ; parce que 41 (c'est-à-dire , la partie qui reste après la séparation du dernier chiffre) , renferme non-seulement le double des dixaines mul-

tiplié par les unités , mais encore les dixaines provenant du quarré des unités ; c'est pourquoi , pour n'avoir aucun doute sur le chiffre des unités , il faut employer la vérification suivante.

Après avoir trouvé le chiffre 4 des unités , & l'avoir écrit à la racine , je le porte à côté du double 10 des dixaines , ce qui fait 104 , dont je multiplie successivement tous les chiffres par le même nombre 4 , & je retranche les produits successifs , des parties correspondantes de 416 ; comme il ne reste rien , j'en conclus que la racine est en effet 54.

S'il restoit quelque chose , la racine n'en seroit pas moins la vraie racine en nombres entiers , à moins que ce reste ne fût plus grand que le double de la racine , augmenté de l'unité ; mais c'est ce qu'on n'a point à craindre quand on prend le quotient toujours au plus fort.

La vérification que nous venons d'enseigner , est fondée sur la formation même du quarré ; car quand on multiplie 104 par 4 , il est évident qu'on forme le quarré des unités & le double des dixaines multiplié par les unités , c'est-à-dire , ce qui complete le quarré parfait.

137. De ce que nous venons de dire, il faut conclure que pour extraire la racine quarrée d'un nombre qui n'a pas plus de quatre chiffres, ni moins de trois, il faut, après en avoir séparé deux sur la droite, chercher la racine quarrée de la tranche qui reste à gauche; cette racine sera le nombre des dixaines de la racine totale cherchée, & on l'écrira à côté du nombre proposé, en l'en séparant par un trait.

On soustraira de cette même tranche le carré de la racine qu'on vient de trouver, & après avoir écrit le reste au dessous de cette tranche, on abaissera à côté de ce reste, les deux chiffres qu'on avoit séparés.

On séparera, par un point, le chiffre des unités de la tranche qu'on vient d'abaisser, & on divisera ce qui se trouvera sur la gauche, par le double des dixaines, qu'on écrira au-dessous.

On écrira le quotient, à côté du premier chiffre de la racine, & on le portera ensuite à côté du double des dixaines qui a servi de diviseur.

Enfin on multipliera par ce même quotient, tous les chiffres qui se trouveront sur cette dernière ligne, & on retran-

chera leurs produits , à mesure qu'on les trouvera , des chiffres qui leur correspondent dans la ligne au-dessus.

Achevons d'éclaircir ceci par un exemple.

E X E M P L E I I.

On demande la racine quarrée de 7569.

75.69 | 87 racine.

116.9

167

000

Je sépare les deux chiffres 69 , & je cherche la racine quarrée de 75 ; elle est 8 ; j'écris 8 à côté , je quarre 8 & je retranche de 75 , le quarré 64 ; il me reste 11 que j'écris au dessous de 75 , & j'abaisse à côté de ce même 11 , les chiffres 69 que j'avois séparés.

Je sépare , dans 1169 , le dernier chiffre 9 , pour avoir dans 116 la partie que je dois diviser pour trouver les unités.

Je forme mon diviseur , en doublant les 8 dixaines que j'ai trouvées , & j'écris ce diviseur au-dessous de 116 ; la division me donne pour quotient 7 que j'écris à la racine , à la droite de 8.

Je porte aussi ce quotient à côté du diviseur 16 ; je multiplie 167 qui forme la dernière ligne , par ce même quotient 7 , & je retranche les produits , à mesure que je les trouve , de 1169 : il ne reste rien , ce qui prouve que 7569 est un carré parfait & le carré de 87.

138. Il faut bien remarquer qu'on ne doit diviser par le double des dizaines , que la seule partie qui reste à gauche , après qu'on a séparé le dernier chiffre ; en sorte que si elle ne contenoit pas le double des dizaines , il ne faudroit pas , pour cela , employer le chiffre séparé ; on mettroit 0 à la racine. Si au contraire , on trouvoit que le double des dizaines y est plus de 9 fois , on ne mettroit cependant pas plus de 9 ; la raison en est la même que pour la division (66).

139. Après avoir bien compris ce que nous venons de dire sur la racine carrée des nombres qui n'ont pas plus de 4 chiffres , on saisira facilement ce qu'il convient de faire , lorsque le nombre des chiffres est plus grand. De quelque nombre de chiffres que la racine doive être composée , on peut toujours la concevoir composée de deux parties , dont l'une soit des

dixaines, & l'autre des unités; par exemple, 874 peut être considéré comme représentant 87 dixaines & 4 unités.

Cela posé, quand on a trouvé les deux premiers chiffres de la racine, par la méthode qu'on vient d'exposer, on peut aussi trouver le troisième par la même méthode, en considérant ces deux premiers chiffres, comme ne faisant qu'un seul nombre de dixaines, & leur appliquant, pour trouver le troisième, tout ce qui a été dit du premier pour trouver le second.

Pareillement, quand on aura trouvé les trois premiers chiffres, s'il doit y en avoir un quatrième, on considérera les trois premiers, comme ne faisant qu'un seul nombre de dixaines, auquel on appliquera, pour trouver le quatrième, le même raisonnement qu'on appliquoit aux deux premiers pour trouver le troisième, & ainsi de suite.

Mais pour procéder avec ordre, il faut commencer par partager le nombre proposé en tranches, de deux chiffres chacune, en allant de droite à gauche; la dernière pourra n'en contenir qu'un.

La raison de cette préparation est fondée sur ce que, considérant la racine

comme composée de dizaines & d'unités; il faut, suivant ce qui a été dit ci-dessus (135 & *suiv.*) commencer par séparer les deux derniers chiffres sur la droite, pour avoir dans la partie qui reste à gauche, le carré des dizaines; mais comme cette partie est elle-même composée de plus de deux chiffres, un raisonnement semblable conduit à en séparer encore deux sur la droite, & ainsi de suite.

Donnons un exemple de cette opération.

E X E M P L E I I I.

On demande la racine carrée de
76807696

$$\begin{array}{r}
 76.80.76.96 \mid 8764 \\
 128.0 \\
 \hline
 167 \\
 \hline
 1117.6 \\
 1746 \\
 \hline
 7009.6 \\
 17524 \\
 \hline
 00000
 \end{array}$$

Après avoir partagé le nombre proposé, en tranches de deux chiffres chacune, en allant de droite à gauche, je cherche

quelle est la racine quarrée de la tranche
 76 qui est le plus à gauche : je trouve
 qu'elle est 8, & j'écris 8 à côté du nombre
 proposé : ie quarre 8 & je retranche le
 quarré 64, de 76 ; j'ai pour reste 12 que
 j'écris au dessous de 76 ; à côté de ce reste
 j'abaisse la tranche 80 dont je sépare le
 dernier chiffre par un point ; & au dessous
 de la partie 128, j'écris 16 double de la
 racine trouvée ; puis disant, en 128 com-
 bien de fois 16 ? je trouve qu'il y est 7 fois :
 j'écris 7 à la suite de la racine 8, & à
 côté du double 16 ; je multiplie 167 par
 ce même nombre 7, & je retranche de
 1280 le produit de cette multiplication,
 il me reste 111 à côté duquel j'abaisse la
 tranche 76, ce qui forme 11176 ; je sé-
 pare le dernier chiffre 6 de ce nombre, &
 sous la partie 1117 qui reste à gauche : j'é-
 cris 174, le double de la racine 87 je divise
 1117 par 174, & ayant trouvé 6 pour
 quotient, j'écris 6 à la racine & à côté du
 double 174, je multiplie 1746 par ce même
 nombre 6, & je retranche de 11176, il
 reste 700 ; à côté de ce reste, j'abaisse 96
 dont je sépare le dernier chiffre ; au-des-
 sous de 7009 qui reste à gauche, j'écris
 1752 double de la racine trouvée 876,

& divisant 7009 par 1752, je trouve pour quotient 4 que j'écris à la racine & à côté du double 1752. Je multiplie 17524 par ce même nombre 4, & je retranche de 70096, il ne reste rien, ainsi la racine quarrée de 76807696 est exactement 8764.

140. Lorsque le nombre proposé n'est point un quarré parfait, il y a un reste à la fin de l'opération, & la racine quarrée qu'on a trouvée, est la racine quarrée du plus grand quarré contenu dans le nombre proposé: alors il n'est pas possible d'extraire la racine quarrée exactement; mais on peut en approcher si près qu'on le juge à propos, c'est-à-dire, de maniere que l'erreur qui en résulteroit dans le quarré, soit au dessous de telle quantité qu'on voudra.

Cette approximation se fait commodément par le moyen des décimales. Il faut concevoir à la suite du nombre proposé, deux fois autant de zéros qu'on voudra avoir de décimales à la racine, faire l'opération comme à l'ordinaire, & séparer ensuite par une virgule sur la droite de la racine, moitié autant de décimales qu'on a mis de zéros à la suite du nombre proposé. En effet, (54) le produit de la multiplication devant avoir autant de décimales

qu'il y en a dans les deux facteurs ensemble , le carré (dont les deux facteurs sont égaux) doit donc en avoir le double de ce qu'à l'un des facteurs , c'est-à-dire , le double de ce que doit avoir la racine.

E X E M P L E.

On demande la racine carrée de 87567 à moins d'un millièbre près.

Pour faire des millièmes il faut trois décimales ; il faut donc mettre six zéros au carré 87567 ; ainsi il faut tirer la racine carrée de 87567000000.

$$\begin{array}{r}
 8.75.67.00.00.00 \mid 295917 \quad \text{ } \\
 47.4 \\
 \underline{49} \\
 346.7 \\
 \underline{585} \\
 5420.0 \\
 \underline{5909} \\
 10190.0 \\
 \underline{59181} \\
 427190.0 \\
 \underline{591827} \\
 129111
 \end{array}$$

En faisant l'opération comme dans les exemples précédents, on trouve pour racine quarrée, à moins d'une unité près, le nombre 295917; cette racine est celle de 87567000000; mais comme il s'agit de celle de 87567 ou de 87567,000000; je sépare moitié autant de décimales dans la racine, que j'ai mis de zéros au quarré, ce qui me donne 295,917 pour la racine quarrée de 87567, à moins d'un millieme près.

Pareillement, si l'on demande la racine quarrée de 2, à moins d'un dix-millieme près; on tirera la racine quarrée de 200000000 qu'on trouvera être 14142; séparant les quatre chiffres de la droite, par une virgule, on aura 1,4142 pour la racine quarrée de 2, approchée à moins d'un dix-millieme près.

141. On a vu (106) que pour multiplier une fraction par une fraction, il falloit multiplier numérateur par numérateur & dénominateur par dénominateur; par conséquent, pour quarrer une fraction, il faut quarrer le numérateur & le dénominateur, ainsi le quarré de $\frac{2}{3}$ est $\frac{4}{9}$, celui de $\frac{4}{5}$ est $\frac{16}{25}$.

142. Donc réciproquement, pour

tirer la racine quarrée d'une fraction, il faut tirer la racine quarrée du numérateur & celle du dénominateur; ainsi la racine quarrée de $\frac{9}{16}$ est $\frac{3}{4}$, parce que celle de 9 est 3, & celle de 16 est 4.

143. Mais il peut arriver que le numérateur ou dénominateur, ou tous les deux ne soient point des quarrés parfaits; s'il n'y a que le numérateur qui ne soit point un quarré, on en tirera la racine, approchée par la méthode qu'on vient d'exposer, & ayant tiré la racine du dénominateur, on la donnera pour dénominateur à la racine du numérateur; ainsi si l'on demande la racine de $\frac{2}{9}$, on tirera la racine approchée du numérateur 2 qu'on trouvera 1,4 ou 1,41 ou 1,414 ou 1,4142, &c. selon qu'on voudra en approcher plus ou moins; & comme la racine quarrée de 9 est 3, on aura pour racine approchée de $\frac{2}{9}$, la quantité $\frac{1,4}{3}$ ou $\frac{1,41}{3}$ ou $\frac{1,414}{3}$ ou $\frac{1,4142}{3}$, &c.

Mais si le dénominateur n'est par un quarré, on multipliera les deux termes de la fraction par ce même dénominateur, ce qui ne changera rien à la valeur de la fraction, & rendra ce dénominateur quarré; alors on opérera comme dans le

cas précédent. Par exemple, si l'on demande la racine quarrée de $\frac{3}{5}$, on changera cette fraction en $\frac{15}{25}$; tirant la racine quarrée de 15, jusqu'à 3 décimales, par exemple, on aura 3,872; & comme la racine quarrée de 25 est 5; la racine quarrée de $\frac{15}{25}$ sera $\frac{3,872}{5}$.

144. Pour ne pas avoir plusieurs sortes de fractions à la fois, on réduira le résultat $\frac{3,872}{5}$, uniquement en décimales, en divisant 3,872 par 5, ce qui donnera 0,774 pour la racine de $\frac{3}{5}$ exprimée purement en décimales (99).

145. Enfin si l'on avoit des entiers joints à des fractions, on réduiroit ces entiers en fractions (86), & on opéreroit, comme il vient d'être dit pour une fraction. Ainsi, pour tirer la racine quarrée de $8\frac{3}{7}$, on changeroit $8\frac{3}{7}$, en $\frac{56}{7}$, & celle-ci (143) en $\frac{413}{49}$, dont on trouveroit que la racine approchée est $\frac{20,322}{7}$ ou 2,903.

146. On peut aussi réduire en décimales, la fraction qui accompagne l'entier; mais il faut observer d'y employer un nombre de décimales pair & double de celui qu'on veut avoir à la racine; parce que le produit de la multiplication de deux nombres qui ont des décimales, devant

devant avoir autant de décimales qu'il y en a dans les deux facteurs (54), le carré d'un nombre qui a des décimales, doit en avoir deux fois autant que ce nombre. En appliquant cette méthode à $8\frac{3}{7}$, on le transforme en 8,428571 (99), dont la racine est 2,903, comme ci-dessus.

147. Si l'on avoit à tirer la racine carrée d'une quantité décimale, il faudroit avoir soin de rendre le nombre des décimales pair, s'il ne l'est pas; ce qui se fera, en mettant à la suite de ces décimales 1 ou 3 ou 5, &c. zéros; cela n'en change pas la valeur (30). Ainsi, pour tirer la racine carrée de 21,935 à moins d'un millieme près; je tire la racine carrée de 21,935000 qui est 4,683; c'est aussi celle de 21,935. On trouvera de même, que celle de 0,542 est à moins d'un millieme près 0,736, & que celle de 0,0054 est à moins d'un millieme près 0,073.

148. Quand on a trouvé, par la méthode qui vient d'être exposée, les trois premiers chiffres de la racine, on peut en avoir plusieurs autres avec plus de facilité & de promptitude, par la division seule, en cette maniere.

Prenons pour exemple 763703556823 : je commence par chercher les trois premiers chiffres de la racine, par la méthode ci-dessus : je trouve 873 pour cette racine, & 1574 pour reste : je mets à côté de ce reste, les deux chiffres 55, qui suivent la partie 763703 qui a donné les trois premiers chiffres. (Je mettrois les trois chiffres suivants, si

Arithmétique.

K

j'avois quatre chiffres de la racine, quatre si j'en avois 5 & ainsi de suite ; je divise 157455 que j'ai alors, par le double 1746 de la racine ; je trouve pour quotient 90 ; ce sont deux nouveaux chiffres à mettre à la suite de la racine qui par-là devient 87390. Je quarre cette racine, & j'retranche son quarré 7637012100, de la partie 763703556 dont 87390 est la racine ; il me reste 23468.

Si je veux avoir de nouveaux chiffres à la racine ; comme j'en ai déjà cinq, je puis, par la seule division, en trouver 4 ; je mettrai, pour cet effet, à la suite du reste 23468 les deux chiffres restants 23 du nombre proposé, & deux zéros, & divisant 234682300 par le double 174780 de la racine trouvée, j'aurai 1342 pour les quatre nouveaux chiffres que je dois joindre à la racine : mais en partageant le nombre proposé, en tranches, de la maniere qui a été dite ci-dessus, on voit que sa racine ne doit avoir que six chiffres pour les nombres entiers, donc cette racine est 873901,342, à moins d'un millieme près.

On peut, le plus souvent, pousser chaque division jusqu'à un chiffre de plus, c'est-à-dire, jusqu'à autant de chiffres qu'on en a déjà à la racine ; mais il y a quelques cas, rares à la vérité, où l'erreur sur le dernier chiffre, pourroit aller jusqu'à cinq unités ; au lieu qu'en se bornant à un chiffre de moins, comme nous venons de le faire, on n'a jamais à craindre, même une unité d'erreur sur le dernier chiffre.

Si après avoir trouvé les premiers chiffres de la racine, par la méthode ordinaire, ce qui reste après l'opération faite, se trouvoit égal au double de ces premiers chiffres, il faudroit, pour éviter tout embarras, en déterminer encore un par la même méthode ordinaire, après quoi on trouveroit les autres par la méthode abrégée que nous venons d'exposer, qui, comme on le voit assez, s'applique également aux décimales.

Si la racine devoit avoir des zéros parmi ses chiffres intermédiaires, dans le cas où ces zéros seroient du nombre des chiffres qu'on détermine par la division, il peut arriver, s'ils doivent être les premiers chiffres du quotient, qu'on ne s'en apperçoive pas, parce que dans la division on ne marque pas les zéros qui doivent précéder sur la gauche du quotient ; le moyen de le distinguer est de faire attention

qu'on doit avoir toujours autant de chiffres au quotient qu'on en a mis à la suite du reste ; & par conséquent , quand il y en aura moins , il en faudra compléter le nombre , par des zéros placés sur la gauche de ce quotient.

Au reste , l'abrégé que nous venons d'exposer , est une suite de ce principe général , qu'il est aisé de déduire de ce qu'on a vu (134) ; savoir que le carré d'une quantité quelconque composée de deux parties , renferme le carré de la première partie , deux fois la première partie multipliée par la seconde , & le carré de la seconde.

*De la formation des Nombres cubes ;
& de l'extraction de leur Racine.*

149. Pour former ce qu'on appelle le cube d'un nombre , il faut d'abord multiplier ce nombre par lui-même , & multiplier ensuite , par ce même nombre , le produit résultant de cette première multiplication.

Ainsi le cube d'un nombre est , à proprement parler , le produit du carré d'un nombre multiplié par ce même nombre : 27 est le cube de 3 , parce qu'il résulte de la multiplication de 9 (carré de 3) par le même nombre 3.

Le nombre que l'on cube est donc trois fois facteur dans le cube ; c'est pour cette raison que le cube est aussi nommé *troisième puissance* ou *troisième degré* de ce nombre.

150. En général , on dit qu'un nom-

bre est élevé à la seconde, troisième, quatrième, cinquième, &c. puissances, quand on l'a multiplié par lui-même 1, 2, 3, 4, &c. fois consécutives, ou lorsqu'il est 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois &c. facteur dans le produit.

§ 1. La racine cubique d'un cube proposé, est le nombre, qui multiplié par son carré, produit ce cube; ainsi 3 est la racine cubique de 27.

§ 2. On n'a donc pas besoin de règles pour former le cube d'un nombre; mais pour revenir du cube à sa racine, il faut une méthode. Nous déduirons cette méthode de l'examen de ce qui se passe dans la formation du cube.

Observons cependant qu'on n'a besoin de méthode pour extraire la racine cubique en nombres entiers, que lorsque le nombre proposé a **moins** de quatre chiffres, car 1000 étant le cube de 10, tout nombre au-dessous de 1000, & par conséquent de moins de quatre chiffres, aura pour racine moins que 10, c'est-à-dire, moins de deux chiffres.

Ainsi tout nombre qui tombera entre deux de ceux-ci.

1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729,

aura sa racine cubique , en nombre entier , entre les deux nombres correspondants de cette suite.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 dont la première contient les cubes.

153. Tout nombre n'a pas de racine cubique ; mais on peut approcher continuellement d'un nombre qui , étant cubé , approche aussi de plus en plus de reproduire ce premier nombre ; c'est ce que nous verrons après avoir appris à trouver la racine d'un cube parfait.

154. Voyons donc de quelles parties peut être composé le cube d'un nombre qui contiendrait des dizaines & des unités.

Puisque le cube résulte du carré d'un nombre multiplié par ce même nombre , il est essentiel de se rappeler ici (134) que le carré d'un nombre composé de dizaines & d'unités , renferme , 1°. le carré des dizaines , 2°. deux fois le produit des dizaines par les unités , 3°. le carré des unités.

Pour former le cube , il faut donc multiplier ces trois parties , par les dizaines & par les unités du même nombre.

Afin d'apercevoir plus distinctement les produits qui en résulteront , donnons

à cette opération simulée, la forme suivante.

1^o.

Le quarré des dixaines.	} étant multiplié par les dixaines, donnera	Le cube des dixaines.
Deux fois le produit des dixaines par les unités.		Deux fois le produit du quarré des dixaines multiplié par les unités.
Le quarré des unités.		Le produit des dixaines par le quarré des unités.

2^o.

Le quarré des dixaines.	} étant multiplié par les unités, donnera	Le produit du quarré des dixaines multiplié par les unités.
Deux fois le produit des dixaines par les unités.		Deux fois le produit des dixaines par le quarré des unités.
Le quarré des unités.		Le cube des unités.

Donc en rassemblant ces 6 résultats, & réunissant ceux qui sont semblables, on voit que le cube d'un nombre composé de dixaines & d'unités, contient quatre parties; savoir *le cube des dixaines, trois fois le quarré des dixaines multiplié par les unités, trois fois les dixaines multipliées par le quarré des unités, & enfin le cube des unités.*

Formons, d'après cela, le cube d'un nombre composé de dixaines & d'unités, de 43, par exemple,

64000

14400

1080

27

 79507

Nous prendrons donc le cube de 4 qui est 64 ; mais comme ce 4 est des dizaines , son cube sera des mille , parce que le cube 10 est 1000 , ainsi le cube des 4 dizaines sera 64000.

3 fois 16 ou 3 fois le quarré des 4 dizaines , étant multiplié par les 3 unités , donnera 144 centaines , parce que le quarré de 10 est 100 ; ainsi ce produit sera 14400.

3 fois 4 , ou 3 fois les dizaines , étant multipliées par le quarré des unités , donneront des dizaines , & ce produit sera 1080.

Enfin le cube des unités se terminera à la place des unités , & sera 27.

En réunissant ces quatre parties , on aura 79507 pour le cube de 43 ; cube qu'on auroit , sans doute , trouvé plus facilement , en multipliant 43 par 43 , & le produit 1849 , encore par 43 ; mais il ne s'agit pas tant ici de trouver la valeur du cube , que de reconnoître , par l'examen des parties qui le composent , la maniere de revenir à sa racine.

155. Cela posé , voici le procédé de l'extraction de la racine cubique.

Soit donc proposé d'extraire la racine cubique de 79507.

Cube. Racine.

$$\begin{array}{r} 79.507 \mid 43 \\ \hline 155.07 \\ 48 \end{array}$$

Pour avoir la partie de ce nombre qui renferme le cube des dizaines de la racine, j'en sépare les trois derniers chiffres, dans lesquels nous venons de voir que ce cube ne peut être compris, puisqu'il vaut des mille.

Je cherche la racine cubique de 79, elle est 4 que j'écris à côté.

Je cube 4, & j'ôte le produit 64 de 79; il me reste 15 que j'écris au-dessous de 79.

A côté de 15, j'abaisse 507, ce qui me donne 15507, dans lequel il doit y avoir 3 fois le carré des quatre dizaines trouvées, multipliées par les unités que nous cherchons, plus 3 fois ces mêmes dizaines multipliées par le carré des unités, plus enfin le cube des unités.

Je sépare les deux derniers chiffres 07 ; la partie 155 qui reste à gauche , renferme 3 fois le quarré des dixaines multiplié par les unités ; c'est pourquoi , afin d'avoir les unités (74) , je vais diviser cette partie 155 , par le triple du quarré des 4 dixaines , c'est-à-dire , par 48.

Je trouve que 48 est 3 fois dans 155 , j'écris donc 3 à la racine.

Pour éprouver cette racine , & connoître le reste , s'il y en a , nous pourrions composer les trois parties du cube qui doivent se trouver dans 15507 , & voir si elles forment 15507 , ou de combien elles en diffèrent ; mais il est aussi commode de faire cette vérification , en cubant tout de suite 43 , c'est-à-dire , en multipliant 43 par 43 , ce qui produit 1849 , & multipliant ce produit par 43 , ce qui donne enfin 79507. Ainsi 43 est exactement la racine cubique.

Si le nombre proposé a plus de six chiffres , on raisonnera comme dans l'exemple ci-après.

E X E M P L E.

Soit proposé d'extraire la racine cubique de 596947688.

$$\begin{array}{r}
 596.947.688 \mid 842 \\
 849.47 \\
 192 \\
 \hline
 592704 \\
 \hline
 42436.88 \\
 21168 \\
 \hline
 596947688 \\
 \hline
 00000000
 \end{array}$$

On considérera la racine comme composée de dizaines & d'unités, & par cette raison on commencera par séparer les trois derniers chiffres.

La partie 596947 qui renferme le cube des dizaines, ayant plus de 3 chiffres, sa racine en aura plus d'un, & par conséquent elle aura des dizaines & des unités: il faut donc, pour trouver le cube de ces premières dizaines, séparer les trois chiffres 947.

Cela posé, je cherche la racine cubique de 596; elle est 8, j'écris ce 8 à côté. Je cube 8, & je retranche le produit 512, de 596; il reste 84 que j'écris au-dessous de 596.

A côté de 84, j'abaisse 947, ce qui me donne 84947, dont je sépare les deux derniers chiffres.

Au-dessous de la partie 849, j'écris 192 qui est le triple quarré de la racine 8, & je divise 849 par 192; je trouve pour quotient 4 que j'écris à la racine.

Pour vérifier cette racine, & avoir en même temps le reste, je cube 84, & je retranche le produit 592704, du nombre 596947; j'ai pour reste 4243.

A côté de ce reste j'abaisse la tranche 688, & considérant la racine 84 comme un seul nombre qui marque les dizaines de la racine cherchée, je sépare les deux derniers chiffres 88 de la tranche abaissée, & je divise la partie 42436 par le triple quarré de 84, c'est-à-dire, par 21168; je trouve pour quotient 2 que j'écris à la suite de 84.

Pour vérifier la racine 842 & avoir le reste, s'il y en a, je cube 842, & je retranche le produit 596947688, du nombre proposé 596947688: & comme il ne reste rien, j'en conclus que 842 est la racine exacte de 596947688.

Il faut encore observer, 1°. que dans le cours de ces opérations, on ne doit

jamais mettre plus de 9 à la racine.

2°. Si le chiffre qu'on porte à la racine étoit trop fort ; on s'en appercevrait à ce que la soustraction ne pourroit se faire , & alors on diminueroit la racine successivement d'une , 2 , 3 , &c. unités jusqu'à ce que la soustraction devînt possible.

Lorsque le nombre proposé n'est pas un cube parfait , la racine qu'on trouve n'est qu'une racine approchée , & il est rare qu'il soit suffisant de l'avoir en nombres entiers. Les décimales sont encore d'un usage très-avantageux pour pousser cette approximation beaucoup plus loin , & aussi loin qu'on le désire , sans que cependant on puisse jamais atteindre à une racine exacte.

156. Pour approcher aussi près qu'on le voudra de la racine cubique d'un cube imparfait , il faut mettre à la suite de ce nombre trois fois autant de zéros qu'on veut avoir de décimales à la racine ; faire l'extraction comme dans les exemples précédents , & après l'opération faite , séparer par une virgule sur la droite de la racine , autant de chiffres qu'on vouloit avoir de décimales.

E X E M P L E.

On demande d'approcher de la racine cubique de 8755 jusqu'à moins d'un centieme près. Pour avoir des centiemes à la racine, c'est-à-dire, deux décimales, il faut que le cube ou le nombre proposé en ait six (54); il faut donc mettre six zéros à la suite de 8755.

Ainsi la question se réduit à tirer la racine cubique de 8755000000.

$$\begin{array}{r}
 8.755.000.000 \mid 2061 \\
 \hline
 07.55 \\
 12 \\
 8000 \\
 \hline
 7550.00 \\
 1200 \\
 8741816 \\
 \hline
 131840.00 \\
 127308 \\
 8754552981 \\
 \hline
 447019
 \end{array}$$

Suivant ce qui a été dit ci-dessus, je partage ce nombre, en tranches de trois chiffres chacune, en allant de droite à gauche.

Je tire la racine cubique de la dernière tranche 8, elle est 2 que j'écris à la racine. Je cube 2 & je retranche le produit de 8; j'ai pour reste 0, à côté duquel j'abaisse la tranche 755, dont je sépare les deux derniers chiffres 55: au-dessous de la partie restante 7, j'écris 12, triple carré de la racine, & divisant 7 par 12, je trouve 0 pour quotient que j'écris à la racine.

Je cube la racine 20, ce qui me donne 8000 que je retranche de 8755; j'ai pour reste 755, à côté duquel j'abaisse la tranche 000, dont je sépare deux chiffres sur la droite; au-dessous de la partie restante 7550, j'écris 1200 triple carré de la racine 20, & divisant 7550 par 1200, je trouve pour quotient 6 que j'écris à la racine.

Je cube la racine 206, & je retranche le produit, de 8755000; j'ai pour reste 13184 à côté duquel j'abaisse la dernière tranche 000, dont je sépare les deux derniers chiffres. Au-dessous de la partie restante 131840, j'écris 127308 triple carré de la racine trouvée 206. Je divise 131840 par 127308; je trouve pour quotient 1 que j'écris à la suite de 206. Je cube 2061, & ayant retranché de 8755000000, le pro-

duit 8754552981; j'ai pour reste 447019.

La racine cubique approchée de 8755000000, est donc 2061; donc celle de 8755,000000 est 20,61, puisque le cube a trois fois autant de décimales que sa racine (54).

Si l'on vouloit pousser l'approximation plus loin, on mettroit à la suite du reste trois zéros, & on continueroit comme on a fait à chaque fois qu'on a abaissé une tranche.

157. Puisque pour multiplier une fraction par une fraction, il faut multiplier numérateur par numérateur, & dénominateur par dénominateur; il faudra donc, pour cuber une fraction, cuber son numérateur & son dénominateur. Donc réciproquement, pour extraire la racine cubique d'une fraction, il faudra extraire la racine cubique du numérateur, & la racine cubique du dénominateur. Ainsi la racine cubique de $\frac{27}{64}$ est $\frac{3}{4}$, parce que la racine cubique de 27 est 3, & celle de 64 est 4.

158. Mais si le dénominateur seul est un cube, on tirera la racine approchée du numérateur, & on donnera à cette racine pour dénominateur, la racine cubique du dénominateur. Par exemple,

si l'on demande la racine cubique de $\frac{143}{343}$; comme le numérateur n'est pas un cube , j'en tire la racine approchée , qui sera 5,22 à moins d'un centieme près ; & tirant la racine de 343 qui est 7 , j'ai $\frac{5,22}{7}$ pour la racine approchée de $\frac{143}{343}$; ou bien en réduisant en décimales (99) , j'ai 0,74 pour cette racine approchée à moins d'un centieme près.

159. Si le dénominateur n'est pas un cube , on multipliera les deux termes de la fraction par le quarré de ce dénominateur , & alors le nouveau dénominateur étant un cube , on se conduira comme il vient d'être dit. Par exemple , si l'on demande la racine cubique de $\frac{3}{7}$; je multiplie le numérateur & le dénominateur par 49 , quarré du dénominateur 7 , j'ai $\frac{147}{343}$ qui (88) est de même valeur que $\frac{3}{7}$. La racine cubique de $\frac{147}{343}$ est $\frac{5,27}{7}$, ou en réduisant purement en décimales , 0,75 ; la racine cubique de $\frac{3}{7}$ est donc 0,75 à moins d'un centieme près.

S'il y avoit des entiers joints aux fractions , on convertiroit le tout en fraction , & l'opération seroit réduite à tirer la racine cubique d'une fraction (157 & *suiv.*)

On pourroit aussi , soit qu'il y ait des entiers ,

entiers, soit qu'il n'y en ait point, réduire la fraction en décimales; mais il faut avoir soin de pousser cette réduction jusqu'à trois fois autant de décimales qu'on veut en avoir à la racine. Ainsi, si l'on demandoit la racine cubique de $7\frac{3}{11}$, approchée jusqu'à moins d'un millieme, on changeroit la fraction $\frac{3}{11}$ en 0,272727272; en sorte que, pour avoir la racine cubique de $7\frac{3}{11}$, on tireroit celle de 7,272727272 qu'on trouvera être 1,937.

160. Pour tirer la racine cubique d'un nombre qui aura des décimales, il faudra le préparer par un nombre suffisant de zéros mis à sa suite, de maniere que le nombre de ses décimales soit ou 3 ou 6, ou 9; &c. alors on en tirera la racine, comme s'il n'y avoit pas de virgule; & après l'opération faite, on séparera sur la droite de la racine, par une virgule, un nombre de chiffres qui soit le tiers du nombre des décimales de la quantité proposée; en sorte que si la racine n'avoit pas suffisamment de chiffres pour que cette regle eût son exécution, on y suppléeroit par des zéros placés sur la gauche de cette racine. Ainsi pour tirer la racine cubique de 6,54 à moins d'un millieme près, je

Arithmétique.

L

mettrai 7 zéros , & je tirerai la racine cubique de 6540000000 qui sera 1870 ; j'en séparerai 3 chiffres , puisqu'il y a 9 décimales au cube , & j'aurai , 1,870 , ou simplement 1,87 pour la racine cubique de 6,54. On trouvera de même que celle de 0,0006 approchée à moins d'un centieme près , est 0,08.

161. Quand on a trouvé les quatre premiers chiffres de la racine cubique , par la méthode qu'on vient d'expliquer , on peut trouver les autres plus promptement par la division , & cela de la maniere suivante.

Qu'on demande la racine cubique de 5264627832723456 ; j'en cherche les quatre premiers chiffres , par la méthode ordinaire ; ils sont 1739 , & le reste de l'opération est 5681413 ; à côté de ce reste , je mets les deux chiffres 72 qui suivent la partie 5264627832 qui a donné les quatre premiers chiffres. (Je mettrois les trois chiffres qui suivent cette même partie , si la racine trouvée avoit cinq chiffres , & les quatre si elle en avoit six). Je divise 568141372 par 9072363 , triple quarré de la racine 1739 ; j'ai pour quotient 62 , & ce sont deux nouveaux chiffres à mettre à la suite de 1739 , en sorte que 173962 est , en nombres entiers , la racine cubique du nombre proposé.

Si l'on vouloit pousser plus loin , on cuberoit cette racine , & ayant retranché le produit , du nombre proposé , on mettroit à la suite du reste quatre zéros , & on diviseroit le tout , par le triple du quarré de 173962 , ce qui donneroit quatre décimales pour la racine.

On fera ici la même observation qu'on a faite (148) sur le cas où la division ne donne pas autant de chiffres qu'elle doit en donner. Et dans ces divisions on s'aidera de la regle abrégée qui a été donnée (69 & suiv.).



Des Raisons , Proportions & Progressions , & de quelques Regles qui en dépendent.

162. Les mots *raison* & *rapport* ont la même signification en Mathématiques , & l'un & l'autre expriment le résultat de la comparaison de deux quantités.

163. Si dans la comparaison de deux quantités , on a pour but de connoître de combien l'une surpasse l'autre , ou en est surpassée , le résultat de cette comparaison , qui est la différence de ces deux quantités , se nomme leur *Rapport arithmétique*.

Ainsi , si je compare 15 avec 8 , pour connoître leur différence 7 ; ce nombre 7 qui est le résultat de la comparaison , est le rapport arithmétique de 15 à 8.

Pour marquer que l'on compare deux quantités sous ce point de vue , on sépare l'une de l'autre par un point ; en sorte que 15.8 marque que l'on considère le rapport arithmétique de 15 à 8.

164. Si dans la comparaison de deux quantités , on se propose de connoître combien l'une contient l'autre , ou est contenue

en elle , le résultat de cette comparaison se nomme leur *Rapport Géométrique*. Par exemple , si je compare 12 à 3 pour savoir combien de fois 12 contient 3 , le nombre 4 qui exprime ce nombre de fois , est le rapport géométrique de 12 à 3.

Pour marquer que l'on compare deux quantités sous ce point de vue , on sépare l'une de l'autre par deux points : cette expression 12 : 3 marque que l'on considère le rapport géométrique de 12 à 3.

165. Des deux quantités que l'on compare , celle qu'on énonce ou qu'on écrit la première , se nomme *antécédent* , & la seconde se nomme *conséquent*. Ainsi dans le rapport 12 : 3 , 12 est l'antécédent , & 3 est le conséquent ; l'un & l'autre s'appellent les *termes* du rapport.

166. Pour avoir le rapport arithmétique de deux quantités , il n'y a donc autre chose à faire qu'à retrancher la plus petite de la plus grande.

167. Et pour avoir le rapport géométrique de deux quantités , il faut diviser l'une par l'autre.

168. Nous évaluerons ce rapport ; dorénavant , en divisant l'antécédent par le conséquent , ainsi le rapport de 12 à 3

est 4 ; & le rapport de 3 à 12 est $\frac{3}{12}$ ou $\frac{1}{4}$.

169. Un rapport arithmétique ne change point quand on ajoute à chacun de ses deux termes ou qu'on en retranche une même quantité, parce que la différence, (en quoi consiste le rapport), reste toujours la même.

170. Un rapport géométrique ne change point quand on multiplie ou quand on divise ses deux termes par un même nombre : car le rapport géométrique consistant (168) dans le quotient de la division de l'antécédent par le conséquent, est une quantité fractionnaire qui (88) ne peut changer par la multiplication ou la division de ses deux termes, par un même nombre. Ainsi le rapport 3 : 12 est le même que celui 6 : 24 que l'on a en multipliant les deux termes du premier par 2 ; il est le même que celui de 1 : 4 que l'on a en divisant par 3.

171. Cette propriété sert à simplifier les rapports. Par exemple, si j'avois à examiner le rapport de $6\frac{3}{4}$ à $10\frac{2}{3}$, je dirais, en réduisant tout en fraction, ce rapport est le même que celui de $\frac{27}{4}$ à $\frac{32}{3}$, ou en réduisant au même dénominateur, le même que celui de $\frac{81}{12}$ à $\frac{128}{12}$, ou enfin

en supprimant le dénominateur 12, (ce qui revient au même que de multiplier les deux termes du rapport par 12 ,) est le même que celui de 81 à 128.

172. Lorsque quatre quantités sont telles que le rapport des deux premières, est le même que le rapport des deux dernières, on dit que ces quatre quantités, forment une *proportion* ; & cette proportion est arithmétique ou géométrique, selon que le rapport qu'on y considère est arithmétique, ou géométrique.

Les quatre quantités, 7, 9, 12, 14 forment une proportion arithmétique ; parce que la différence des deux premières est la même que celle des deux dernières. Pour marquer qu'elles sont en proportion arithmétique, on les écrit ainsi, 7. 9 : 12. 14 ; c'est-à-dire, qu'on sépare, par un point, les deux termes de chaque rapport ; & les deux rapports, par deux points. Le point qui sépare les deux termes de chaque rapport, signifie *est à*, & les deux points qui séparent les deux rapports, signifient *comme* ; en sorte que pour énoncer la proportion ainsi écrite, on dit 7 est à 9 comme 12 est à 14.

Les quatre quantités 3, 15, 4, 20,

forment une proportion géométrique ; parce que 3 est contenu dans 15 , comme 4 l'est dans 20. Pour marquer qu'elles sont en proportion géométrique , on les écrit ainsi $3 : 15 :: 4 : 20$; c'est-à-dire , qu'on sépare les deux termes de chaque rapport par deux points , & les deux rapports par quatre points. Les deux points signifient *est à* , & les quatre points signifient *comme* ; de sorte qu'on dit 3 *est à* 15 , *comme* 4 *est à* 20.

Il faut seulement observer que , dans la proportion arithmétique , on fait précéder le mot *comme* , du mot *arithmétiquement*.

173. Le premier & le dernier terme de la proportion se nomment les *extrêmes* ; le 2^e & le 3^e se nomment les *moyens*.

Comme il y a deux rapports , & par conséquent deux antécédens & deux conséquens ; on dit , pour le premier rapport ; *premier antécédent* , *premier conséquent* ; & pour le second , *second antécédent* , *second conséquent*.

174. Quand les deux termes moyens d'une proportion sont égaux , la proportion se nomme proportion *continue* , $3 . 7 : 7 . 11$ forment une proportion arithmétique continue ; on l'écrit ainsi $\div 3 . 7 . 11 .$; les deux points & la barre qui

précédent , font pour avertir que dans l'énoncé , on doit répéter le terme moyen qui est , ici , 7.

La proportion $5 : 20 :: 20 : 80$ est une proportion géométrique continue , que par abréviation on écrit ainsi $\div 5 : 20 : 80$; l'usage des quatre points & de la barre est le même que dans la proportion arithmétique continue.

175. Il s'agit de ce que nous venons de dire sur les proportions arithmétiques & géométriques.

1°. Que si dans une proportion arithmétique , on ajoute à chacun des antécédens , ou si l'on en retranche la différence ou raison qui regne dans cette proportion , selon que l'antécédent sera plus grand ou plus petit que son conséquent , chaque antécédent deviendra égal à son conséquent ; car c'est donner au plus petit terme de chaque rapport , ce qui lui manque pour égaler son voisin ; ou retrancher du plus grand , ce dont il surpasse son voisin : ainsi dans la proportion $3 . 7 : 8 . 12$, ajoutez la différence 4 au premier & au troisième terme , vous aurez $7 . 7 : 12 . 12$, & il est aisé de sentir que cela est général.

2°. Si dans une proportion géométrique

vous multipliez chacun des deux conséquens, par le rapport, vous les rendrez pareillement égaux chacun à son antécédent ; car multiplier le conséquent par le rapport, c'est le prendre autant de fois qu'il est contenu dans l'antécédent : ainsi dans la proportion $12 : 3 :: 20 : 5$, multipliez 3 & 5, chacun par 4, & vous aurez $12 : 12 :: 20 : 20$. Pareillement, dans la proportion $15 : 9 :: 45 : 27$, multipliez 9 & 27 chacun par $\frac{15}{9}$ ou $\frac{5}{3}$ qui est le rapport, vous aurez $15 : 15 :: 45 : 45$.

*Propriétés des Proportions
Arithmétiques.*

176. La propriété fondamentale des proportions arithmétiques est que la somme des extrêmes est égale à la somme des moyens ; par exemple, dans cette proportion $3 . 7 : 8 . 12$, la somme 3 & 12 des extrêmes, & celle 7 & 8 des moyens, sont également 15.

Voici comment on peut s'assurer que cette propriété est générale.

Si les deux premiers termes étoient égaux entr'eux, & les deux derniers égaux aussi entr'eux, comme dans cette proportion :

$$7 . 7 : 12 . 12$$

il est évident que la somme des extrêmes seroit égale à celle des moyens.

Or toute proportion arithmétique peut être ramenée à cet état (175) en ajoutant à chaque antécédent, ou en ôtant la différence qui regne dans la proportion. Cette addition qui augmentera également la somme des extrêmes & celle des moyens, ne peut rien changer à l'égalité de ces deux sommes ; ainsi si elles deviennent égales par cette addition, c'est qu'elles étoient égales sans cette même addition. Le raisonnement est le même pour le cas de la soustraction.

177. Puisque dans la proportion continue les deux termes moyens sont égaux, il suit de ce qu'on vient de démontrer, que dans cette même proportion, la somme des extrêmes est double du terme moyen, ou que le terme moyen est la moitié de la somme des extrêmes : ainsi pour avoir un moyen arithmétique entre 7 & 15, par exemple ; j'ajoute 7 à 15, & prenant la moitié de la somme 22, j'ai 11 pour le terme moyen, en sorte que
 $\div 7.11.15.$



*Propriétés des Proportions
Géométriques.*

178. La propriété fondamentale de la proportion géométrique , est que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens ; par exemple dans cette proportion $3 : 15 :: 7 : 35$, le produit de 35 par 3 , & celui de 15 par 7 sont également 105.

Voici comment on peut se convaincre que cette propriété a lieu dans toute proportion géométrique.

Si les antécédens étoient égaux à leurs conséquens , comme dans cette proportion , $3 : 3 :: 7 : 7$.

Il est évident que le produit des extrêmes seroit égal au produit des moyens.

Mais on peut toujours ramener une proportion à cet état , (175) en multipliant les deux conséquens par la raison. Cette multiplication fera , à la vérité , que le produit des extrêmes sera un certain nombre de fois plus grand qu'il n'auroit été , ou sera un certain nombre de fois plus petit ; si le rapport est une fraction ; mais elle produira le même effet sur celui des moyens ; donc , puisqu'après cette multiplication ,

le produit des extrêmes seroit égal au produit des moyens , ces deux produits doivent aussi être égaux sans cette même multiplication.

On peut donc prendre le produit des extrêmes pour celui des moyens , & réciproquement.

Donc *dans la proportion continue , le produit des extrêmes est égal au quarré du terme moyen ;* car les deux moyens étant égaux , leur produit est le quarré de l'un d'eux. Donc pour avoir un moyen géométrique entre deux nombres proposés , il faut multiplier ces deux nombres l'un par l'autre , & tirer la racine quarrée de ce produit. Ainsi pour avoir un moyen géométrique entre 4 & 9 , je multiplie 4 par 9 , & la racine quarrée 6 du produit 36 , est le moyen proportionnel cherché.

179. De la propriété fondamentale de la proportion géométrique , il suit que si connoissant les trois premiers termes d'une proportion , on vouloit déterminer le quatrième , il faudroit *multiplier le second par le troisieme , & diviser le produit par le premier ;* car il est évident (74) qu'on auroit le quatrième terme en divisant le produit des deux extrêmes , par le premier terme ;

or ce produit est le même que celui des moyens ; donc on aura aussi le quatrième terme , en divisant le produit des moyens , par le premier terme.

Ainsi si l'on demande quel seroit le quatrième terme d'une proportion , dont les trois premiers seroient $3 : 8 :: 12$; je multiplie 8 par 12 , ce qui me donne 96 que je divise par 3 ; le quotient 32 , est le quatrième terme demandé ; en sorte que 3 , 8 , 12 , 32 forment une proportion : en effet le premier rapport est $\frac{3}{8}$, & le second est $\frac{12}{32}$ qui , (89) en divisant les deux termes par 4 , est aussi $\frac{3}{8}$.

Par un semblable raisonnement , on voit qu'on peut trouver tout autre terme de la proportion lorsqu'on en connoît trois. *Si le terme qu'on veut trouver est un des extrêmes , il faudra multiplier les deux moyens , & diviser par l'extrême connu : si au contraire on veut trouver un des moyens , il faudra multiplier les deux extrêmes , & diviser par le terme moyen connu.*

180. Cett propriété de l'égalité entre le produit des extrêmes & celui des moyens , ne peut appartenir qu'à quatre quantités en proportion géométrique : en effet , si l'on avoit quatre quantités qui ne

fussent point en proportion géométrique ; en multipliant les conséquens par le rapport des deux premières , il n'y auroit que le premier antécédent qui deviendrait égal à son conséquent ; par exemple , si l'on avoit 3, 12, 5, 10 , en multipliant les conséquens 12 & 10 par la raison $\frac{1}{4}$ des deux premiers termes 3 & 12 , on auroit 3, 3, 5, $\frac{10}{4}$ dans lesquels il est évident que le produit des extrêmes , ne peut être égal à celui des moyens ; donc ces produits ne pourroient pas être égaux non plus , quand même on n'auroit pas multiplié les conséquens par la raison $\frac{1}{4}$: il est visible que ce raisonnement peut s'appliquer à tous les cas.

Donc , *si quatre quantités sont telles que le produit des extrêmes soit égal au produit des moyens , ces quatre quantités sont en proportion.*

De-là nous concluons cette seconde propriété des proportions.

181. *Si quatre quantités sont en proportion , elles y seront encore si l'on met les extrêmes à la place des moyens , & les moyens à la place des extrêmes.*

182. *La même chose aura lieu , c'est-à-dire , que la proportion subsistera si l'on échange les places des extrêmes , ou celles des moyens.*

En effet, dans tous ces cas , il est aisé de voir que le produit des extrêmes sera toujours égal à celui des moyens.

Ainsi la proportion $3 : 8 :: 12 : 32$ peut fournir toutes les proportions suivantes par la seule permutation de ses termes.

$$\begin{array}{l} 3 : 8 :: 12 : 32 \\ 3 : 12 :: 8 : 32 \\ 32 : 12 :: 8 : 3 \\ 32 : 8 :: 12 : 3 \\ 8 : 3 :: 32 : 12 \\ 8 : 32 :: 3 : 12 \\ 12 : 3 :: 32 : 8 \\ 12 : 32 :: 3 : 8 \end{array}$$

Et il en est de même de toute autre proportion.

I 83. Puisqu'on peut mettre le troisieme terme à la place du second, & réciproquement, on doit en conclure *qu'on peut, sans troubler une proportion, multiplier ou diviser les deux antécédens par un même nombre, & qu'il en est de même à l'égard des conséquens* ; car en faisant cette permutation, les deux antécédens de la proportion donnée formeront le premier rapport ; & les deux conséquens, le second. Ainsi multiplier les deux antécédens de la premiere

proportion, revient alors, à multiplier les deux termes d'un rapport, chacun par un même nombre; ce qui (170) ne change point ce rapport. Par exemple, si j'ai la proportion $3 : 7 :: 12 : 28$; je puis, en divisant les deux antécédens, par 3, dire $1 : 7 :: 4 : 28$, parce que, de la proportion $3 : 7 :: 12 : 28$, on peut (182) conclure $3 : 12 :: 7 : 28$; & en divisant les deux termes du premier rapport par 3, $1 : 4 :: 7 : 28$, qui (182) peut être changée en $1 . 7 . . 4 . 28$.

184. *Tout changement fait dans une proportion, de maniere que la somme de l'antécédent & du conséquent, ou leur différence, soit comparée à l'antécédent ou au conséquent, de la même maniere dans chaque rapport, formera toujours une proportion.*

Par exemple, si l'on a la proportion.

$$12 : 3 :: 32 : 8$$

on en pourra conclure les proportions suivantes.

12 plus 3 : 3 :: 32 plus 8 : 8
 ou 12 moins 3 : 3 :: 32 moins 8 : 8
 ou 12 plus 3 : 12 :: 32 plus 8 : 32
 ou 12 moins 3 : 12 :: 32 moins 8 : 32

Car, si c'est au conséquent que l'on compare, il est facile de voir que l'antécédent augmenté

augmenté ou diminué du conséquent , contiendra ce conséquent , une fois de plus , ou une fois de moins qu'auparavant ; & comme cette comparaison se fait de la même manière pour le second rapport , qui , par la nature de la proportion , est égal au premier , il s'ensuit nécessairement que les deux nouveaux rapports seront aussi égaux entr'eux.

Si c'est à l'antécédent que l'on compare ; le même raisonnement aura encore lieu , en concevant que dans la proportion sur laquelle on fait ce changement , on ait mis l'antécédent de chaque rapport , à la place de son conséquent , & le conséquent à la place de l'antécédent ; ce qui est permis (181).

185. Puisqu'en mettant le troisième terme d'une proportion à la place du second , & réciproquement , il y a encore proportion (182) , on doit conclure que les deux antécédens se contiennent l'un l'autre , autant de fois que les conséquens se contiennent aussi l'un l'autre.

Donc la somme des deux antécédens de toute proportion , contient la somme des deux conséquens , ou est contenue en elle , autant

Arithmétique. M

*qu'un des antécédens contient son conséquent ;
ou est contenu en lui.*

Par exemple , dans la proportion :

$$12 : 3 :: 32 : 8$$

12 plus 32 : 3 plus 8 :: 32 : 8 , ce qui
est évident.

Mais , pour s'en convaincre générale-
ment , il n'y a qu'à faire attention que si
le premier antécédent contient le second ,
quatre fois , par exemple ; la somme des
deux antécédens contiendra le second ,
cinq fois ; & par la même raison , la somme
des conséquens , contiendra le second con-
séquent , 5 fois : donc la somme des anté-
cédens , contiendra celle des conséquens ,
comme le quintuple d'un des antécédens ,
contient le quintuple de son conséquent ,
c'est-à-dire , (170) comme un des antécé-
dens , contient son conséquent.

On prouveroit de même , que la diffé-
rence des antécédens , est à la différence
des conséquens , comme un antécédent
est à son conséquent.

186. Il est évident que la proposition
qu'on vient de démontrer , revient à celle-
ci , si on a deux rapports égaux , par exem-
ple , celui de . . . 4 : 12
& celui de . . . 7 : 21

$$11 : 33$$

On aura encore le même rapport , en ajoutant antécédent à antécédent , & conséquent à conséquent.

Donc , si l'on a plusieurs rapports égaux ; la somme de tous les antécédens , est à la somme de tous les conséquens , comme l'un des antécédens , est à son conséquent. Par exemple , si on a les rapports égaux $4 : 12 :: 7 : 21 :: 2 : 6$; on peut dire que 4 plus 7 plus 2 , sont à 12 plus 21 plus 6 , comme 4 est à 12 , ou comme 7 est à 21 , &c.

Car après avoir ajouté , entr'eux , les antécédens des deux premiers rapports , & leurs conséquens aussi entr'eux , le nouveau rapport , qui , selon ce qu'on vient de voir , fera le même que chacun des deux premiers , fera aussi le même que le troisième ; par conséquent on pourra le combiner de même avec celui-ci , & il en résultera encore le même rapport , & ainsi de suite.

187. On appelle *Rapport composé*, celui qui résulte de deux ou d'un plus grand nombre de rapports dont on multiplie les antécédens entr'eux , & les conséquens entr'eux. Par exemple , si l'on a les deux rapports $12 : 4$ & $25 : 5$; le produit des antécédens 12 & 25 , fera 300 , celui des conséquens 4 & 5 , fera 20 , le rapport

de 300 à 20, est ce qu'on appelle rapport composé des rapports de 12 à 4, & de 25 à 5.

188. Ce rapport est le même que si l'on avoit évalué séparément chacun des rapports composans, & qu'on eût multiplié, entr'eux, les nombres qui expriment ces rapports; en effet, le rapport de 12 à 4 est 3, celui de 25 à 5 est 5; or 3 fois 5 font 15 qui est le rapport de 300 à 20, & on peut voir que cela est général, en faisant attention que le rapport est mesuré (168) par une fraction qui a l'antécédent pour numérateur, & le conséquent pour dénominateur: ainsi le rapport composé doit être une fraction qui ait pour numérateur le produit des deux antécédens, & pour dénominateur le produit des deux conséquens; c'est donc (106) le produit des deux fractions qui expriment les rapports composans.

189. Si les rapports que l'on multiplie sont égaux; le rapport composé est dit *rapport doublé*, si l'on n'a multiplié que deux rapports; *rapport triplé*, si l'on en a multiplié trois; *quadruplé*, si l'on en a multiplié quatre, & ainsi de suite. Par exemple, si l'on multiplie le rapport de

2 à 3, par celui de 4 à 6, qui lui est égal; on aura le rapport composé 8 : 18 qui sera dit rapport *doublé* du rapport de 2 à 3, ou de 4 à 6.

190. *Si l'on a deux proportions, & qu'on les multiplie par ordre; c'est-à-dire, le premier terme de l'une, par le premier terme de l'autre, le second par le second, & ainsi de suite; les quatre produits qui en résulteront, seront en proportion.*

Car en multipliant ainsi deux proportions, c'est multiplier deux rapports égaux par deux rapports égaux (172); donc les deux rapports composés qui en résultent, doivent être égaux; donc les quatre produits doivent être en proportion (172).

191. *Concluons de-là que les quarrés, les cubes, & en général les puissances semblables de quatre quantités en proportion, sont aussi en proportion; puisque, pour former ces puissances, il ne faut que multiplier la proportion, par elle-même, plusieurs fois de suite.*

192. *Les racines quarrées, cubiques; & en général les racines semblables de quatre quantités en proportion, sont aussi en proportion; car le rapport des racines quarrées des deux premiers termes, n'est autre chose*

que la racine quarrée du rapport de ces deux termes (142 & 167) ; & il en est de même du rapport des racines quarrées des deux derniers termes : donc , puisque les deux rapports primitifs sont supposés égaux, leurs racines quarrées sont égales , donc le rapport des racines quarrées des deux premiers termes , fera égal au rapport des racines quarrées des deux derniers. On prouvera , de même, pour les racines cubique, quatrieme , &c.

Usages des Propositions précédentes.

193. Les propositions que nous venons de démontrer , & qu'on appelle les *Regles des Proportions*, ont des applications continuelles dans toutes les parties des Mathématiques. Nous nous bornerons , ici , à celles qui appartiennent à l'Arithmétique , & nous commencerons par celle qu'on peut faire de ce qui a été établi (179), & qui est la base de presque toutes les autres.



De la Regle de Trois directe & simple.

194. On distingue plusieurs sortes de Regles de *Trois* : elles ont toutes pour objet de faire connoître un terme d'une proportion dont on en connoît trois.

Celle qu'on appelle *Regle de trois directe & simple*, est nommée *simple*, parce que l'énoncé des questions auxquelles on l'applique, ne renferme jamais plus de quatre quantités, dont trois sont connues, & la quatrième est à trouver.

On l'appelle *directe*, parce que des quatre quantités qu'on y considère, il y en a toujours deux, qui non-seulement sont relatives aux deux autres, mais qui en dépendent de manière que, de même qu'une des quantités contient l'autre, ou est contenue en elle, de même aussi la quantité relative à la première, contient la quantité relative à la seconde, ou est contenue en elle ; c'est-à-dire, d'une manière plus abrégée, qu'une quantité & sa relative peuvent toujours être, toutes deux, ou antécédens ou conséquens dans la proportion, ce qui n'a pas lieu dans la regle de *Trois inverse*, comme nous le verrons dans peu.

La méthode, pour trouver le quatrième terme d'une proportion, & par conséquent pour faire la règle de Trois directe & simple, est suffisamment exposée (179); mais il est à propos de faire connoître, par quelques exemples, l'usage qu'on peut faire de cette règle.

E X E M P L E I.

40 Ouvriers ont fait, en un certain tems, 268 toises d'ouvrage; on demande combien 60 Ouvriers pourroient en faire dans le même tems?

Il est clair que le nombre des toises doit augmenter à proportion du nombre des Ouvriers; en sorte que celui-ci devenant double, triple, quadruple, &c. le premier doit devenir aussi double, triple, quadruple, &c. Ainsi l'on voit que le nombre de toises cherché, doit contenir les 268 toises, autant que le nombre 60, relatif au premier, contient le nombre 40 relatif au second: il faut donc chercher le quatrième terme d'une proportion qui commenceroit par ces trois-ci.....

$$40 : 60 :: 268 :$$

Ou, (en divisant ces deux premiers

DE MATHÉMATIQUES. 185

termes par 20, ce qui est permis (170)),
par ces trois autres.....

$$2 : 3 :: 268^T :$$

Ainsi, selon ce qui a été dit (179); je multiplie 268^T , par 3, & je divise le produit 804, par 2; ce qui donne pour quotient, 402^T ; & par conséquent 402^T pour l'ouvrage que feroient les 60 Ouvriers.

E X E M P L E I I.

Un navire a fait, avec le même vent, 275 lieues en 3 jours; on demande en combien de tems il en feroit 2000, toutes les autres circonstances demeurant les mêmes.

Il est évident qu'il faut plus de tems, à proportion du nombre de lieues; & que par conséquent, le nombre de jours cherché, doit contenir 3 jours, autant que 2000 lieues contiennent 275 lieues: il faut donc chercher le quatrième terme d'une proportion qui commenceroit par ces trois-ci.

$$275 : 2000 :: 3 :$$

Multipliant 2000 par 3, & divisant le produit 6000 par 275, on aura 21 ^{jours} $\frac{2}{11}$.

E X E M P L E I I I .

52^T 4^P 5^P d'ouvrage ont été payées
168^u 9^f 4^d ; on demande combien on doit
payer pour 77^T 1^P 8^P ?

Le prix de 77^T 1^P 8^P doit contenir le
prix 168^u 9^f 4^d des 52^T 4^P 5^P, autant que
77^T 1^P 8^P contiennent 52^T 4^P 5^P. Il faut
donc chercher le quatrieme terme d'une
proportion qui commenceroit par ces
trois-ci.

$$52^T 4^P 5^P : 77^T 1^P 8^P :: 168^u 9^f 4^d :$$

C'est-à-dire, qu'il faut multiplier 168^u
9^f 4^d par 77^T 1^P 8^P, & diviser le produit
par 52^T 4^P 5^P, ce qu'on peut faire par ce
qui a été dit (122 & 128).

Mais il sera encore plus simple de ré-
duire les deux premiers termes à leur plus
petite espece, c'est-à-dire, en pouces ; &
la question sera réduite à chercher le qua-
trieme terme d'une proportion qui com-
menceroit par ces trois autres.

$$3797 : 5564 :: 168^u 9^f 4^d :$$

Alors multipliant 168^u 9^f 4^d par 5564 ;
on aura 937348^u 10^f 8^d ; & divisant par
3797, le quotient 246^u 17^f 3^d $\frac{2780}{3797}$ sera ce
qu'on doit payer pour les 77^T 1^P 8^P.

S'il y avoit des fractions ; après avoir

réduit les deux termes de même espece, à leur plus petite unité, comme dans cet exemple, on simplifieroit le rapport de ces deux termes de la maniere qui a été enseignée (171).

*De la Regle de Trois inverse
& simple.*

195. La regle de *Trois inverse & simple*, differe de la regle de *Trois directe*, dont nous venons de parler, en ce que, des quatre quantités qui entrent dans l'énoncé de la question pour laquelle on fait cette opération, les deux principales doivent se contenir l'une l'autre, dans un ordre tout opposé à celui des deux autres quantités qui leur sont relatives; enforte que, lorsque par l'examen de la question, on a donné, à ces quantités, la disposition convenable pour former une proportion, l'une des quantités principales, & sa relative, forment les extrêmes; & l'autre quantité principale, avec sa relative, forment les moyens.

Au reste, cela n'introduit aucune différence dans la maniere de faire l'opération, c'est toujours le quatrieme terme

d'une proportion, qu'il s'agit de trouver ; ou du moins, on peut toujours amener la chose à ce point.

Quelques Arithméticiens ont prescrit, pour le cas présent, une règle assujettie à l'énoncé de la question : nous ne suivrons point leur exemple, c'est la nature de la question, & non pas son énoncé, (qui souvent est vicieux), qui doit diriger dans la résolution.

E X E M P L E I.

30 Hommes ont fait un certain ouvrage en 25 jours ; combien faudroit-il d'hommes, pour faire le même ouvrage en 10 jours ?

On voit qu'il faut, dans ce second cas ; d'autant plus d'hommes, que le nombre de jours est moindre ; ainsi le nombre d'hommes cherché, doit contenir le nombre de 30 hommes, autant que le nombre 25 de jours, relatif à ceux-ci, contient le nombre 10 de jours, relatif à ceux-là. Il ne s'agit donc que de trouver le quatrième terme d'une proportion qui commenceroit par ces trois-ci.

$$10^j : 25^j :: 30^{\text{hum.}}$$

C'est-à-dire, de multiplier 30 par 25,
& de diviser le produit 750 par 10 ; ce qui
donne 75 ou 75^{hom.}

E X E M P L E I I.

Un Equipage n'a plus que pour 15 jours
de vivres ; mais les circonstances doivent
lui faire tenir encore la mer pendant 20
jours ; on demande à combien on doit
réduire la totalité des rations, par jour ?

Représentons par l'unité, la totalité des
vivres que l'on consomme par jour ; on voit
que ce à quoi on doit se restreindre, doit
être d'autant moindre que cette unité,
que le nombre 20 des jours, pendant les-
quels cette économie doit durer, est plus
grand que le nombre de 15 jours ; que par
conséquent, de même que 20 jours contien-
nent 15 jours, de même la totalité des
vivres que l'on auroit consommés pendant
chacun de ces 15 jours, doit contenir celle
des vivres que l'on consommera pendant
chacun des 20 jours : il faut donc chercher
le quatrieme terme d'une proportion qui
commenceroit par les trois suivans.....

$$20^j : 15^j :: 1 :$$

Ce quatrieme terme sera $\frac{15}{20}$ ou $\frac{3}{4}$; il faut

donc se réduire aux $\frac{3}{4}$ de ce qu'on auroit consommé par jour.

De la Regle de Trois composée.

196. Dans les deux regles de Trois que nous venons d'exposer, la quantité cherchée & la quantité de même espece qui entre dans l'énoncé de la question, ont entr'elles un rapport simple & déterminé par celui des deux autres quantités qui entrent pareillement dans l'énoncé de la question.

Dans la regle de Trois composée, le rapport de la quantité cherchée à la quantité de même espece qui entre dans l'énoncé de la question, n'est pas donné par le rapport simple de deux autres quantités seulement, mais par plusieurs rapports simples qu'il s'agit de composer (187) d'après l'examen de la question.

Quand une fois ces rapports ont été composés, la regle est réduite à une regle de Trois simple : les exemples suivans vont éclaircir ce que nous disons.

E X E M P L E.

30 Hommes ont fait 132 toises d'ou-

vrage, en 18 jours, combien 54 hommes en feront-ils en 28 jours?

On voit que l'ouvrage dépend ici, non-seulement du nombre des hommes, mais encore du nombre des jours.

Pour avoir égard à l'un & à l'autre, il faut considérer que 30 hommes travaillant pendant 18 jours, ne font qu'autant que 18 fois 30 hommes; c'est-à-dire, que 540 hommes qui travailleroient pendant un jour.

Pareillement, 54 hommes travaillant pendant 28 jours, ne font qu'autant que feroient 28 fois 54 hommes, ou 1512 hommes travaillant pendant un jour.

La question est donc changée en celle-ci : 540 hommes ont fait 132 toises d'ouvrage, combien 1512 hommes en feroient-ils dans le même tems? c'est-à-dire, qu'il faut chercher le quatrième terme d'une proportion qui commenceroit par ces trois-ci.....

$$540^h : 1512^h :: 132^T :$$

Multipliant 1512 par 132, & divisant le produit, par 540, on trouvera pour réponse à la question, $369^T 3^P 7^P 2^{\frac{1}{5}}$.

E X E M P L E I I.

Un homme marchant 7 heures par jour ; a mis 30 jours à faire 230 lieues ; s'il marchoit 10 heures par jour , combien emploieroit-il de jours pour faire 600 lieues , allant toujours avec la même vitesse.

S'il marchoit pendant le même nombre d'heures par jour , dans chaque cas , on voit qu'il emploieroit d'autant plus de jours , qu'il y a plus de chemin à faire ; mais comme il marche pendant un plus grand nombre d'heures , chaque jour , dans le second cas , il lui faudroit moins de tems par cette raison ; ainsi l'opération tient en partie à la règle de Trois directe , & en partie à la règle de Trois inverse.

On la réduira à une règle de Trois simple , en considérant que marcher pendant 30 jours , en employant 7 heures chaque jour , c'est marcher pendant 30 fois 7 heures , ou 210 heures ; ainsi on peut changer la question en cette autre : il a fallu 210 heures pour faire 230 lieues ; combien en faudra-t-il pour faire 600 lieues ? Quand on aura trouvé le nombre d'heures qui satisfait à cette question ; en le divisant par 10 , on aura le nombre de jours demandé

demandé, puisque l'homme, dont il s'agit, emploie dix heures par jour.

Ainsi il faut chercher le quatrième terme de la proportion, dont les trois premiers sont.....

$$230^l : 600^l :: 210^h :$$

On trouvera que ce quatrième terme est 547 heures & $\frac{10}{23}$, lesquelles divisées par 10, nombre des heures que cet homme emploie chaque jour, donnent 54 jours & $\frac{180}{230}$ ou 54 $\frac{18}{23}$.

De la Regle de Société.

197. La Regle de Société est ainsi nommée parce qu'elle sert à partager, entre plusieurs associés, le bénéfice ou la perte résultant de leur société.

Son but est de partager un nombre proposé, en parties qui aient entr'elles des rapports donnés.

La regle que l'on donne pour cet effet, est fondé sur ce que nous avons établi (186) : nous allons la déduire de ce principe dans l'exemple suivant.

E X E M P L E I.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse
Arithmétique. N

de partager 120, en trois parties qui aient entr'elles les mêmes rapports que les nombres 4, 3, 2, l'énoncé de la question fournit ces deux proportions.

4 : 3 :: la premiere partie, est à la seconde.

4 : 2 :: la premiere partie, est à la troisieme.

Ou (182) ces deux autres.

4 est à la premiere partie :: 3 est à la seconde.

4 est à la premiere partie :: 2 est à la troisieme.

De sorte qu'on a ces trois rapports égaux ;
4 est à la premiere partie : : 3 est à la seconde : : 2 est à la troisieme.

Or on a vu (186) que la somme des antécédens de plusieurs rapports égaux, est à la somme des conséquents, comme un antécédent est à son conséquent ; on peut donc dire ici, que la somme 9 des trois parties proportionnelles à celles que l'on cherche, est à la somme 120 de celles-ci, comme l'une quelconque des trois parties proportionnelles, est à la partie de 120 qui lui répond.

La regle se réduit donc, 1°. à faire une totalité des parties proportionnelles données ; 2°. à faire autant de regles de Trois, qu'il y a de parties à trouver, & dont chacune aura, pour premier terme, la somme des parties proportionnelles

Données ; pour second terme , le nombre proposé à diviser ; & pour troisieme terme l'une des parties proportionnelles données ; ainsi dans la question que nous avons prise pour exemple , on auroit ces trois regles de Trois à faire.

$$9 : 120 :: 4 :$$

$$9 : 120 :: 3 :$$

$$9 : 120 :: 2 :$$

Dont on trouvera (179) que les quatriemes termes sont $53\frac{1}{3}$, 40 , $26\frac{2}{3}$ qui ont entr'eux les rapports demandés , & qui composent , en effet , le nombre 120.

Mais il est aisé de remarquer qu'il n'est pas absolument nécessaire de faire autant de regles de Trois qu'il y a de parties à trouver : on peut se dispenser de la dernière , en retranchant du nombre proposé , la somme des autres parties , quand on les a trouvées.

EXEMPLE II.

Trois personnes ont à partager le bénéfice de la prise d'un vaisseau. La premiere a fait un fonds de 20000^l , la seconde de 60000^l , la troisieme de 120000^l ; on demande ce qui revient à chacune , sur la

prise estimée 800000 liv. tous frais faits.

On voit qu'il s'agit de partager 800000^{fr} en parties, qui aient entr'elles, les mêmes rapports que 20000, 60000, 120000, ou (170) que 2, 6, 12, puisque chacun doit avoir proportionnellement à sa mise ; il faut donc ajouter les trois parties proportionnelles 2, 6, 12, & faire les trois proportions suivantes, ou seulement deux.

20 : 800000 :: 2^{te} : la premiere partie.

20 : 800000 :: 6^{te} : la seconde partie.

20 : 800000 :: 12^{te} : la troisieme partie.

Ces trois parties seront 80000^{fr}, 240000^{fr}, 480000^{fr}.

La question pourroit être plus compliquée, & cependant être ramenée aux mêmes principes, comme dans l'exemple qui suit.

EXEMPLE III.

Trois personnes ont mis en société ; la premiere 3000^{fr}, qui ont été pendant six mois dans la société ; la seconde, 4000 qui y ont été pendant cinq mois ; & la troisieme, 8000^{fr} qui y ont resté pendant neuf mois ; combien chacun doit-il avoir sur le bénéfice qui monte à 12050^{fr} ?

On réduira toutes les mises à un

même temps, en cette maniere :

La mise de 3000^l a dû produire pendant 6 mois, autant que 6 fois 3000 ou 18000^l, pendant un mois.

La mise de 4000^l a dû produire, pendant 5 mois, autant que 5 fois 4000^l ou 20000^l, pendant un mois.

Enfin la mise de 8000^l a dû produire en 9 mois, autant que 9 fois 8000^l ou 72000^l, pendant un mois.

Ainsi la question est réduite à cette autre ; les mises des trois Associés sont 18000^l, 20000, 72000^l ; combien revient-il à chacun sur le gain 12050^l.

En procédant comme dans l'exemple ci-dessus, on trouvera 1971^l 16^l 4^d $\frac{4}{11}$, 2190^l 18^l 2^d $\frac{2}{11}$, 7887^l 5^l 5^d $\frac{5}{11}$.

Remarque au sujet de la Règle précédente.

198. Il n'est pas inutile d'examiner un cas qui peut embarrasser les Commencans. Si l'on proposoit cette question, partager 650 en trois parties, dont la première soit à la seconde : : 5 : 4, & dont la première soit à la troisième : : 7 : 3.

On ne peut pas appliquer, ici, la regle

précédente, sans une préparation qui consiste à rendre la même, dans chaque rapport donné, la partie proportionnelle de l'une des trois parts cherchées; par exemple, celle de la première: cela s'exécute aisément, en multipliant les deux termes de chaque rapport, par le premier terme de l'autre rapport; ainsi les deux rapports $5 : 4$ & $7 : 3$, seront ramenés à avoir un même premier terme, en multipliant les deux termes du premier par 7, & les deux termes du second par 5, ce qui n'en change pas la valeur (170), & donne les rapports $35 : 28$ & $35 : 15$, en sorte que la question se réduit à partager 650, en trois parties qui soient entr'elles comme les nombres 35, 28 & 15; ce qui se fera aisément par la règle précédente.

Si l'on demandoit de partager un nombre en quatre parties, dont la première fût à la seconde :: $5 : 4$, la première à la troisième :: $9 : 5$; & la première à la quatrième :: $7 : 3$; on réduiroit ces rapports à avoir un même premier terme, en multipliant les deux termes de chacun par le produit des premiers termes, des deux autres; ainsi dans cet exemple on changeroit ces trois rapports, en ces trois autres,

315 : 252, 315 : 175, 315 : 135 ; enforte que la question se réduit à partager le nombre proposé , en quatre parties qui soient entr'elles comme les nombres 315 , 252 , 175 & 135.

*De quelques autres Regles dépendantes
des Proportions:*

* 199. Quoique les regles suivantes soient d'un usage moins fréquent que les précédentes , nous ne pouvons cependant les omettre absolument : outre qu'elles ne sont pas sans utilité par elles-mêmes , elles sont d'ailleurs propres à faire sentir les usages des proportions.

200. La premiere dont nous parlerons , est la Regle d'une *fausse position*. On l'applique souvent à résoudre des questions , qui appartiennent à la regle de Société , dont elle differe en ce qu'au lieu de prendre les parties proportionnelles telles qu'elles sont données par l'énoncé de la question , elle en prend une arbitrairement , & y subordonne les autres conformément à la question ; ce qui rend le calcul un peu plus facile.

E X E M P L E I.

Partager 640^{tt} , à trois personnes , dont la seconde ait le quadruple de la premiere , & la troisieme deux fois & $\frac{1}{2}$, autant que les deux autres ensemble.

Je prends arbitrairement , pour représenter la premiere partie , le nombre 3 , dont je puis prendre commodément le $\frac{1}{2}$.

La premiere partie étant 3 , la seconde sera 12 , & la troisieme 35.

La question est réduite à partager 640 ; en trois parties qui soient entr'elles comme les trois nombres 3 , 12 & 35 , ce qui se fera comme il a été dit (197).

La regle de fausse position sert aussi à résoudre des

questions qui sont, en quelque façon, l'inverse de celles de la règle de Société; puisqu'il s'agit de revenir de la somme de quelques parties d'un nombre, à ce nombre même comme dans l'exemple qui suit.

E X E M P L E I I.

On demande de trouver un nombre dont le $\frac{1}{3}$, le $\frac{1}{5}$ & les $\frac{2}{7}$ fassent 808. Je prends un nombre dont je puisse avoir commodément le $\frac{1}{3}$, le $\frac{1}{5}$ & les $\frac{2}{7}$; (ce qui est facile en multipliant les trois dénominateurs). Ce nombre sera 105; j'en prends le $\frac{1}{3}$ qui est 35, le $\frac{1}{5}$ qui est 21, & les $\frac{2}{7}$ qui sont 45; j'ajoute ces trois nombres, & j'ai 101 qui est composé des parties de 105, de la même manière que 808 l'est de celles du nombre en question; donc le nombre en question doit avoir même rapport à 808, que 105 à 101; il doit donc être le quatrième terme d'une proportion qui commenceroit par ces trois-ci

$$101 : 105 :: 808 :$$

Ce quatrième terme est 840, dont 808 renferme en effet le $\frac{1}{3}$ le $\frac{1}{5}$ & les $\frac{2}{7}$.

201. La seconde règle dont nous parlerons, est celle de deux fausses positions.

Eile sert dans les questions où il s'agit de partager, non pas le nombre même proposé, mais seulement une partie de ce nombre, en parties proportionnelles à des nombres donnés; l'exemple suivant fera connoître la règle & son usage.

E X E M P L E I I I.

Il s'agit de partager 6954th, entre trois personnes, de manière que la seconde ait autant que la première, & 54th de plus; & que la troisième ait autant que les deux autres ensemble, & 78th de plus.

Sans les 54 & 78th, il est clair qu'il ne s'agiroit que de partager le nombre proposé, en parties proportionnelles aux nombres 1, 1 & 2; mais puisqu'il faut prélever sur la somme, 54th pour la seconde personne, & 54th plus 78th pour la troisième; il est évident qu'il n'y a qu'une partie du nombre proposé, qu'on doit partager en parties proportion-

nelles à 1, 1 & 2 : comme cette partie qui est facile à trouver dans l'exemple actuel, peut être plus difficile à appercevoir dans d'autres circonstances, on suit la méthode que voici.

Supposons, pour la première part, tel nombre que nous voudrons, par exemple, 1^{te} ; la seconde part sera 1^{te} plus 54^{te} ; c'est à-dire, 55^{te} ; & la troisième sera 1^{te} plus 55^{te} plus 78^{te} ; c'est-à-dire, 134 : la totalité de ces parts est 190^{te} .

S'il n'eût été question que de partager en parties proportionnelles à 1, 1 & 2 ; la première part étant toujours supposée 1^{te} , la seconde seroit 1^{te} , la troisième seroit 2^{te} , & la totalité seroit 4^{te} , dont la différence avec 190^{te} , c'est-à-dire, 186^{te} , est ce qu'il faut prélever sur la somme proposée 6954^{te} , ce qui la réduit à 6768 ; il reste donc à partager 6768^{te} en parties proportionnelles à 1, 1 & 2, selon les règles ci-dessus ; & ayant trouvé que la première partie est 1692^{te} , on en conclura que les deux autres parts demandées sont 1746^{te} & 3516^{te} ; en effet la totalité de ces trois parts est 6954^{te} .

202. On trouve encore, chez les Arithméticiens, plusieurs autres règles qui ne sont autre chose que l'application des règles de Trois, à différentes questions telles que les questions d'Intérêt, de Change, d'Escompte, &c.

Nous n'entrerons pas dans ces détails qui ne peuvent avoir de difficulté pour ceux qui, ayant bien saisi les principes établis ci-dessus, auront en même temps l'état de la question présent à l'esprit. Nous nous bornerons à un seul exemple.

Une personne a fait à un Marchand, un billet de 2854^{te} , payable dans un an ; elle vient acquitter son billet au bout de 7 mois, & le Marchand consent de diminuer, pour les 5 mois restants, les intérêts qui ont été compris dans le billet, à raison de 6 pour 100 pour 12 mois ; on demande pour quelle somme le Marchand doit rendre ce billet.

Puisque 12 mois produisent 6 pour 100 d'intérêt, 7 mois ont dû produire un intérêt qu'on trouvera en cherchant le quatrième terme d'une proportion, dont les trois premiers sont

$$12 : 7 :: 6 :$$

Ce quatrième terme sera $\frac{43}{12}$ ou $3 \frac{1}{2}$. Or, quand l'intérêt a

été pris à 6 pour 100, on a compté pour 106^{te}, ce qui ne valoit que 100; donc quand l'intérêt est à 3 $\frac{1}{2}$, on compte pour 103 $\frac{1}{2}$, ce qui ne vaut que 100; il faut donc actuellement que ce qui devoit être payé 106, ne soit plus payé que 103 $\frac{1}{2}$. Ainsi la somme cherchée doit être le quatrième terme d'une proportion, dont les trois premiers sont . . .

$$106 : 103 \frac{1}{2} :: 106 : 103 \frac{1}{2} :$$

Ce quatrième terme qui est 7786^{te} 13^{te} 9d $\frac{10}{100}$ ou $\frac{15}{32}$, est la somme que le débiteur doit donner pour retirer son billet.

De la Regle d'Alliage.

203. Les questions qui appartiennent à cette regle, sont de deux sortes.

Dans l'une il s'agit de trouver la valeur moyenne de plusieurs sortes de choses, dont le nombre & la valeur particuliere de chacune, sont connus.

Dans la seconde, il s'agit de connoître les quantités de chaque espece de choses qui entrent dans un ou plusieurs mélanges, lorsqu'on connoît le prix ou la valeur de chaque espece, & le prix ou la valeur totale de chaque mélange.

Nous réservons les questions de la seconde sorte, pour servir d'application dans l'Algebre.

Quant aux questions de la premiere, voici la regle pour les résoudre.

Multipliez la valeur de chaque espece de choses, par le nombre des choses de

cette espece ; ajoutez tous les produits ,
& divisez la somme , par le nombre total
des choses de toutes les especes.

E X E M P L E.

On emploie 200 Ouvriers , dont 50 sont
payés à raison de 40 sols par jour , 70 à
raison de 30 sols , 50 à raison de 25 sols :
& 30 à raison de 20 sols ; à combien
chaque Ouvrier revient-il par jour , l'un
portant l'autre ?

50 Ouvriers à 40 ^s par jour	font une
dépense de	2000 ^s
70 à 30 ^s	2100
50 à 25	1250
30 à 20	600
	<hr/>
	5950 ^s

La dépense des 200 Ouvriers est donc
de 5950^s par jour ; & par conséquent , (en
divisant par 200) , chaque Ouvrier revient ,
l'un portant l'autre , à 29^s 9^d par jour. Les
autres questions de cette espece sont si fa-
ciles à résoudre d'après cet exemple , que
nous croyons à propos de ne pas insister
sur cette matiere.



Des Progressions Arithmétiques.

204. La progression Arithmétique est une suite de termes dont chacun surpasse celui qui le précède, ou en est surpassé, de la même quantité.

Par exemple, cette suite.
 $\div 1 . 4 . 7 . 10 . 13 . 16 . 19 . 22 . 25 , \&c.$
 est une progression Arithmétique ; parce que chaque terme y surpasse celui qui le précède, d'une même quantité qui est ici 3.

Les deux points séparés par une barre qu'on voit ici à la tête de la Progression, sont destinés à marquer qu'en énonçant cette Progression, on doit répéter chaque terme ; excepté le premier & le dernier, en cette manière, 1 est à 4, comme 4 est à 7 ; comme 7 est à 10, &c.

La Progression est dite *croissante* ou *décroissante*, selon que les termes vont en augmentant ou en diminuant ; mais comme les propriétés de l'une & de l'autre sont les mêmes, en changeant seulement les mots *plus* en *moins*, ou *ajouter* en *soustraire*, nous la considérerons ici uniquement comme *croissante*.

205. On voit donc, d'après la définition de la Progression Arithmétique, qu'avec le premier terme & la différence commune, ou la raison de la Progression, on peut former tous les autres termes, en ajoutant consécutivement cette raison; & que par conséquent :

Le second terme est composé du premier, plus la raison.

Le troisième composé du second, plus la raison, & par conséquent du premier, plus deux fois la raison.

Le quatrième est composé du troisième, plus la raison; & par conséquent, du premier, plus trois fois la raison, & ainsi de suite.

206. De sorte qu'on peut dire, en général, qu'un terme quelconque d'une Progression Arithmétique, est composé du premier, plus autant de fois la raison qu'il y a de termes avant lui.

207. Donc si le premier terme étoit zéro, tout autre terme de la Progression feroit égal à autant de fois la raison, qu'il y auroit de termes avant lui.

208. Ce principe peut avoir les deux applications suivantes.

1°. Il sert à trouver un terme quel-

conque d'une Progression, sans qu'on soit obligé de calculer ceux qui le précèdent : qu'on demande, par exemple, quel seroit le 100^e terme de cette Progression. . .

$$\div 4 : 9 : 14 : 19 : 24, \&c.$$

Puisque ce terme cherché doit être le centième, il a donc 99 termes avant lui ; il est donc composé du premier terme 4 & de 99 fois la raison 5 ; il est donc 4 plus 495, c'est-à-dire, 499.

209. 2°. Ce même principe sert à lier deux nombres quelconques, par une suite de tant d'autres nombres qu'on voudra, de maniere que le tout forme une Progression Arithmétique ; ce qu'on appelle *insérer* entre deux nombres donnés, plusieurs *moyens proportionnels arithmétiques*, ou simplement plusieurs *moyens arithmétiques*.

Par exemple, on peut lier 1 & 7, par cinq nombres qui fassent une Progression Arithmétique avec 1 & 7 ; ces nombres sont 2, 3, 4, 5, 6 ; mais comme il n'est pas toujours aisé de voir, du premier coup d'œil, quels doivent être ces nombres, voici comment on peut les trouver à l'aide du principe que nous venons de poser.

Il ne s'agit que de trouver la raison

qui doit régner dans cette Progression.

Or le plus grand des deux nombres proposés , devant être le dernier terme de la Progression , doit être composé du premier , c'est-à-dire , du plus petit de ces deux nombres ; plus autant de fois la raison qu'il y a de termes avant lui ; donc si du plus grand de ces deux nombres , on retranche le plus petit , le reste sera composé d'autant de fois la raison qu'il doit y avoir de termes avant le plus grand ; c'est-à-dire , qu'il est le produit de la multiplication de cette raison par le nombre des termes qui précèdent le plus grand ; donc (74) si l'on divise ce reste , par le nombre des termes qui doivent précéder le plus grand , on aura cette raison.

Or le nombre des termes qui doivent précéder le plus grand , est plus grand d'une unité que les nombres des moyens qu'on veut insérer entre les deux ; donc , *pour insérer , entre deux nombres donnés , tant de moyens arithmétiques qu'on voudra , il faut retrancher le plus petit de ces deux nombres , du plus grand ; & diviser le reste , par le nombre des moyens augmenté d'une unité.* Le quotient sera la différence ou la raison qui doit régner dans la Progression.

Par exemple, si entre 4 & 11, on demande d'insérer 8 moyens arithmétiques ; je retranche 4 de 11, il me reste 7 que je divise par 9, nombre des moyens augmenté de l'unité, le quotient $\frac{7}{9}$ est la différence qui doit régner dans la Progression qui sera par conséquent.....

$$\div 4 \cdot 4\frac{7}{9} \cdot 5\frac{1}{9} \cdot 6\frac{2}{9} \cdot 7\frac{3}{9} \cdot 7\frac{4}{9} \cdot 8\frac{5}{9} \cdot 9\frac{6}{9} \cdot 10\frac{7}{9} \cdot 11.$$

Pareillement, si l'on demandoit neuf moyens arithmétiques entre 0 & 1, retranchant 0 de 1, il reste 1 qu'il faudroit diviser par 10, nombre des moyens augmenté de l'unité ; ce qui donne $\frac{1}{10}$ ou 0, 1 pour la raison. Et par conséquent la Progression sera $\div 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.1.$

210. On voit par-là, qu'entre deux nombres, si voisins qu'ils puissent être l'un de l'autre, on peut toujours insérer tant de moyens arithmétiques qu'on voudra.

Nous n'en dirons pas davantage sur les Progressions Arithmétiques que nous ne traitons ici que par rapport aux Logarithmes dont nous parlerons plus bas ; nous aurons occasion d'y revenir ailleurs.

Des

Des Progressions Géométriques.

211. La Progression Géométrique est une suite de termes dont chacun contient celui qui le précède, ou est contenu en lui, le même nombre de fois. Par exemple cette suite.....

$$3 : 6 : 12 : 24 : 48 : 96 : 192$$

est une Progression Géométrique ; parce que chaque terme contient celui qui le précède, le même nombre de fois qui est ici 2.

Ce nombre de fois est ce qu'on appelle la raison de la Progression.

Les quatre points qui précèdent la Progression, ont la même signification que les deux points qui précèdent la Progression Arithmétique (204). Mais on en met quatre pour avertir que la Progression est Géométrique.

La Progression est dite *croissante* ou *décroissante*, selon que les termes vont en augmentant ou en diminuant.

Nous considérerons toujours la Progression Géométrique, comme *croissante*, parce que les propriétés sont les mêmes dans l'une & dans l'autre, en changeant le mot

Arithmétique.

O

de multiplier en celui de diviser, & celui de contenir, en ceux de être contenu.

Puisque le second terme contient le premier, autant de fois qu'il y a d'unités dans la raison, il est donc composé du premier multiplié par la raison.

Puisque le troisieme terme contient le second, autant de fois qu'il y a d'unités dans la raison, il est donc composé du second multiplié par la raison, & par conséquent du premier multiplié par la raison, & encore multiplié par la raison; c'est-à-dire, du premier multiplié par le quarré, ou la seconde puissance de la raison.

Puisque le quatrieme terme contient le troisieme, autant de fois qu'il y a d'unités dans la raison, il est donc composé du troisieme multiplié par la raison, & par conséquent du premier multiplié par le quarré de la raison, & encore multiplié par la raison; c'est-à-dire, multiplié par le cube, ou la troisieme puissance de la raison.

Par exemple, dans la *Progression ci-dessus*; 6 est composé du premier terme 3 multiplié par la raison 2; 12 est composé du premier terme 3 multiplié par le quarré 4

de la raison 2; 24 est composé du premier terme 3 multiplié par le cube 8 de la raison 2.

212. En continuant le même raisonnement, on voit qu'un terme quelconque de la Progression Géométrique, est composé du premier multiplié par la raison élevée à une puissance marquée par le nombre des termes qui précèdent ce terme quelconque.

Donc, si le premier terme de la Progression est l'unité, chaque autre terme sera formé de la raison même élevée à une puissance marquée par le nombre des termes qui le précèdent; car la multiplication par le premier terme qui est l'unité, n'augmente point le produit.

Pour élever un nombre à une puissance proposée; à la septieme, par exemple, il faut, suivant l'idée que nous avons donnée des puissances, multiplier ce nombre par lui-même, six fois consécutives; ainsi pour élever 2 à la septieme puissance, je dirois 2 fois 2 font 4, 2 fois 4 font 8, 2 fois 8 font 16, 2 fois 16 font 32, 2 fois 32 font 64, 2 fois 64 font 128, qui seroit la septieme puissance de 2; mais on peut abrégér l'opération en diverses manieres; par exemple, je puis d'abord quarrer 2,

ce qui fait 4, cuber ce 4, ce qui donne 64, & le multiplier par 2, ce qui fait 128; ou bien je puis cuber 2, ce qui donne 8, quarrer 8, ce qui donne 64, & multiplier 64 par 2, ce qui donne 128; en un mot, peu importe de quelle façon on s'y prenne, pourvu que 2 se trouve 7 fois facteur dans le produit.

213. Le principe que nous venons de poser (212) sur la formation d'un terme quelconque de la Progression, & la remarque que nous venons de faire, peuvent servir à calculer tel terme qu'on voudra de la Progression, sans être obligé de calculer ceux qui le précèdent: si l'on demande, par exemple, quel seroit le douzieme terme de la Progression.

$$\frac{2}{1} \quad 3 : 6 : 12 : 24, \text{ \&c.}$$

Comme je fais (212) que ce douzieme terme doit être composé du premier, multiplié par la raison élevée à une puissance marquée par le nombre des termes qui précèdent ce douzieme, je vois que, pour le former, il faut multiplier 3 par la onzieme puissance de la raison 2; pour former cette onzieme puissance, je cube 2, ce qui me donne 8, je cube 8, ce qui me donne 512 pour la neuvieme puissance,

& enfin je multiplie 512, neuvieme puissance de la raison, par 4, seconde puissance, & j'ai 2048 pour la onzieme puissance de 2; je multiplie donc 2048 par 3, & j'ai 6144 pour le douzieme terme de la Progression.

214. Une autre application qu'on peut faire du même principe; c'est pour trouver tant de moyens proportionnels géométriques qu'on voudra, entre deux nombres donnés. Si l'on demandoit trois moyens géométriques entre 4 & 64; avec un peu d'attention, on voit que ces trois moyens géométriques sont 8, 16, 32; en effet $\frac{4}{1} : 8 : 16 : 32 : 64$ forment une Progression Géométrique; mais si l'on proposoit d'autres nombres que 4 & 64, ou que l'on demandât tout autre nombre de moyens géométriques, on ne les trouveroit pas aussi facilement.

Or voici comment on peut les trouver en vertu du principe dont il s'agit.

La question se réduit à trouver la raison qui doit régner dans la Progression; parce que, quand elle sera trouvée, on formera aisément les termes, par des multiplications successives par cette raison.

Qu'il soit question, par exemple, de trouver neuf moyens géométriques entre 2 & 2048.

2048 sera donc le dernier terme d'une Progression Géométrique qui commence par 2, & qui doit avoir neuf termes entre le premier & le dernier. 2048 est donc composé du premier terme 2 multiplié par la raison élevée à une puissance marquée par le nombre des termes qui doivent précéder 2048 ; donc (69), si l'on divise 2048 par le premier terme, le quotient sera la raison élevée à une puissance marquée par le nombre des termes qui doivent précéder 2048 ; donc en cherchant quelle est la racine de cette puissance, on aura la raison : or cette puissance doit être la dixième, puisque devant y avoir neuf termes entre 2 & 2048, il y en a nécessairement dix avant 2048 : donc il faut extraire la racine dixième du quotient qu'aura donné le plus grand nombre 2048 divisé par le plus petit 2.

215. Comme on peut faire le même raisonnement dans tous les cas, concluons donc en général que, *pour insérer entre deux nombres donnés, tant de moyens géométriques qu'on voudra ; il faut diviser le plus grand de ces deux nombres par le plus petit, ce qui donnera un quotient ; on extraira, de ce quotient, une racine du degré marqué par*

Le nombre des moyens augmenté de l'unité.

Ainsi, pour revenir à notre exemple ; je divise 2048 par 2 ; ce qui me donne 1024, dont je cherche la racine dixième*, elle est 2 ; donc la raison est 2 : ainsi pour former les moyens en question, je multiplie le premier terme 2 continuellement par la raison 2 ; & après avoir formé neuf moyens, je retombe sur 2048, comme on le voit ici.....

÷ 2 : 4 : 8 : 16 : 32 : 64 : 128 : 256 : 512 :
1024 : 2048.

Pareillement, si l'on demandoit de trouver quatre moyens géométriques entre 6 & 48, je diviserois 48 par 6, & du quotient 8 je tirerois la racine cinquième ; comme 8 n'a pas de racine cinquième exacte, on ne peut jamais assigner exactement en nombres, quatre moyens géomé-

* Nous n'avons pas donné de méthode pour extraire la racine dixième d'un nombre ; mais il en est de celle-ci comme de la racine quarrée & de la racine cubique : la racine quarrée ne doit avoir qu'un chiffre, lorsque le nombre proposé n'en a pas plus de deux ; la racine cubique ne doit avoir qu'un chiffre, lorsque le nombre proposé n'en a pas plus de trois ; pareillement la racine dixième n'aura jamais qu'un chiffre, tant que le nombre proposé n'en aura pas plus de dix ; il en est de même pour les autres racines ; la trentième, par exemple, n'aura qu'un chiffre, si le nombre proposé n'a pas plus de trente chiffres ; cela se démontre comme on l'a fait pour la racine quarrée & la racine cubique.

triques entre 6 & 48 ; mais on peut approcher de cette racine , si près qu'on le voudra , par une méthode analogue à celles de la racine quarrée & de la racine cubique , & que nous ferons connoître dans l'Algebre. En attendant , il suffit qu'on conçoive qu'il est possible de trouver un nombre qui , multiplié quatre fois de suite par lui-même , approche de plus en plus de reproduire 8 ; & qu'il en est de même pour tout autre nombre & pour toute autre racine ; & de-là nous conclurons qu'entre deux nombres quelconques , on peut toujours trouver tant de moyens géométriques qu'on voudra , soit exactement , soit par une approximation poussée à tel degré qu'on voudra , & c'est tout ce qu'il nous faut pour passer aux Logarithmes.

Des Logarithmes.

216. Les *Logarithmes* sont des nombres en Progression Arithmétique , qui répondent , terme pour terme , à une pareille suite de nombres en Progression Géométrique. Si l'on a , par exemple , la Progression Géométrique & la Progression Arithmétique suivantes.....

2 : 4 : 8 : 16 : 32 : 64 : 128 : 256 , &c.

3 . 5 . 7 . 9 . 11 . 13 . 15 . 17 . &c.

Chaque terme de la suite inférieure , est dit le logarithme du terme qui est à pareille place dans la suite supérieure.

217. Un même nombre peut donc avoir une infinité de logarithmes différens , puisqu'à la même Progression Géométrique on peut faire correspondre une infinité de Progressions Arithmétiques différentes. Comme nous ne considérons ici les logarithmes , que par rapport à l'usage qu'on peut en faire dans les calculs numériques , nous ne nous arrêterons pas à considérer les différentes progressions Géométriques & Arithmétiques qu'on pourroit comparer entr'elles ; nous passons tout de suite à celles qu'on a considérées dans la formation des tables de logarithmes.

218. On a choisi pour Progression Géométrique , la Progression décuple ; & pour Progression Arithmétique , la suite naturelle des nombres , c'est-à-dire , qu'on a choisi les deux Progressions suivantes.

1 : 10 : 100 : 1000 : 10000 : 100000 : 1000000

0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6

219. Ainsi il sera toujours aisé de

reconnoître quel est le logarithme de l'unité suivie de tant de zéros qu'on voudra, il a toujours autant d'unités qu'il y a de zéros à la suite de cette unité.

Nous n'enseignerons pas ici la méthode qu'on a suivie pour trouver les logarithmes des termes intermédiaires de la Progression décuple ; elle dépend de principes que nous ne pouvons exposer ici ; mais nous allons expliquer leur formation par une voie, qui, à la vérité, ne seroit pas la plus expéditive pour calculer ces logarithmes, mais qui suffit, tant pour concevoir cette formation, que pour rendre raison des usages auxquels on emploie ces nombres artificiels.

220. D'après la définition que nous avons donnée des logarithmes, on voit que pour avoir le logarithme d'un nombre quelconque, de 3, par exemple, il faut que ce nombre puisse faire partie de la Progression Géométrique fondamentale. Or, quoiqu'on ne voie pas que 3 puisse faire partie de la Progression Géométrique $\vdots 1 : 10 : 100$, &c. cependant on voit que si entre 1 & 10, on inséroit un très-grand nombre de moyens géométriques (214) comme on monteroit alors de 1

à 10 par des degrés d'autant plus ferrés que le nombre de ces moyens seroit plus grand, il arriveroit de deux choses l'une, ou que quelqu'un de ces moyens se trouveroit être précisément le nombre 3 ; ou que du moins, il s'en trouveroit deux consécutifs, entre lesquels le nombre 3 seroit compris, & dont chacun différeroit d'autant moins de 3, que le nombre des moyens inférés seroit plus grand.

Cela posé, si l'on inféroit pareillement entre 0 & 1 autant de moyens arithmétiques qu'on a inféré de moyens géométriques entre 1 & 10, chaque terme de la Progression Géométrique ayant pour logarithme, le terme correspondant de la Progression Arithmétique, on prendroit dans celle-ci, pour logarithme de 3, le nombre qui s'y trouveroit à pareille place que 3 se trouve dans la Progression Géométrique ; ou si 3 n'étoit pas exactement quelqu'un des termes de celle-ci, on prendroit dans la Progression Arithmétique, le terme qui répondroit à celui de la Progression Géométrique, qui approche le plus du nombre 3.

C'est ainsi qu'on pourroit s'y prendre en effet, si l'on n'avoit pas de moyens

plus expéditifs ; quoi qu'il en soit , c'est à cela que revient le calcul des logarithmes.

221. Il faut donc se représenter qu'ayant inséré 10000000 moyens géométriques entre 1 & 10 , pareil nombre entre 10 & 100 , pareil nombre entre 100 & 1000 , &c. on a inséré aussi pareil nombre de moyens arithmétiques entre 0 & 1 , pareil nombre entre 1 & 2 , pareil nombre entre 2 & 3 ; qu'ayant rangé tous les premiers sur une même ligne , & tous les seconds au - dessous , on a cherché dans la première , le nombre le plus approchant de 2 ; & on a pris dans la suite inférieure , le nombre correspondant ; qu'on a cherché de même dans la première , le nombre le plus approchant de 3 , & qu'on a pris dans la suite inférieure , le nombre correspondant ; qu'on en a fait de même , successivement , pour les nombres 4 , 5 , 6 , &c. qu'enfin ayant transporté dans une même colonne , comme on le voit dans la Table ci - jointe , les nombres 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , &c. on a écrit dans une colonne à côté , les termes de la Progression Arithmétique , qu'on a trouvés correspondans à ceux - là , ou du moins à ceux qui en approchoient le plus ; alors

on aura l'idée de la formation des logarithmes, & de leur disposition dans les Tables ordinaires.

Table des Logarithmes des Nombres naturels depuis 1 jusqu'à 200.

Nom- bres.	Logarith.	Nom- bres.	Logarith.	Nom- bres.	Logarith.	Nom- bres.	Logarith.
0	Infini nég.	30	1,477121	60	1,778151	90	1,954243
1	0,000000	31	1,491362	61	1,785330	91	1,959041
2	0,301030	32	1,505150	62	1,792392	92	1,963788
3	0,477121	33	1,518514	63	1,799341	93	1,968483
4	0,602060	34	1,531479	64	1,806180	94	1,973128
5	0,698970	35	1,544068	65	1,812913	95	1,977724
6	0,778151	36	1,556303	66	1,819544	96	1,982271
7	0,845098	37	1,568202	67	1,826075	97	1,986772
8	0,903090	38	1,579784	68	1,832509	98	1,991226
9	0,954243	39	1,591065	69	1,838849	99	1,995635
10	1,000000	40	1,602060	70	1,845098	100	2,000000
11	1,041393	41	1,612784	71	1,851258	101	2,004321
12	1,079181	42	1,623249	72	1,857332	102	2,008600
13	1,113943	43	1,633468	73	1,863323	103	2,012837
14	1,146128	44	1,643453	74	1,869232	104	2,017033
15	1,176091	45	1,653213	75	1,875061	105	2,021189
16	1,204120	46	1,662758	76	1,880814	106	2,025306
17	1,230449	47	1,672098	77	1,886491	107	2,029384
18	1,255273	48	1,681241	78	1,892095	108	2,033424
19	1,278754	49	1,690196	79	1,897627	109	2,037426
20	1,301030	50	1,698970	80	1,903090	110	2,041393
21	1,322219	51	1,707570	81	1,908485	111	2,045323
22	1,342423	52	1,716003	82	1,913814	112	2,049218
23	1,361728	53	1,724276	83	1,919078	113	2,053078
24	1,380211	54	1,732394	84	1,924279	114	2,056905
25	1,397940	55	1,740363	85	1,929419	115	2,060698
26	1,414973	56	1,748188	86	1,934498	116	2,064458
27	1,431364	57	1,755875	87	1,939519	117	2,068186
28	1,447158	58	1,763428	88	1,944483	118	2,071882
29	1,462398	59	1,770852	89	1,949390	119	2,075547
30	1,477121	60	1,778151	90	1,954243	120	2,079181

Nom- bres.	Logarith.	Nom- bres.	Logarith.	Nom- bres.	Logarith.	Nom- bres.	Logarith.
120	2,079181	140	2,146128	160	2,204120	180	2,255273
121	2,082785	141	2,149219	161	2,206826	181	2,257679
122	2,086360	142	2,152288	162	2,209515	182	2,260071
123	2,089905	143	2,155336	163	2,212188	183	2,262451
124	2,093422	144	2,158362	164	2,214844	184	2,264818
125	2,096910	145	2,161368	165	2,217484	185	2,267172
126	2,100371	146	2,164353	166	2,220108	186	2,269513
127	2,103804	147	2,167317	167	2,222716	187	2,271842
128	2,107210	148	2,170262	168	2,225309	188	2,274158
129	2,110590	149	2,173186	169	2,227887	189	2,276462
130	2,113943	150	2,176091	170	2,230449	190	2,278754
131	2,117271	151	2,178977	171	2,232996	191	2,281033
132	2,120574	152	2,181844	172	2,235528	192	2,283301
133	2,123852	153	2,184691	173	2,238046	193	2,285559
134	2,127105	154	2,187521	174	2,240549	194	2,287802
135	2,130334	155	2,190332	175	2,243038	195	2,290035
136	2,133539	156	2,193125	176	2,245513	196	2,292258
137	2,136721	157	2,195900	177	2,247973	197	2,294466
138	2,139879	158	2,198657	178	2,250420	198	2,296666
139	2,143015	159	2,201397	179	2,252853	199	2,298853
140	2,146128	160	2,204120	180	2,255273	200	2,301030

Les Logarithmes renfermés dans cette Table, n'ont que six chiffres après la virgule ; ils en ont sept dans les Tables ordinaires ; mais cette différence ne nuit en rien à l'usage que nous en ferons ci-après.

222. Remarquons au sujet de cette Table, que le premier chiffre de la gauche de chaque logarithme, s'appelle la *Caractéristique* ; parce que c'est par ce chiffre qu'on peut juger dans quelle décade est compris le nombre auquel appartient ce logarithme ; par exemple, si un nombre a pour caractéristique 3, je sais qu'il appartient à des mille, parce que le loga-

arithme de 1000 est 3, & que celui de 10000 étant 4, tout nombre depuis 1000 jusqu'à 10000 ne peut avoir pour logarithme que 3 & une fraction; il a donc 3 pour caractéristique, & les autres chiffres expriment cette fraction réduite en décimales.

Propriétés des Logarithmes.

223. Comme il ne s'agit ici que des logarithmes tels qu'ils sont dans les Tables ordinaires, les propriétés que nous allons exposer, ne regardent que les Progressions Géométriques qui ont l'unité pour premier terme; & les Progressions Arithmétiques qui ont zéro pour premier terme.

Comparons donc encore, terme à terme, une Progression Géométrique quelconque, mais dont le premier terme soit l'unité, avec une Progression Arithmétique aussi quelconque, mais dont le premier terme soit zéro; par exemple, les deux Progressions suivantes

÷ 1 : 3 : 9 : 27 : 81 : 243 : 729 : 2187 : 6561, &c.

— 0. 4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 32, &c.

Il suit de la nature & de la correspon-

dance parfaite de ces deux Progreſſions ; qu'autant de fois la raiſon de la premiere eſt facteur dans l'un quelconque des termes de cette Progreſſion , autant de fois la raiſon de la ſeconde eſt contenue dans le terme correfpondant de cette ſeconde ; par exemple , dans le terme 2187 , la raiſon 3 eſt ſept fois facteur , & dans le terme 28 , la raiſon 4 eſt contenue ſept fois.

En effet , ſelon ce qui a été dit (206 & 212) , la raiſon eſt facteur dans un terme quelconque de la premiere , autant de fois qu'il y a de termes avant celui-là ; & dans la ſeconde , un terme quelconque eſt compoſé d'autant de fois la raiſon qu'il y a de termes avant lui. Or il y a le même nombre de termes de part & d'autre.

Concluons de-là , qu'un terme quelconque de la Progreſſion Géométrique , aura toujours pour correfpondant dans la Progreſſion Arithmétique , un terme qui contiendra la raiſon de celle-ci , autant de fois que la raiſon de la premiere eſt facteur dans le terme quelconque dont il ſ'agit.

224. Donc, ſi l'on multiplie, l'un par l'autre, deux termes de la Progreſſion Géométrique, & ſi l'on ajoute en même tems les deux termes

termes correspondans de la progression arithmétique, le produit & la somme seront deux termes qui se correspondront dans ces progressions.

Car il est évident que la raison sera facteur dans le produit, autant qu'elle l'est, tant dans l'un des termes multipliés, que dans l'autre; & que la raison de la progression arithmétique sera contenue dans la somme, autant qu'elle l'est, tant dans l'un des termes ajoutés, que dans l'autre.

225. Donc on peut, par l'addition seule de deux termes de la progression arithmétique, connoître le produit des deux termes correspondans de la progression géométrique, en supposant ces deux progressions prolongées suffisamment.

Par exemple, en ajoutant les deux termes 8 & 24 qui répondent à 9 & 729, j'ai 32 qui répond à 6561; d'où je conclus que le produit de 729 par 9, est 6561, ce qui est en effet.

226. Donc, puisque les nombres naturels qui composent la première colonne de la Table ci-dessus, ont été tirés d'une progression géométrique, qui commence par l'unité; & puisque leurs logarithmes

Arithmétique. P

sont les termes correspondants d'une progression arithmétique qui commence par zéro ; il faut en conclure , qu'en ajoutant les logarithmes de deux nombres , on a le logarithme de leur produit.

De-là il est aisé de conclure les usages suivans.

Usages de Logarithmes.

227. Pour faire une multiplication par logarithmes ; il faut ajouter le logarithme du multiplicande , au logarithme du multiplicateur ; la somme sera le logarithme du produit ; c'est pourquoi cherchant cette somme parmi les logarithmes des Tables , on trouvera le produit à côté , par exemple , si l'on propose de multiplier 14 par 13.

Je trouve dans la petite table ci-dessus que le logarithme de 14 est 1,146128
& que celui de 13 est 1,113943

La somme 2,260071

Répond dans la même table au nombre 182 qui est effet le produit.

228. Pour quarrer un nombre , il suffit donc de doubler son logarithme ; puisqu'il faudroit ajouter ce logarithme à lui-même , pour multiplier le nombre par lui-même.

229. Par une raison semblable , pour cuber un nombre , il faudra tripler son logarithme ; & en général , pour élever un nombre à une puissance quelconque , il faudra prendre son logarithme autant de fois qu'il y a d'unités dans le nombre qui marque cette puissance ; c'est-à-dire , multiplier son logarithme , par le nombre qui marque cette puissance ; par exemple , pour élever un nombre à la septieme puissance , il faudra multiplier par 7 , le logarithme de ce nombre.

230. Donc réciproquement , pour extraire la racine quarrée , cubique , quatrieme , &c. d'un nombre proposé , il faudra diviser le logarithme de ce nombre , par 2 , 3 , 4 , &c. , c'est-à-dire , en général , par le nombre qui marque le degré de la racine qu'on veut extraire.

Par exemple , si l'on demande la racine quarrée de 144 , ayant trouvé , dans la table , que le logarithme de ce nombre est 2,158362 , j'en prends la moitié 1,079181 ; je cherche parmi les logarithmes , à quel endroit se trouve 1,079181 ; il répond à 12 , qui est par conséquent la racine quarrée de 144.

Si l'on demande la racine septieme de

128, je cherche, dans la table, son logarithme que je trouve être 2,107210; j'en prends le septieme, ou je le divise par 7, & je cherche à quoi répond dans la table, le quotient 0.301030, il répond à 2 qui est en effet la racine septieme de 128.

231. *Pour trouver le quotient de la division d'un nombre, par un autre; il faut retrancher le logarithme du diviseur, du logarithme du dividende; chercher dans la table à quel nombre répond le logarithme restant, ce nombre sera le quotient.*

Par exemple si l'on veut diviser 187 par 17, je cherche dans la table, les logarithmes de ces deux nombres, & je trouve

le logarithme de 187 2,271842

celui de 17 1,230449

La différence 1,041393

Répond, dans la Table, à 11 qui est en effet le quotient.

Si la division ne pouvoit pas être faite exactement, le logarithme restant ne se trouveroit qu'en partie dans la table; mais nous allons enseigner, ci-après, ce qu'il faut faire dans ce cas.

La raison de cette regle est fondée sur

ce que le quotient multiplié par le diviseur, devant reproduire le dividende (74); le logarithme du quotient, ajouté, (227) au logarithme du diviseur, doit donc composer le logarithme du dividende; & par conséquent le logarithme du quotient vaut le logarithme du dividende, moins celui du diviseur.

232. D'après ce que nous venons de dire, il est très-facile de voir que pour faire une règle de Trois par logarithmes, il faut ajouter le logarithme du second terme, au logarithme du troisième; & de la somme, retrancher le logarithme du premier.

233. Remarquons que lorsqu'on cherche dans les tables ordinaires, un logarithme résultant de quelques opérations sur d'autres logarithmes, si l'on ne trouve de différence entre le dernier chiffre de ce logarithme, & celui de la table, que sur le dernier chiffre seulement, on doit regarder cette différence comme nulle; parce que les logarithmes de tous les nombres intermédiaires à la progression décuple, ne sont qu'approchés à environ une demi-unité décimale du septième ordre près.

Des Nombres dont les Logarithmes ne se trouvent point dans les Tables.

234. Les fractions & les nombres entiers joints à des fractions n'ont pas leurs logarithmes dans les tables ; il en est de même des racines quarrées, cubiques, &c. des nombres qui ne sont pas des puissances parfaites du degré de ces racines.

Si l'on demande le logarithme d'un nombre entier joint à une fraction, il faut d'abord réduire le tout en fraction, (86), & ensuite retrancher le logarithme du dénominateur, du logarithme du nouveau numérateur. Par exemple, pour avoir le logarithme de $8\frac{3}{11}$, je cherche celui de $\frac{21}{11}$, que je trouve en retranchant 1,041393 logarithme de 11, de 1,959041 logarithme de 91, le reste 0,917648 est le logarithme de $8\frac{3}{11}$, puisque $8\frac{3}{11}$ ou $\frac{21}{11}$, n'est autre chose que 91 divisé par 11 (96).

235. La même raison prouve que, pour avoir le logarithme d'une fraction, il faut retrancher pareillement le logarithme du dénominateur, du logarithme du numérateur ; mais comme cette souf-

traction ne peut se faire, puisque le logarithme du dénominateur sera plus grand que celui du numérateur; on retranchera au contraire le logarithme du numérateur de celui du dénominateur; le reste, qui marquera ce dont il s'en faut que la soustraction n'ait pu se faire, sera le logarithme de la fraction, en appliquant à ce reste un signe qui marque que la soustraction n'a pas été entièrement faite. Ce signe est celui-ci —, qu'on énonce *moins*. Ainsi le logarithme de la fraction $\frac{1}{9}$ seroit — 0,917648*.

236. Ce signe est destiné à rappeler dans le calcul, que les logarithmes des fractions doivent être employés, selon une règle toute opposée à celle que nous avons prescrite pour les logarithmes des nombres entiers, ou des nombres entiers joints à des fractions; c'est-à-dire, que, si l'on a à multiplier par une fraction, il faut retrancher le logarithme de cette fraction; si au contraire l'on a à diviser par

<p>* Les nombres précédés du signe — se nomment nombres <i>negatifs</i>. Nous les ferons connoître plus particulièrement dans l'Algèbre: en attendant, nous prévenons que</p>	<p>c'est en prendre une idée fautive, que de les regarder comme des nombres au-dessous de zéro. Il n'y a rien au-dessous de zéro.</p>
---	---

une fraction , il faut ajouter son logarithme.

La raison en est , pour la multiplication ; que multiplier par une fraction revient à multiplier par le numérateur , & à diviser ensuite par le dénominateur ; donc , lorsqu'on opère par logarithmes , on doit ajouter le logarithme du numérateur , & retrancher ensuite celui du dénominateur , ou , ce qui revient au même , on doit seulement retrancher l'excès du logarithme du dénominateur sur le logarithme du numérateur : or cet excès est précisément le logarithme de la fraction. A l'égard de la division , la raison en est aussi facile à saisir : en effet , diviser par $\frac{3}{4}$, par exemple , revient (109) à multiplier par $\frac{4}{3}$; donc , en opérant par logarithmes , il faut ajouter le logarithme de $\frac{4}{3}$, c'est-à-dire , (234) la différence du logarithme de 4 , au logarithme de 3 , ou du logarithme du dénominateur de la fraction proposée , au logarithme de son numérateur.

237. Il peut arriver , & il arrive assez souvent , qu'en convertissant en une seule fraction , l'entier & la fraction dont on cherche le logarithme , il peut arriver , dis-je , que le numérateur soit un nombre

qui passe les limites des tables ; par exemple , si l'on demande le logarithme de $53\frac{821}{704}$, ce nombre réduit en fraction , revient à $\frac{303133}{5704}$, dont le numérateur passe les limites des tables les plus étendues.

Il est donc à propos de savoir comment on peut trouver le logarithme d'un nombre qui passe ces limites.

La méthode que nous allons donner , n'est pas rigoureuse ; mais elle est plus que suffisante pour les usages ordinaires. Avant que de l'exposer , observons :

238. 1°. Qu'en ajoutant 1, 2, 3, &c. unités , à la caractéristique du logarithme d'un nombre , on multiplie ce nombre par 10, 100, 1000, &c. puisque c'est ajouter le logarithme de 10, ou de 100, ou de 1000, &c. (219 & 227).

2°. Au contraire , si l'on retranche 1, 2, 3, &c. unités , de la caractéristique d'un logarithme , c'est diviser le nombre correspondant par 10, 100, 1000, &c.

239. Cela posé , qu'il soit question de trouver le logarithme de 357859 , par exemple.

Je séparerai par une virgule , sur la droite de ce nombre , autant de chiffres qu'il est nécessaire pour que le reste puisse

se trouver dans les tables *. Ici , par exemple , j'en séparerai deux , ce qui me donnera 3578,59 , qui (28) est 100 fois plus petit que le nombre proposé 357859.

Je cherche dans les tables , le logarithme de 3578 , que je trouve être 3,5536403 ; je prends en même tems à côté de ce logarithme **, la différence 1214 , entre ce même logarithme & celui de 3579 , après quoi , je fais cette regle de Trois : si pour une unité de différence entre les deux nombres 3579 & 3578 ,

On a 1214 de différence entre leurs logarithmes ;

Combien pour 0,59 différence entre les deux nombres 3578, 59 & 3578 ,

Aura-t-on de différence entre leurs logarithmes , c'est-à-dire , que je cherche le quatrieme terme d'une proportion , dont les trois premiers sont

$$1 : 1214 :: 0,59 :$$

Ce quatrieme terme est 716,26 , ou simplement 716 , en négligeant les déci-

* Nous supposons ici que l'on ait entre les mains des Tables ordinaires des logarithmes. On en trouvera dans le *Traité de Navigation* , qui fait le sixieme volume de ce Cours. Celles de M. Rivard & celles de feu M. l'Abbé de la Caille sont exactes & commodes.

* Ces différences se trouvent dans les Tables , à côté des logarithmes mêmes.

males; j'ajoute donc 716 au logarithme 3,553643 de 3578, & j'ai 3,5537119 pour logarithme de 3578,59; il ne s'agit plus, pour avoir celui de 357859, que d'ajouter deux unités à la caractéristique du logarithme qu'on vient de trouver; & on aura 5,5537119, pour le logarithme cherché, puisque 357859 est 100 fois plus grand que 3578,59.

Si les chiffres qu'on doit séparer sur la droite, étoient tous des zéros; après avoir trouvé, dans les tables, le logarithme de la partie qui reste à gauche, il n'y auroit autre chose à faire qu'à ajouter autant d'unités à la caractéristique, qu'on auroit séparé de zéros.

240. S'il s'agit du logarithme d'un nombre accompagné de décimales, on cherchera ce logarithme, comme si le nombre proposé n'avoit point de virgule; & après l'avoir trouvé, soit immédiatement dans les tables, soit par la méthode qu'on vient de donner (239), on ôtera autant d'unités à la caractéristique, qu'il y a de décimales dans le nombre proposé, parce qu'ayant considéré le nombre, comme s'il n'avoit point de virgule; c'est-à-dire, comme 10, ou 100, ou 1000, &c.

fois plus grand qu'il n'est, on doit le rappeler à sa valeur par une diminution convenable sur la caractéristique de son logarithme (238).

241. Enfin, s'il n'y a que des décimales dans le nombre proposé; on cherchera encore ce nombre dans les tables, comme s'il n'avoit pas de virgule; & ayant pris le logarithme correspondant, on le retranchera d'autant d'unités qu'il y a de décimales dans ce même nombre; & on fera précéder le reste du signe —; par exemple, pour avoir le logarithme de 0,03, je cherche celui de 3, qui est 0,477121; je le retranche de deux unités, & appliquant au reste le signe —, j'ai — 1,522879 pour logarithme de 0,03. En effet, 0,03 n'est autre chose que $\frac{3}{100}$; or, pour avoir le logarithme de $\frac{3}{100}$, il faut (235) retrancher le logarithme de 3, de celui de 100, & appliquer au reste le signe —.

Des Logarithmes dont les Nombres ne se trouvent point dans les Tables.

242. Cette recherche n'est pas moins nécessaire que la précédente. Par exem-

ble ; pour la division , il arrive rarement que le quotient soit un nombre entier ; or si l'on fait l'opération par logarithmes , on ne trouvera dans les tables , le logarithme restant , que quand le quotient sera un nombre entier : il y a une infinité d'autres cas de la même espèce.

243. Proposons-nous d'abord de trouver à quel nombre répond un logarithme proposé , soit qu'il excède les limites des tables , soit qu'il tombe entre les logarithmes des tables.

On retranchera de la caractéristique , autant d'unités qu'il sera nécessaire , pour qu'on puisse trouver , dans les tables , les premiers chiffres du logarithme proposé , ainsi préparé. Si tous les chiffres se trouvent alors dans les tables , le nombre cherché , sera le nombre même qu'on trouve à côté dans les tables , mais en mettant à sa suite autant de zéros qu'on aura ôté d'unités à la caractéristique (238).

Par exemple , le logarithme $7,2273467$ se trouve , (après avoir ôté trois unités à la caractéristique) , répondre au nombre 16879 ; j'en conclus que le logarithme proposé $7,2273467$, répond à 16879000.

Si l'on ne trouve , dans les tables , que les

COURS

premiers chiffres du logarithme , on se conduira comme dans l'exemple qui suit.

Pour trouver à quel nombre appartient le logarithme 5,2432768 , j'ôte deux unités à sa caractéristique ; le logarithme 3,2432768 que j'ai alors , tombe entre les logarithmes de 1750 & 1751 ; le nombre auquel il répond est donc 1750 & une fraction.

Afin d'avoir cette fraction , je retranche de mon logarithme 3,2432768 , le logarithme de 1750 ; & j'ai pour différence 2288.

Je prends aussi dans les tables , la différence 2481 entre les logarithmes de 1751 & 1750 , après quoi je fais cette règle de Trois.

Si 2481 de différence entre les logarithmes de 1751 & 1750,

Répondent à une unité de différence entre ces nombres,

A quelle différence de nombres doit répondre la différence 2288 entre mon logarithme & celui de 1750 ?

Je trouve pour quatrième terme $\frac{2288}{2481}$; ainsi le logarithme 3,2432768 appartient au nombre 1750 $\frac{2288}{2481}$, à très-peu de chose près ; par conséquent le logarithme propo-

fé qui appartient à un nombre 100 fois plus grand (238), a pour nombre correspondant $175000 \frac{228800}{2481}$, c'est-à-dire $175092 \frac{148}{2481}$, ou en réduisant en décimales, il a pour nombre correspondant 175092,22.

244. Si le logarithme proposé tomboit entre ceux des tables, il n'y auroit aucune unité à retrancher à la caractéristique, & par conséquent point de zéros à ajouter à la fin de l'opération, qu'on feroit d'ailleurs de la même manière.

245. Mais comme la proportion que nous employons dans cette méthode, n'est pas rigoureusement exacte *, & qu'elle n'approche de la vérité, qu'autant que les nombres cherchés sont grands; si le logarithme proposé tomboit au-dessous de celui de 1500; il faudroit, pour plus d'exactitude, ajouter à sa caractéristique autant d'unités qu'on pourroit le faire sans passer les bornes des tables; & ayant trouvé le nombre qui approche le plus d'y répondre dans les tables, on en sépareroit sur la droite, autant de chiffres par une virgule,

* Cette proportion suppose que les différences des logarithmes sont proportionnelles aux différences des nombres, ce qui n'est jamais exactement vrai, mais approche assez, quand les nombres sont un peu grands, & cela suffit pour les usages ordinaires.

qu'on auroit ajouté d'unités à la caractéristique, ce qui suffira le plus souvent; mais si l'on veut avoir plus de décimales, on fera la proportion comme ci-dessus (243), & réduisant le quatrième terme en décimales, on mettra celles-ci à la suite de celles qu'on a déjà trouvées.

Par exemple, si l'on demande à quel nombre appartient le logarithme 0,5432725; comme ce logarithme tombe entre ceux de 3 & de 4, & que le nombre auquel il appartient, est par conséquent beaucoup au-dessous de 1500, je cherche ce logarithme avec trois unités de plus à sa caractéristique; c'est-à-dire, que je cherche 3,5432725; je trouve qu'il tombe entre les logarithmes de 3493 & 3494, d'où je conclus que le nombre cherché est 3,493, à moins d'un millièbre près. Mais si cette approximation ne suffit pas, je prendrai la différence entre mon logarithme & celui de 3493, c'est-à-dire, 739; je prendrai pareillement la différence 1243 entre les logarithmes de 3494 & 3493, & je chercherai, en raisonnant comme ci-dessus (243), le quatrième terme d'une proportion qui commenceroit par ces trois-ci

$$1243 : 1 :: 739 :$$

Ce

Ce quatrième terme, évalué en décimales, est 0,594; donc le nombre cherché est 3,493594.

Au reste, cette seconde approximation est bornée, parce que les logarithmes des tables n'étant exacts qu'à environ une demi-unité décimale du septième ordre près, les différences sont affectées de ce léger défaut; mais on peut toujours pousser l'approximation avec confiance, jusqu'à trois décimales: au surplus il est rare qu'on ait besoin d'aller jusques-là. La remarque que nous faisons, doit diriger aussi dans l'usage que nous avons fait ci-dessus (239 & 243), de la même proportion.

246. Si l'on veut avoir la fraction à laquelle répond un logarithme négatif proposé, on retranchera ce logarithme de 1, ou 2, ou 3, ou 4, &c. unités, selon l'étendue des tables; & après avoir trouvé le nombre qui répond au logarithme restant, on en séparera sur la droite, par une virgule, autant de chiffres qu'il y aura eu d'unités dans le nombre dont aura retranché le logarithme.

Par exemple, si l'on demande à quelle fraction appartient — 1,532732, je re-

Arithmétique.

Q

tranche 1,532732 de 4, & il me reste 2,467268 qui dans les tables se trouve entre les logarithmes de 293 & de 294; j'en conclus que la fraction cherchée est entre 0,0294, & 0,0293; c'est-à-dire, qu'elle est 0,0293, à moins d'un dix-millieme près. En effet, retrancher de 4, le logarithme proposé 1,532732, c'est (236) multiplier 10000 par la fraction à laquelle appartient ce même logarithme proposé, ou (ce qui est la même chose), c'est multiplier cette fraction par 10000; donc le nombre qu'on trouve est 10000 fois trop grand, il faut donc le compter pour des dix-milliemmes.

Tout ce que nous venons de dire, trouvera abondamment des applications par la suite. Bornons-nous, quant à présent, à donner une idée, par quelques exemples, des avantages que les logarithmes procurent pour la facilité & la promptitude des calculs.

E X E M P L E I.

On demande le quotient de 17954 divisé par 12836, approché jusqu'à moins d'un dix-millieme près.

Logarithme de 17954 . . . 4,254161

Logarithme de 12836 . . . 4,108430

reste 0,145731

Ce reste, cherché dans les tables, avec une caractéristique plus forte de quatre unités, répond à 1,987; donc (258) le quotient cherché est 1,3287.

EXEMPLE II.

On demande la racine cubique de 53,4 moins d'un millieme près.

Le logarithme de 53 est 1,724276

Son tiers (230) est 0,574759

Ce dernier cherché dans les tables avec une caractéristique plus forte de trois unités, répond à 3756, donc (238) la racine chërchée est 3,756.

Pour juger de l'avantage des logarithmes, on n'a qu'à chercher cette racine par la méthode donnée (156). Il ne faut pas pour cela regarder cette dernière comme inutile; car elle s'étend à une infinité de nombres auxquels les logarithmes n'atteindroient pas, par rapport aux bornes des Tables.

E X E M P L E III.

Veut-on avoir, à moins d'un centieme près, la racine cinquieme du cube de 5736?

On triplera le logarithme 3,758609, de 5736, & on aura 11,275827, pour logarithme du cube de 5736. Prenant le cinquieme de ce dernier logarithme, on a 2,255165, pour logarithme de la racine cinquieme du cube de 5736. Ce logarithme, cherché dans les tables, avec une caractéristique plus forte de deux unités, pour avoir des centiemes, répond entre les nombres 17995 & 17996; la racine cherchée est donc 179,95 à moins d'un centieme près.

E X E M P L E IV.

Qu'il soit question de trouver quatre moyens proportionnels géométriques, entre $2\frac{2}{3}$, & $5\frac{3}{4}$?

Il faudroit (215) pour avoir la raison qui doit régner dans la Progreffion, diviser $5\frac{3}{4}$ par $2\frac{2}{3}$, & extraire la racine cinquieme du quotient.

Par logarithmes, cette opération est très-simple. Je détermine par les tables, le logarithme de $5\frac{3}{4}$ ou $\frac{11}{4}$; c'est 0,759668.

Je détermine pareillement le logarithme de $2\frac{2}{3}$; c'est 0,425969. Je retranche donc (231) ce logarithme du premier ; & j'ai 0,333699 ; prenant donc (230) le cinquième de ce dernier, j'ai 0,066740 pour le logarithme de la raison cherchée. Ce logarithme, cherché dans les tables, avec une caractéristique plus forte de 4 unités pour avoir quatre décimales, répond à 11661, à moins d'une unité près ; donc la raison est 1,1661, à moins d'un dix-millième près. Il ne s'agit donc plus, pour avoir les moyens proportionnels, que de multiplier le premier terme $2\frac{2}{3}$, par 1,1661, puis le produit, par 1,1661, & ainsi de suite.

Mais ces opérations peuvent être faites beaucoup plus promptement, à l'aide des logarithmes, en ajoutant consécutivement au logarithme 0,425969 du premier terme $2\frac{2}{3}$, le logarithme 0,066740 de la raison, son double, son triple, & son quadruple ; en sorte qu'on aura 0,492709, 0,559449 ; 0,626189 ; 0,692929 pour les logarithmes des quatre moyens proportionnels demandés. Et si l'on cherche ces logarithmes, dans les tables, avec trois unités de plus à la caractéristique, on trouve que ces quatre moyens propor-

tionnels sont 3,109 ; 3,626 ; 4,128 ; 4,931 ;

REMARQUE.

Lorsque dans une opération où l'on fait usage des logarithmes, il s'en trouve quelques-uns que l'on doit retrancher, on peut simplifier l'opération, par l'observation suivante.

Lorsqu'on a à retrancher un nombre quelconque, d'un autre qui est l'unité suivie d'autant de zéros qu'il y a de chiffres dans le premier, l'opération se réduit à écrire la différence entre 9 & chacun des chiffres du nombre proposé, à l'exception du dernier, pour lequel on écrit la différence entre 10 & ce chiffre. Par exemple ; si j'ai 526927 à retrancher de 1000000 ; je retranche successivement, les chiffres 5, 2, 6, 9, 2, de 9 ; & le dernier chiffre, je le retranche de 10, & j'ai 473073 pour reste.

Ce reste est ce qu'on appelle le *Complément arithmétique* du nombre proposé.

La soustraction faite de cette manière, étant trop simple, pour pouvoir être comptée pour une opération, il s'ensuit que lorsqu'on aura à former un résultat, de

L'addition & de la soustraction de plusieurs nombres, on pourra toujours réduire l'opération, à l'addition. Par exemple, s'il s'agit d'ajouter les deux nombres 672736, 426452, & de retrancher de leur somme, les deux nombres 432752, 18675 : ce qui exige deux additions & une soustraction; je substitue à cette opération, la suivante.

$$\begin{array}{r}
 672736 \\
 426452 \\
 \text{Complément Arith. de } 432752 \dots 567248 \\
 \text{Complément Arith. de } 18675 \dots 981325 \\
 \hline
 \text{somme.} \dots 2647761
 \end{array}$$

c'est-à-dire, que j'ajoute ensemble les deux premiers nombres proposés, & les complémens arithmétiques des deux derniers; la somme est 2647761. Il faut en supprimer le premier chiffre 2, & les chiffres restans 647761 sont le résultat cherché.

La raison de cette opération est facile à sentir, en remarquant que si au lieu de retrancher 432752, comme on le proposoit, j'ajoute son complément arithmétique, c'est-à-dire, 1000000 moins 432752; je fais en même tems la soustraction proposée, & une augmentation de 1000000, c'est-à-dire, d'une dizaine

au premier chiffre du résultat ; donc pour chaque complément arithmétique que j'aurai introduit, j'aurai une dizaine de trop à l'égard du premier chiffre du résultat.

L'application de ceci, aux logarithmes, est évidente.

Qu'il soit question, par exemple, de diviser 3760, par 79. Il faudroit retrancher le logarithme de 79, de celui de 3760. Au lieu de cette opération, j'écris.
 log. 3760. 3,575188
 compl. arith. du log. de 79 8,102373

somme 1,677561

Ainsi 1,677561 est le logarithme du quotient, & répond à 47,59 à moins d'un centieme près.

Supposons, pour second exemple, qu'il soit question de multiplier $\frac{675}{527}$ par $\frac{952}{377}$; il faudroit (106) multiplier 675, par 952 ; & 527, par 377 ; puis diviser le premier produit, par le second. Par logarithmes, on opérera ainsi

log. 675 2,829304
 log. 952 2,978637
 compl. Arith. du log. de 527 . . 7,287189
 compl. Arith. du log. de 377 . . 7,423659

somme 20,509789

le logarithme du produit est donc 0,509789 qui, cherché avec trois unités de plus à la caractéristique, répond à 3,234.

On peut faire usage du complément arithmétique, pour mettre les logarithmes des fractions sous la même forme que ceux des nombres entiers, & les employer de même dans le calcul; par-là on évitera la distinction des logarithmes négatifs, & des logarithmes positifs. Il suffira de se souvenir, que la caractéristique du logarithme des fractions, proprement dites, est trop forte de 10 unités.

Par exemple, pour avoir le logarithme de $\frac{3}{4}$ qui n'est (96) autre chose que 3 divisé par 4; au lieu de retrancher le logarithme de 4, de celui de 3; c'est-à-dire, de retrancher le logarithme de 3, de celui de 4, & de donner au reste le signe —, (235); au logarithme de 3, j'ajoute le complément arithmétique du logarithme de 4;

log. 3.....0,477121
compl. Arith. du log. 4.....9,397940

somme.....9,875061

Cette somme est le logarithme de $\frac{3}{4}$, dont la caractéristique est trop forte de 10 unités. Or il n'est pas nécessaire de faire actuellement la diminution; on peut la re-

jetter à la fin des opérations dans lesquelles on emploiera ce logarithme.

La même règle s'applique aux fractions décimales : ainsi pour avoir le logarithme de 0,575 , qui n'est autre chose que $\frac{575}{1000}$, au logarithme de 575 , j'ajouterois le complément arith. du logarithme de 10000.

En employant ainsi , les complémens arithmétiques , au lieu des logarithmes négatifs des fractions , il n'en est pas plus difficile de trouver dans les tables , les valeurs , en décimales , de ces mêmes fractions. Dès que je saurai qu'un logarithme proposé , est , ou renferme un ou plusieurs complémens arithmétiques ; je fais que sa caractéristique est trop forte , d'autant de dizaines qu'il y entre de complémens arithmétiques ; ainsi si elle passe ce nombre de dizaines , il sera facile de la diminuer , & de trouver le nombre auquel appartient ce logarithme , & qui sera un nombre entier , ou un nombre entier joint à une fraction.

Mais si la caractéristique est au-dessous du nombre des dizaines qu'elle est censée renfermer de trop ; elle appartient certainement à une fraction , que je trouverai en cette manière : je chercherai , par ce qui a été dit (242 & *suiv.*) à quel nombre répond le logarithme proposé ; & lorsque

je l'aurai trouvé, j'en séparerai, par une virgule, autant de dixaines de chiffres sur la droite, qu'il y aura de dixaines de trop; dans la caractéristique.

Par exemple, si l'on me donnoit 8,732235 pour logarithme résultant d'une opération dans laquelle il est entré un complément arithmétique. Je vois, puisque sa caractéristique est au-dessous d'une dixaine, qu'il appartient à une fraction. Je cherche d'abord (242) à quel nombre répond 8,732235, considéré comme logarithme de nombre entier; je trouve qu'il répond à 539802500; séparant 10 chiffres, j'ai 0,0539802500 pour valeur très-approchée de la fraction qui répond au logarithme proposé.

Mais comme il est très-rarement nécessaire d'avoir ces fractions à un tel degré de précision, on abrégera, en diminuant tout de suite la caractéristique du logarithme proposé, autant qu'il est nécessaire pour la faire tomber parmi celle des tables, & prenant seulement le nombre correspondant; on séparera autant de chiffres de moins que ne le prescrit la règle précédente, autant de moins, dis-je, qu'on aura ôté d'unités à la caractéristique. Ainsi, dans le cas présent, je diminuerois la ca-

raâteristique, de 5 unités : & ayant trouvé que le nombre correspondant, est 5398, j'en séparerois seulement cinq chiffres, & j'aurois 0,05398.

Dans les élévations aux puissances, il faudra observer, qu'en multipliant (229) le logarithme, par le nombre qui marque le degré de la puissance, il se trouvera qu'on multipliera aussi, ce dont la caractéristique se trouvera être trop forte. Ainsi; en élevant au cube, par exemple; s'il entre un complément arithmétique dans le logarithme proposé, c'est-à-dire, si la caractéristique est trop forte de 10 unités, celle du logarithme du cube sera trop forte de 30 unités; & ainsi des autres. Il sera donc facile de la ramener à sa juste valeur.

Dans les extractions des racines; pour éviter toute méprise, lorsqu'il entrera des complémens arithmétiques dans les logarithmes dont on fera usage, on aura soin d'ajouter ou d'ôter à la caractéristique autant de dixaines qu'il est nécessaire pour que ce dont elle sera trop forte, soit précisément d'autant de dixaines qu'il y a d'unités dans le nombre qui marque le degré de la racine : & ayant, conformément à la règle ordinaire, divisé par le nombre qui

marque le degré de la racine, la caractéristique sera trop forte, précisément de 10 unités.

Par exemple, si l'on demande la racine cubique de $\frac{276}{547}$; au logarithme de 276, j'ajoute le complément arithmétique de celui de 547....

log. 276 2,440909

compl^t. Arith. du log. de 547 .. 7,262013

somme 9,702922

à la caractéristique de laquelle

j'ajoute 20,

29,702922

afin qu'elle devienne trop forte de 3 dixièmes, & j'ai 29,702922 dont le tiers 9,900974 est le logarithme de la racine cubique demandée, mais avec dix unités de trop à la caractéristique; ainsi, conformément à ce qui a été observé ci-dessus, je trouve que cette racine cubique est 0,7961 à moins d'un millième près.

L'usage des compléments arithmétiques, est principalement utile dans les calculs de la Trigonométrie, & par conséquent dans plusieurs des opérations du Pilotage que l'on veut faire avec une certaine exactitude.

F I N.

*Extrait des Registres de l'Académie
Royale des Sciences.*

Du 21 Novembre 1764.

MESSIEURS CLAIRAULT, & D'ALEMBERT qui avoient été nommés pour examiner un *Cours de Mathématiques à l'usage des Gardes du Pavillon & de la Marine*, par M. BÉZOUT, en ayant fait leur rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impression; en foi de quoi j'ai signé le présent Certificat. A Paris, ce 21 Novembre 1764.

GRANDJEAN DE FOUCHY, *Secr. perp.
de l'Ac. R. des Sciences.*

P R I V I L E G E D U R O I.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Conseillers, le Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra: SALUT. Nos bien-amés LES MEMBRES DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES de notre bonne Ville de Paris, Nous ont fait exposer qu'ils auroient besoin de nos Lettres de Privilege pour l'impression de leurs Ouvrages: A CES CAUSES, voulant favorablement traiter les Exposants, Nous leur avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer, par tel Imprimeur qu'ils voudront choisir, toutes les Recherches & Observations journalières, ou


Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Assemblées de ladite Académie Royale des Sciences, les Ouvrages, Traités ou Mémoires de chacun des Particuliers, qui la composent, & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire paroître, après avoir fait examiner lesdits Ouvrages, & qu'ils seront jugés dignes de l'impression, en tels volumes, forme, marge, caractères, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon leur semblera, & de les faire vendre & débiter partout notre Royaume, pendant le temps de vingt années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes; sans toutefois qu'à l'occasion des Ouvrages ci-dessus spécifiés, il puisse en être imprimé d'autres qui ne soient pas de ladite Académie: FAISONS défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi à tous Libraires & Imprimeurs, d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, & débiter lesdits Ouvrages, en tout ou en partie, & d'en faire aucunes traductions ou extraits, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit desdits Exposants, ou de ceux qui auront droit d'eux; à peine de confiscation desdits Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenants; dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers auxdits Exposants ou à celui qui aura droit d'eux, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément aux Réglements de la Librairie; qu'avant de les exposer en vente, les manuscrits ou imprimés qui auront servi de copie à l'impression desdits Ouvrages, seront remis ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le sieur HUE DE MIROMENIL; qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque

publique , un dans celle de notre Château du Louvre , & un dans celle de notre cher & féal Chevalier Chancelier de France , le Sieur DE MAUPEOU , & un dans celle dudit sieur Hue de Miroménil ; le tout à peine de nullité desdites Présentes : du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Exposans & leurs ayans cause , pleinement & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes , qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages , soit tenue pour dûment signifiée , & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers & Secrétaires , soi soit ajoutée comme à l'original. COM-MANDONS au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles , tous Actes requis & nécessaires , sans demander autre permission , & nonobstant Clameur de Haro , Charte Normande , & Lettres à ce contraires. CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Paris le premier jour de Juillet , l'an de grace mil sept cent soixante-dix-huit , & de notre Regne le cinquieme. Par le Roi en son Conseil.

Signe LE BEGUE.

Registré sur le Registre XX de la Chambre Royale & Syndicale des Imprimeurs & Libraires de Paris, N° 1477, folio 582, conformément au Règlement de 1723, qui fait défenses, article 4, à toutes personnes, de quelque qualité qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les auteurs ou autrement ; & à la charge de fournir à la susdite Chambre huit Exemplaires prescrits par l'art. 108 du même Règlement. A Paris, ce 20 Août 1778.

Signé A. M. LOTTIN l'aîné, Syndic.









SEP 25 1920

